

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Acta Tropica**

Band (Jahr): **25 (1968)**

Heft 3

PDF erstellt am: **14.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

<http://www.e-periodica.ch>

**amibiase
nouveau
traitement**

FLAGYL*

(Metronidazole - 8823 R.P.)

amœbicide diffusible,
d'action rapide et puissante par voie buccale,
sans contre-indications.

DYSENTERIE AMIBIENNE

8 comprimés (2 g) par jour
en 4 prises pendant 7 à 10 jours
consécutifs.

une proportion éloquent de gué-
risons cliniques, rectoscopiques et
parasitologiques.

AMIBIASE HÉPATIQUE

le 1^{er} jour :
10 comprimés (2,50 g) en 5 prises
les 9 jours suivants :
8 comprimés (2 g) par jour
en 4 prises

une efficacité pratiquement cons-
tante à bref délai.

PRÉSENTATION

Comprimés dosés à 250 mg
(flacons de 20) Prix : F. 12,65
S.S. 70%

RECOMMANDATION

Dans tous les cas, fractionner la dose
quotidienne en plusieurs prises de
2 comprimés (500 mg) chacune.

* On sait que les indications classiques du FLAGYL étaient jusqu'alors
représentées par la trichomonase uro-génitale et la lambliaose.



SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE SPECIA

INFORMATION MÉDICALE : 28, COURS ALBERT 1^{er} - PARIS 8^e - TEL. 256.40.00

Annonces et Publicité - Paris

Printed in Switzerland
Druck von Friedrich Reinhardt AG., Basel