

La génétique dans un croisement de poules

Autor(en): **Chodat, R.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Archives des sciences physiques et naturelles**

Band (Jahr): **3 (1921)**

PDF erstellt am: **10.08.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-741107>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Plaque I perpendiculaire à la bissectrice — plaque entre 2 demi boules

2V au verre rouge	= 86°55'
2V pôle obscur en lumière naturelle	= 87° 6'
2V axes bleus en lumière naturelle	= 87°13'

Plaque II perpendiculaire à la bissectrice — plaque entre 2 demi boules.

2V axes rouges en lumière naturelle	= 87°38'
2V axes bleus en lumière naturelle	= 88° 6'

Plaque III taillée sous une inclinaison telle que sa normale faisait un angle de 31° 45' avec la normale à la face *p*.

Un seul axe optique était visible dans l'air. — Les mesures dans l'air ont donné :

2V au verre rouge	= 88°36'
2V teinte sensible	= 88°47'
2V bleu du sulfate de cuivre	= 89° 2'

Le dichroïsme du péridot est sensible avec des plaques de 7 à 10 millimètres d'épaisseur, on a :

selon n_m verdâtre jaunâtre
selon n_p bleu vert.

La couleur des cristaux varie un peu, les plus beaux sont d'un vert franc, d'autres sont assez pâles et un peu jaunâtre. Les plus appréciés en bijouterie ont une très belle teinte verte.

L'analyse chimique a montré des traces de cuivre, de manganèse et de nickel.

Une prospection minière effectuée sur l'île de Zeberget a du reste montré qu'il existait un gisement de minerai de nickel dont l'étude minéralogique détaillée n'a pas encore été faite.

R. CHODAT. — *La génétique dans un croisement de poules.*

M. R. CHODAT, expose des recherches qu'il a entreprises, avec l'aide de M^{lle} E. CHODAT, sur la génétique des races de poules *Minorque noire* et *Orpington blanche*. Les individus utilisés pour ces expériences provenaient de lignées sélectionnées et standardisées. Le croisement effectué, en prenant les précautions

d'usage, d'isolement et de temps, s'est effectué entre un coq *Minorque noir* ($P\sigma$) et une poule *Orpington blanche* ($P\varphi$). A F_1 , coqs et poules sont du même type, c'est-à-dire facies général orpington tant pour les σ que pour les φ , jambes courtes et port lourd; il y a une grande uniformité. Le coq, vivement coloré, a le camail jaune doré brillant, les plumes du dos d'un beau jaune roux, celles de la selle pendantes, d'un roux-jaune plus vif, les couvertures moyennes des ailes d'un brun violacé-noir avec les plumes primaires plus foncées et à reflets verdâtres; les plumes du plastron sont du type coucou gris avec taches gris-violacé noir; queue ornée de faucilles abondantes et gracieusement courbées, quelques-unes noires avec reflets verdâtres, les autres grises avec taches transversales formant ce qu'on appelle « barré », tarses roses, crête grosse, simple et dentée, oreillons plus petits que dans minorque. Les poules F_1 sont lourdes, à jambes courtés, à tarses ardoisés comme minorque, la teinte générale brun noir avec plastron brun plus clair, à plumes pailletées de noir, le dos noirâtre avec reflets bleuâtres; la crête importante, simple, dressée ou légèrement retombante, mais moins que minorque, les œufs sont de couleur intermédiaire. On obtient en somme une espèce de réversion avec des apports de couleur noire qui proviennent du minorque. On doit donc supposer que la coloration variée à F_1 est due à des facteurs latents dans les parents et que la combinaison met en présence (Théorie de la réversion de CUÉNOT).

A F_2 , nous avons élevé 12 sujets, dont 7 coqs et 5 poules; des coqs l'un est blanc pur, les autres colorés plus ou moins vivement, des poules l'une est noire, les autres blanches (réversion qui se maintient et s'accuse). On voit donc les poules revenir aux types parents pour ce qui est de la coloration, tandis que sauf le blanc, les autres 6 coqs montrent des caractères de coloration non manifestés dans les parents. ($P\varphi P\sigma$). — La poule noire à F_2 (φ') a le facies lourd orpington, les tarses ardoisés minorque, la crête nettement minorque femelle, c'est-à-dire penchée; les œufs sont jaune brun, du type orpington. Des poules blanches φ^2 , φ^3 , φ^4 . c'est-à-dire trois, ont le facies plutôt minorque, les pieds ardoisés, mais la crête courte et dentée orpington, une seule à crête un peu plus développée, les œufs co-

lorés, la dernière plus lourde (orpington) ♀⁵ a les tarses roses, mais la crête, bien développée et pendante, est du type minorque femelle, les œufs gros presque blancs comme minorque.

Des coqs, le seul blanc pur est à tarses roses et comme il a tout à fait le facies minorque, il correspond à un Minorque blanc mais extrait d'un croisement, c'est ♂¹.

Le second est du type F_1 , sauf en ce qu'il est un peu plus clair pour ce qui est des plumes du plastron et les faucilles de la queue qui sont terminées par une tache fauve, les tarses sont roses comme celle du père (F_1). Le troisième (♂³) est, pour ce qui est de la couleur et même de l'apparence générale une *réversion* au type sauvage *Gallus bankiva*¹. On admire la richesse et la beauté de son coloris avec le camail jaune doré brillant, le dos roux fauve brillant et les plumes pendantes de la selle de couleur dorée qui s'opposent aux tons plus foncés du plastron tacheté de brun foncé et du ventre brun bistre, tandis que les primaires sont foncées avec extrémités rousses et base à reflets métalliques ; les faucilles sont particulièrement brillantes avec leurs reflets verts. Le quatrième ♂⁴ lui ressemble, mais le plastron n'a pas de taches et comme le ventre il est roux avec tons grisâtres, tandis que les plumes faucilles vertes ont un large liseré de couleur tuile, les tarses ardoise. Le cinquième est tout aussi beau mais plus sombre de couleur, avec plumes plus noires avec reflets bleus, surtout dans le plastron et l'abdomen, tandis que le camail et le dos montrent des plumes jaune doré ou orangées, les faucilles sont à reflets bleus et verts, les oreillons gros et blancs.

Les ♂⁶ et ♂⁷ sont beaucoup plus clairs, ocre bistre ou ocre tirant sur le rose, à plastron coucou, à plumes primaires des ailes ocre rougeâtre, à faucilles gris violacé et à large liseré ocre rosé, tarses roses. En résumé à F_2 on a pour les coqs majorité de formes colorées, polymorphisme de coloration allant du « bankiva » foncé ♂⁵, par le « bankiva » brillant ♂³, au « bankiva » roux pour aboutir par le ♂² (hybride du type F_1) aux formes moins vivement colorées (coucou) ♂⁶ ♂⁷, avec une forme

¹ Je dois à l'obligeance de M. le Dr J. CARL, la communication d'une partie de la bibliographie zoologique, ce dont je le remercie.

♂¹ semblable à la race déjà connue *Minorque blanc* à tarses roses. Seulement ici la coloration blanche a été extraite de l'*Orpington* (P ♀) blanc.

Comme le montre le diagramme suivant, les caractères des parents (P ♀ et P ♂), pour ce qui est du facies, crête, couleur des tarses, couleur générale ont été distribués à F₂, ce qui montre leur dissociation. A côté de cette dissociation on voit apparaître le caractère inattendu de la coloration sauvage mais qui à F₂ n'est dévolue qu'aux coqs, l'un seul étant récessif pour ce qui est de la coloration blanche.

Parents (P)
P ♂ noir × ♀ blanche

F₁

Génération uniforme :

Coloration complexe jaune, roux, brun, violacé noir rappelant l'espèce sauvage, mais avec association du noir de P ♂ ; disjonction de la couleur des tarses qui passe (ardoise) de P ♂ à F₁ ♀ ou (rose) de P ♀ à F₁ ♂.

F₂

Génération polymorphe

A. Répartition de la couleur des tarses.

Tarses ardoisés	Tarses blancs
♀ ¹ ♀ ² ♀ ³ ♀ ⁴	♀ ⁵
♂ ³ ♂ ⁴ ♂ ⁵	♂ ¹ ♂ ² ♂ ⁶ ♂ ⁷

B. Répartition de la couleur du plumage.

Blanc	Coloré	Noir
♀ ² ♀ ³ ♀ ⁴ ♀ ⁵		♀ ¹
♂ ¹	♂ ² ♂ ³ ♂ ⁴ ♂ ⁵ ♂ ⁶ ♂ ⁷	

Répartition du faciès¹.

Orpington			Minorque			
♀ ¹	♂ ⁵		♀ ²	♀ ³	♀ ⁴	
♂ ²	♂ ³	♂ ⁴	♂ ¹	♂ ⁵	♂ ⁶	♂ ⁷

Cette étude qui sera poursuivie pour déterminer la constitution des phénotypes F_2 apporte une nouvelle contribution à l'étude de la réversion dans les races de poules², de l'origine possible du Minorque blanc etc. Elle montre aussi que les races les mieux définies et en apparence stables possèdent par dessous les caractères exprimés, des facteurs sous-jacents qui se combinant avec d'autres facteurs, amenés par le croisement, déterminent la manifestation de nouveaux caractères ou provoquent un phénomène de réversion plus ou moins complet.

A. LENDNER. — *Le parasitisme du Spinellus macrocarpus Karsten.*

Parcourant les bois d'Yvres, en automne passé, je trouvai, sur une petite Agaricinée, le *Mycena epipterigia*, une Mucorinée parasite à sporanges noirs brillants portés sur des filaments dressés qui sortaient de tous côtés semblables à des épingle piquées en tous sens sur une pelote. Frappé par l'aspect curieux de cette Mucorinée qui ne manifestait pas de sensibilité géotropique, je l'emportai au laboratoire afin de la déterminer. Il

¹ Cette appréciation est un peu incertaine pour ♂³ et ♀³.

² DARWIN, Ch. *The variation of animals and plants under domestication* (1868).

EWART, J. *Experim. Contributions to the theory of heredity* (1901).

DAVENPORT. *The new views about reversion*. Proceed. Am. Phil. Soc. XLIX (1910) 291-296.

BATESON, W. et PUNNETT. *Reports to the Evolution Committee*, Royal Soc. (1902-1909).

DAVENPORT. *Inheritance in domestic Fowls*, Public. 121, Carneg. Instit. III (1909).