

Les ammonites du Sinémurien supérieur de Champfromier (Jura français)

Autor(en): **Bovier, E.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Archives des sciences physiques et naturelles**

Band (Jahr): **12 (1930)**

PDF erstellt am: **14.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-741294>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

E. Bovier. — *Les Ammonites du Sinémurien supérieur de Champfromier (Jura français).*

Sur le conseil de M. le professeur L. W. Collet, j'ai étudié, depuis plusieurs années, la stratigraphie du Lias de la deuxième chaîne du Jura au nord de Bellegarde (Département de l'Ain, France).

Le but de cette première note est de donner la liste des Ammonites que j'ai récoltées dans le Sinémurien supérieur de la carrière de Prébasson près de Champfromier, tout en attirant l'attention sur l'association et l'apparition de certaines espèces.

J'ai trouvé les zones suivantes:

- III z. à *Echioceras raricostatum* (Deroceratan-age),
- II z. à *Oxynoticeras oxynotum* (Oxynoticeratan-age),
- I z. à *Asteroceras obtusum* (Asteroceratan-age).

Ces zones sont celles d'Oppel; entre parenthèses, je donne l'appellation suivant S. S. Buckman. Le détail de ces zones est le suivant:

III. ZONE A ECHIOCERAS RARICOSTATUM (selon Oppel); Deroceratan-age (selon S. S. Buckman).

Cette zone affleure mal à Champfromier; elle est en grande partie recouverte par de la végétation. Les assises supérieures, que je connais encore assez mal à cause de la végétation, m'ont fourni les genres suivants dont l'état de conservation ne permet pas une détermination spécifique:

<i>Eoderoceras</i> sp.		<i>Metaderoceras</i> sp.
<i>Hemimicroceras</i> sp.		<i>Metoxynoticeras</i> sp.

15. — Au-dessous de ces couches se trouve un banc de calcaire bleuté à grain fin dont les fossiles ne sont pas pyriteux. Ce calcaire est dur et très riche en Echiocératidés.

<i>Echioceras</i> cf. <i>raricostatum</i> (Ziet.) in Wright	<i>Echio. Schlumbergeri</i> (Reyn.)
<i>Echio. raricostatum</i> (Quenst.)	<i>Echio. Studeri</i> (Hug)
<i>Echio. Zieteni</i> (Quenst.)	<i>Echio. cf. Studeri</i> (Hug)
<i>Echio. laevidomum</i> (Quenst.)	<i>Echio. cf. microdiscum</i> (Quenst.)
<i>Echio. modestum</i> (Quenst.)	<i>Echio. aff. Newberryi</i> (Hyatt)
<i>Echio. cf. liasicum</i> (Hug) =	<i>Echio. cf. Carusensis</i> (d'Orb.)
<i>Echio. polygyratum</i> (S. Buck.)	<i>Echio. Favrei</i> (Hug)
<i>Echio. prorsum</i> (S. Buck.)	<i>Echio. Hugi</i> (Hug)
<i>Echio. Meigeni</i> (Hug)	<i>Echio. subquadratum</i> (Hug)

Nous notons l'association des espèces suivantes: *Echioceras raricostatum* (Quenst.), *raricostatum* (Ziet.) in Wright et *Zieteni* in Quenst.. Ces espèces ont été signalées en Angleterre à des niveaux distincts, mais elles sont trop semblables pour être utiles comme fossiles caractéristiques.

Au-dessous de ce banc, la végétation recouvre la partie moyenne de la zone à *Echioceras raricostatum* (selon Oppel), soit environ 2,5 m; puis on rencontre un banc de marnes feuilletées (14) assez riche en *Echioceras*, également non pyriteux. Ces couches renferment une faune plus riche en genres que la couche 15 ci-dessus. Nous y avons, en effet, trouvé:

<i>Echioceras tardecrescens</i> (Hauer) in Dum.	<i>Echio. spp.</i>
<i>Echio. liasicum</i> (Hug) non (d'Orb.)	<i>Gleviceras</i> sp.
	<i>Eoderoceras</i> sp.
	<i>Cymbites</i> sp.

Hemimicroceras sp. ou *Cruciloboceras densinodulum* (auct.) sp. juv.

II. ZONE A OXYNOTICERAS OXYNOTUM (selon Oppel); Oxynoticeratan-age (selon S. S. Buckman).

Cette zone est celle que nous avons le mieux étudiée. Elle se compose des couches suivantes:

13. — Un banc de calcaire gris verdâtre, compact, sans Ammonites, 1 m environ.

12. — Calcaire très compact, verdâtre, de 0,70 m, avec une riche faune d'*Oxynticeras* :

<i>Oxynticeras Simpsoni</i> (Bean-Simps.)	<i>Crucilobicerias densinodulum</i> (auct.)
<i>Oxynticeras polyophyllum</i> (Simps.) in Buckm.	<i>Oxynticeras</i> sp.
<i>Leptonotoceras</i> cf. <i>Suessi</i> (v. Hauer)	<i>Crucilobicerias</i> sp.
	<i>Lytoceras</i> sp.
	<i>Cheltonia</i> sp.

Nous remarquons l'apparition d'*Oxy. Simpsoni* (Bean-Simps.), *Ox. polyophyllum* (Simps.) et *Crucilob. densinodulum* (auct.).

11. — Calcaire marneux gris-clair, tendre; environ 0,30 m.

<i>Oxynticeras oxynotum</i>	<i>Leptonotoceras</i> sp.
<i>Oxynticeras</i> sp.	<i>Gleviceras</i> sp.
<i>Hemimicrocerias Thompsoni</i>	<i>Bifericeras bifer</i> (Reyn.)
<i>Bifericeras</i> cf. <i>Hilmorton</i> sp.	

Remarque: Nous notons l'apparition de *Bifericeras bifer* (Reyn.) et de *Gleviceras* sp.

10. — Une mince couche de 0,10 m de calcaire gris-clair, marneux, friable, avec *Chondrites*, m'a fourni:

<i>Oxynticeras</i> sp.	<i>Hemimicrocerias subplanicosta</i> (Op.)
------------------------	---

9. — Calcaire blanchâtre, riche en *Eoderoceras*; épaisseur 0,75 m.

<i>Oxynticeras</i> sp.	<i>Eoderoceras</i> cf. <i>bispinatum</i>
<i>Leptonotoceras</i> sp.	(Geyer)
<i>Crucilobicerias</i> (écrasé)	<i>Eoderoceras</i> sp.

8. — Calcaire gris-foncé, compact; les fossiles sont rarement pyriteux et mal conservés en général; 0,30 m.

<i>Oxynticeras</i> sp. ind. (grande taille)	<i>Leptonotoceras</i> sp.
<i>Oxynticeras</i> sp. juv.	<i>Eoderoceras</i> cf. <i>bispinatum</i>
<i>Cymbites</i> sp. juv. aff. <i>Berardi</i> (Reyn.)	(Geyer)

7. — Calcaire gris dur, peu fossilifère; environ 0,30 m.

<i>Oxynticeras oxynotum</i> sp.	<i>Schlotheimia (Angulaticeras)</i>
<i>Paroxynticeras</i> sp. juv.	<i>lacunata</i> (J. Buck)
<i>Eoderoceras</i> sp.	<i>Schlot. (Angulat.) cf. parva</i> (J. Buck)

6. — Marnes noires, compactes, avec de petites taches blanches (organismes ?), nombreux *Epophioceras*. Cette couche est étirée en lentille et la partie supérieure (*b*) est plus fossilifère.

b) <i>Oxynticeras oxynotum</i> sp.	<i>Epophioceras Landrioti</i> (d'Orb.)
<i>Schloth. (Angulat.) lacunata</i> (J. Buck.)	<i>Bifericeras</i> sp. juv.
a) <i>Epophioceras cf. doricum</i> (Sav. et Meneg.)	<i>Cymbites</i> sp. (v. Hauer) in Geyer
<i>Leptonoceras</i> du groupe de <i>Lept. abnorme</i>	<i>Eoderoceras</i> sp. <i>Epophioceras</i> sp.

Nous avons, ici, la présence de *Epophioceras Landrioti* (d'Orb.) et de *Schl. (Angulat.) lacunata*; celle-ci est une espèce classée par les Anglais dans la zone à *Asteroceras obtusum*.

5. — Calcaire compact, pauvre en fossiles; environ 0,60 m.

<i>Oxynticeras oxynotum</i> sp.	<i>Gagaticeras gagateum</i> (Y. et B.)
<i>Paroxynticeras</i> sp.	<i>Gagaticeras Sirius</i> (Reyn.)
<i>Cymbites</i> sp.	

C'est dans cette couche qu'apparaît *Gag. gagateum* (Y. et B.).

4. — Calcaire un peu marneux à grandes Ammonites; environ 0,30 m.

<i>Oxynticeras cf. oxynotum</i> (Dum.)	<i>Oxynticeras lynx</i> (d'Orb.)
<i>Oxynticeras</i> sp. <i>oxynotum</i>	<i>Cymbites</i> sp.
	<i>Schlot. (Angul.) rumpens</i> (Op.)

3. — Calcaire compact, riche en *Gagaticeras*; épaisseur 0,60 m.

<i>Oxynticeras oxynotum</i> sp. juv.	<i>Eparietites Choffati</i> (Pomp.)
<i>Oxynticeras</i> spp. ¹	<i>Eparietites Collenotii</i> (d'Orb.)
<i>Paroxynticeras</i> sp.	<i>Schlot. (Angul.) rumpens</i> (Op.)
<i>Gagaticeras</i> aff. <i>Vesta</i> (Reyn.)	<i>Gagaticeras Sirius</i> (Reyn.)

¹ spp. = species parens.

C'est dans cette couche qu'apparaît *Ox. oxynotum* d'une façon certaine; l'échantillon trouvé dans la couche 2 n'étant pas assez bien conservé pour une détermination précise.

2. — Calcaire feuilleté, noirâtre, parfois assez grossier; riche en *Schlotheimia*; épaisseur 0,20 m.

<i>Oxynticeras</i> cf. <i>oxynotus</i> (mal conservé)		<i>Cymbites</i> sp. caréné
<i>Schlotheimia</i> (<i>Angul.</i>) <i>rumpens</i> (Op.)		<i>Cheltonia</i> sp.
		<i>Gagaticeras</i> sp.

Nous remarquons ici la présence d'une faune de *Cymbites* carénés. C'est avec cette couche que commence la zone à *Oxynticeras oxynotus* qui, on l'a vu, est passablement riche en fossiles.

I. ZONE A ASTEROCERAS OBTUSUM (selon Opperl); Asteroceratana-ge (selon S. S. Buckman).

1. — Calcaire grumeleux, feuilleté, friable; épaisseur 0,60 m.

<i>Asteroceras Smithi</i> (Sow.)		<i>Schloth.</i> (<i>Angul.</i>) <i>rumpens</i> (Op.)
<i>Asteroceras Marstonense</i> (Spath)		<i>Cymbites</i> cf. <i>Dennyi</i> (Simps.)
<i>Asteroceras</i> sp. juv.		<i>Rhacophyllites</i> sp.

Cette couche est en contact avec les marnes du Trias.

Les listes ci-dessus nous permettent de noter:

1° DANS LA ZONE A ASTEROCERAS OBTUSUM:

la présence, à Champfromier, de *Rhacophyllites* sp.

2° DANS LA ZONE A OXYNTICERAS OXYNOTUM:

Oxynticeras oxynotum est rencontré dès les couches inférieures, bien avant *Gagaticeras gagateum* (Y. et B.).

La partie inférieure de la zone à *Oxynticeras oxynotum* nous a fourni quelques exemplaires de *Cymbites* sp. juv. possédant une carène. La zone 6 de la coupe de Champfromier est riche en *Epophioceras* du groupe *Ep. Landrioti*; ceux-ci sont donc à un niveau plus élevé que dans les coupes classiques anglaises.

A ce niveau et au-dessus, nous avons trouvé la *Schlotheimia (Angulaticeras) lacunata* (J. Buck.) que S. S. Buckman situait, dans ses coupes, à un niveau inférieur.

De même, nous voyons que *Hemimicroceras subplanicosta* (Op.) apparaît avant *Bifericeras bifer* (Reyn.) et *Oxynoticeras Simpsoni* (Simps.). Ce dernier se rencontre tardivement (par rapport aux données des paléontologistes anglais) et mêlé à une faune où l'on a déjà *Cruciloboceras densinodulum* (auct.) que S. S. Buckman place dans la zone à *E. raricostatum*.

3° ZONE A ECHIOCERAS RARICOSTATUM:

Nous constatons la présence de *Crucilob. densinodulum* (auct.) avec celle d'*Echioceras tardecrescens* (Hauer) in Dum. qui apparaît donc très tôt à Champfromier.

Nous n'avons pas pu établir de niveaux spéciaux (comme S. S. Buckman) pour les *Echioceras Zieteni* et *raricostatum*, car les Ammonites de ce niveau sont trop rapprochées les unes des autres en verticale comme en horizontale.

D'autre part, la zone à *Echioceras raricostatum* affleurant mal à Champfromier, nous ne pouvons en discuter la faune ici.

EN RÉSUMÉ:

Les espèces trouvées à Champfromier telles que *Schloth. lacunata* (J. Buck.), *Oxyn. Simpsoni* (Simps.), *Epoph. Landriotti* (d'Orb.) (espèces qui sont peu ou pas représentées en Angleterre) sont situées à des niveaux plus élevés que ceux envisagés par S. S. Buckman. En revanche, les espèces *Oxynot. oxynotum* (Dum.), *Hemimicroceras subplanicosta* (Op.), *Crucilob. densinodulum* (auct.) apparaissent plus vite à Champfromier.

Les zones selon Opper se retrouvent bien à Champfromier, mais les « Hemerae » selon S. S. Buckman varient assez fortement. Ces dernières semblent avoir bien peu de valeur.

Pour juger de la valeur des espèces selon S. S. Buckman et de sa classification en « Hemerae », j'ai révisé mes déterminations au British Museum à Londres où M. le Dr L. F. Spath m'a aidé de ses conseils; qu'il me soit permis de l'en remercier.


Enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la Faculté des Sciences qui, en m'accordant la bourse Plantamour-Prévost, m'a permis de séjourner à Londres.

En terminant, je ne saurais taire tous les remerciements que je dois à mon maître, M. le professeur L. W. Collet qui, par ses encouragements et ses précieux conseils, a considérablement facilité la tâche que je me suis donnée.

Laboratoire de géologie de l'Université de Genève.

Henry Goudet. — *L'activité optique de certains dérivés de l'anthracène.*

Quand on cherche une formule destinée à représenter la constitution de l'anthracène, on se heurte à une difficulté: comment la 4^{me} valence des atomes de carbone 9 et 10 peut-elle être saturée? Certains auteurs ont admis que cette valence était saturée par une liaison médiane joignant les atomes de carbone 9 et 10 (fig. I); d'autres ont eu recours à d'autres solutions, dont les plus connues sont représentées par les figures II et III.



La formule de la figure I est actuellement rejetée par la plupart des savants: l'étude du spectre d'absorption et de la réfraction moléculaire de l'anthracène (en solution) fournit de sérieuses présomptions contre cette formule. Son inexactitude n'a cependant pas été prouvée d'une façon absolument décisive. Les recherches qui font l'objet de la présente note avaient pour but d'apporter quelques nouvelles présomptions en faveur ou à l'encontre de cette formule.