

La docimasia densimétrique

Autor(en): **Blanc, William-A.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Archives des sciences [1948-1980]**

Band (Jahr): **4 (1951)**

Heft 6

PDF erstellt am: **29.06.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-739981>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Concentré dix fois (c'est-à-dire ayant un taux de protides voisin de celui du sang), il donne après précipitation par l'acétone ou l'alcool une *réaction très positive*, rouge vif. La coloration est plus vive avec l'acétone. L'image est encore plus nette si le concentré est précipité par la formoline à 10%. Il se forme ainsi d'épais filaments très positifs ressemblant aux membranes alvéolaires et présentant les mêmes caractéristiques tinctoriales, y compris l'argentaïnie (tabl. III, fig. 2).

Résumé. — Nous apportons, par une méthode histologique, des arguments en faveur de l'origine amniotique des membranes éosinophiles de la pneumonose néonatale. On peut constater microscopiquement que d'autres éléments s'ajoutent aux albumines amniotiques concentrées, épithélia desquamés, éléments figurés du liquide amniotique et parfois exsudat plasmatique. Le point capital de la prophylaxie sera donc l'aspiration soigneuse, endotrachéale, de tous les cas suspects d'asphyxie grave *in utero*.

Université de Genève.

Institut d'Anatomie Pathologique.

1. BLANC, W., Démonstration au 6^e Congrès international de Pédiatrie, Zurich, 1950.
2. BOVET-DU BOIS, N., *Schw. Ztschr. f. Path. u. Bakt.*, 14, 261, 1951.
3. MILLER, H. C., JENNISON, M. H., *Pediatrics*, 5, 7, 1950.
4. AHVENAINEN, E. K., Academic dissertation, *Ann. Inst. Path.*, Helsinki, 1948.
5. FARBER, S., WILSON, J. L., *Arch. Path.*, 14, 437 et 450, 1932.
6. TESSERAUX, H., *Frankf. Ztschr. f. Path.*, 60, 188, 1949.
7. MILLER, H. C., BEHRLE, F. C., GIBSON, D. M., *Pediatrics*, 7, 611, 1951.
8. HIRVENSALO, M., *Acta Paed.*, 37, suppl. 1, 1949.
9. BLYSTAD, W., LANDING, B. H., SMITH, C. A., *Pediatrics*, 8, 5, 1951.

William-A. Blanc. — *La docimasia densimétrique.*

La grande majorité des morts néonatales est due à l'anoxie. Les lésions qu'elle entraîne sont bien connues. On est, d'autre part, frappé par la ressemblance qu'offre ce tableau anatomopathologique avec celui du choc. La part de ce dernier est difficile à établir, malgré la présence d'images typiques pour certains auteurs [Gruenwald et coll.]. L'asphyxie et le choc

DOCIMASIE DENSIMÉTRIQUE I

Macérés	Mort-nés			Nés vivants			Réanimation		
	Prématurés a)	Prématurés b)	A terme	Hyper- matures	Pré- maturés	A terme	Mort-nés pré- matur.	à terme	Né vivant
1,062	1,037	1,042	1,043	1,029-33	0,85-0,9	0,95-1	1,021	0,95	1,022-52
1,057	1,038	1,042	1,043	1031-33	0,85-0,9	1-1,008	0,95-1	0,95	1,023-36
1,056	1,037	1,043	1,042-44	1,032	0,95-1,0	0,95-1	1	1,050	1,012-36
1,057	1,035	1,041	1,044	1,030-36	0,95-1,0	1,010-22	0,95-1	1,049	1,008-17
pr.+++	1,040	1,041	1,044-48	1,031-33	1,034-50	1	0,95-1	1,045	1,015-52
	—	+++	tox+	++	+++	+	—	+++	Hyp. +
1,048	1,023-25	1,036	1,039	1,034	1,039-44	1			
1,048	1,029-32	1,034	1,036-37	1,026	1,030-33	1,029			
1,050	1,030-31	1,036	1,039	1,026	1,040-42	1,042			
1,050	1,033-35	1,036-37	1,036	1,024	1,039-41	—			
1,050	1,031-33	1,034	1,037	1,022	1,035-44	1,056			
tox.	+++	tox. +	++	+++	p.m.+++	Hyp. +			
1,050	1,037	1,039	1,040-42		1,038-42	0,9			
1,049	1,036	1,039-40	1,040		1,042	0,8-1,045			
1,050	1,037	1,039	1,046		1,040	0,8-1,046			
1,050	1,036	1,039	1,045		1,030-38	0,9			
1,049	1,035	1,040	1,044		1,041	1,002			
pr. +	++	+++	++		p.m. +	+			
1,037	1,046	1,043	1,042		0,85-0,9				
1,035	1,044	1,041	1,041		0,9-0,95				
1,036	1,044	1,041	1,038		0,95-1,0				
1,037	1,039	1,045	1,044		0,95-1,0				
1,035	1,041	1,045	1,042		0,90-0,95				
f.c.	+	+	++		++ 2 j.				
1,039	1,031	1,039			1,048				
1,040	1,031	1,037-42			1,046				
1,042	1,034	1,045			1,048				
1,040	1,032	1,042			1,042				
1,042	1,032	1,045			1,046				
pr.	+	++			p.m. ++				
	1,030				1,041				
	1,029				1,044				
	1,035				1,042				
	1,030				0,95				
	1,036				1,040				
	+				+				
					1,037				
					1,035				
					1,035				
					1,034				
					1,033				
					+				
					1,035				
					1,037				
					0,9				
					0,9				
					0,9				
					+				

+ à +++ : intensité des signes d'asphyxie. a) abortus, b) prématures, f.c.: abortus.
hyp.: hypermature. tox.: toxicose. p.m.: pneumonose néonatale.

éventuel nous paraissent si étroitement liés qu'il serait utile de disposer d'un moyen d'évaluer la gravité de l'anoxie, en se basant sur une manifestation certainement asphyxique; la limite entre ces deux phénomènes restera floue, car il est probable que les mêmes facteurs engendrent l'un et l'autre.

L'apparition de mouvements respiratoires *in utero* — si l'on exclut les réflexes cutanés — est due avant tout à l'anoxémie. La mesure, même approximative, de l'importance de l'aspiration, nous permet d'apprécier la gravité de l'asphyxie. Cette évaluation peut se faire de trois façons.

a) *Méthode histologique.* — La constatation d'une docimasia négative paradoxale [Sorba] assure le diagnostic d'aspiration chez le mort-né. La détermination quantitative implique, soit la mesure du diamètre alvéolaire moyen, soit l'estimation (très subjective) de la quantité d'éléments amniotiques figurés aspirés [Ahvenainen].

b) *Méthode volumétrique.* — La baisse de la densité pulmonaire, si l'on connaît la densité du parenchyme atelectasié et celle du liquide amniotique, permet d'évaluer la quantité de liquide aspiré. On mesure le volume du poumon par immersion dans un cylindre gradué [Sorba], technique imprécise, ou par la balance hydrostatique, comme nous l'avons fait, technique lente, mais exacte.

c) *Docimasia densimétrique.* — Notre méthode dérive de celle de Van Slyke (mesure du taux des protides sanguins). On prépare une série de larges éprouvettes contenant une solution de CuSO_4 de concentration croissante, correspondant à des densités échelonnées de 1,080 à 1,0. Un premier fragment sert à une détermination approchée, le second à la mesure définitive. Le CuSO_4 provoque une coagulation en surface, empêchant un échange liquidien rapide entre le tissu et la solution. On obtient ainsi, aisément, la densité de nombreux prélèvements. Les contrôles montrent l'identité des résultats de la densimétrie et de la méthode volumétrique (mesures avec la balance hydrostatique). Le tableau I présente quelques chiffres.

Le tableau II compare les résultats de la densimétrie et de la volumétrie par immersion. On y voit également la formule




Fig. 1.

Dilatation progressive des bronches et des alvéoles correspondant à une baisse de la densité. (Grossissement moyen.)




Fig. 2.

Causes d'erreur.

Aération; pétéchie asphyxiques; aspiration de sang.
(Grossissement moyen.)

DOCIMASIE DENSIMÉTRIQUE II

Docimasie volumétrique et densimétrique

<i>Morts-nés</i>			
Poumon droit	D.V. 1,050	D.D. 1,041-43	Diff. 0,009
» gauche	1,075	1,042	0,033
Poumon droit	1,007	1,056-57	0,050
» gauche	1,115	1,057-62	0,047
<i>Nés vivants</i>			
Poumon droit	1,033	1,038-44	0,011
» gauche	1,023	1,030-44	0,021
Poumon droit	1,005	0,98-1,022	0,025
» gauche	0,985	0,96-1	0,025
<i>Réanimé</i>			
Poumon droit	0,987	1,045-50	0,063
» gauche	0,883	0,95	0,070

Formule

P : poids, V : volume, d : densité, ΔV : volume de liquide aspiré, l : liquide amniotique aspiré,
 p : poumon atelectasié, t : poumon après aspiration.

$$Pt = Pp + Pl, \quad Vt = Vp + \Delta V, \quad Pl = \Delta V \cdot dl, \quad \text{donc, } dt(Vp + \Delta V) = Vp \cdot dp + \Delta V \cdot dt$$

$$\text{ou } Vp \cdot dt + \Delta V \cdot dt = Vp \cdot dp + \Delta V \cdot dl \quad \text{ou } Vp(dt - dp) = \Delta V(dl - dt)$$

$$\text{donc } \frac{\Delta V}{Vp} = \frac{dt - dp}{dl - dt} = \frac{dp - dt}{dt - dl} \quad \text{ou, en \% de } Vp, \text{ comme } dp = 1,060 \text{ et } dl = 1,007$$

$$\frac{\Delta V \cdot 100}{Vp} = \frac{(1,060 - dt) \cdot 100}{dt - 1,007}$$

ce qui nous donne, par exemple, 0 % pour $dt = 1,060$; 23 % pour $dt = 1,050$; 60 % pour $dt = 1,040$;
 130 % pour $dt = 1,030$ et 307 % pour $dt = 1,020$.

qui permet de calculer le pourcentage de liquide aspiré à partir de la densité obtenue. La densité du liquide amniotique est connue (1,007), nous avons fixé celle du parenchyme atelectasié à 1,060 après plusieurs contrôles (en réalité, le poumon contient toujours un peu de liquide). L'importance de la stase sanguine n'a que peu d'influence, car la densité du sang fœtal oscille autour de 1,060¹. Nous avons pratiqué des injections intra-bronchiques de liquide de densité connue, sur le cadavre, et nous obtenons des chiffres comparables.

Nous avons également établi les corrélations avec l'histologie (fig. 1). La méthode n'est évidemment valable que pour un poumon non aéré. Il existe certaines causes d'erreur que seule l'histologie peut déceler (fig. 2) ; à gauche, quelques bulles d'air abaissent rapidement la densité du parenchyme atelectasié ; au centre, le chiffre résulte d'une combinaison d'hémorragies et

¹ Ces mesures ont été obligeamment effectuées par le Dr E. Perrotet, P.-D.

d'aspiration; à droite, la haute densité s'explique par l'aspiration de sang.

Résumé.

La docimasie densimétrique donne rapidement des résultats comparables à ceux de méthodes plus lentes. Elle permet l'examen de nombreux fragments. On peut, en l'utilisant, évaluer avec une approximation suffisante le pourcentage de liquide aspiré. La technique n'a pas de valeur s'il y a eu respiration ou insufflation.

Il existe des cas où l'importance des signes « asphyxiques » (pétéchies) et celle de l'aspiration concordent. Dans d'autres exemples, il y a discordance. Il est possible que ce fait soit dû à la dissociation des phénomènes asphyxiques et de choc ¹.

*Université de Genève.
Institut d'Anatomie Pathologique.*

AHVENAINEN, E. K., Academic dissertation, *Ann. Inst. Path.*, Helsinki, 1948.

GRUENWALD, P., *Arch. Ped.*, 67, 103, 1950.

SORBA, M., *Etudes de pathologie fœtale et néonatale*. F. Rouge & C^{ie}, Lausanne, 1948.

André Rey. — *Illusion d'arrière-plan par contraste entre figures opaques et figures colorées transparentes tracées sur verre* ².

Des figures simples, lignes ou points, tracées sur une lame de verre avec des encres plus ou moins opaques, permettent d'observer une illusion d'arrière-plan lorsque la lame est placée devant un écran lumineux. Les formes les moins opaques se situent alors en arrière des formes les plus opaques. Une série d'effets particuliers sont décrits en rapport avec le degré de proximité des figures à comparer, leur couleur, leur degré de transparence. On démontre que l'illusion exige, pour se produire, la présence de trois facteurs: l'un d'opacité, l'autre

¹ Une discussion détaillée de ce problème et des résultats obtenus fera l'objet d'une publication ultérieure.

² Pour plus de détails voir dans ce volume à la page 374.