

Carte de l'intensité totale du champ magnétique des Alpes liguro-piémontaises

Autor(en): **Froidevaux, P. / Guillaume, A.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Archives des sciences [1948-1980]**

Band (Jahr): **26 (1973)**

Heft 2

PDF erstellt am: **09.08.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-739924>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

CARTE DE L'INTENSITÉ TOTALE DU CHAMP MAGNÉTIQUE DES ALPES LIGURO-PIÉMONTAISES

PAR

P. FROIDEVAUX¹ et A. GUILLAUME¹

La prospection magnétique des Alpes liguro-piémontaises a permis d'obtenir la première carte du champ total de cette région et de calculer les écarts au champ IGRF.

MESURES; RÉDUCTIONS

Les mesures ont été faites en septembre-octobre 1972 avec un magnétomètre à double résonance, sensible à $0,01 \gamma$ (lecture en octal à $0,01 \gamma$ près), type ABRAGAM-SALVI (LETI du CEN de Grenoble; sonde du laboratoire de physique de l'ENS). L'intensité du champ total F a été mesurée en 300 stations réparties au mieux dans la zone étudiée. Une dizaine de lectures de F a été faite par station, en déplaçant chaque fois la sonde de quelques décimètres. La valeur de F prise en compte pour les calculs ultérieurs est la moyenne des lectures en chaque point.


Les corrections dues à la variation diurne ont été faites à partir des enregistrements de l'observatoire de Roburent, fournis par l'Istituto Geofisico et Geodetico de Gênes (composantes horizontales et verticales).


Les erreurs sur la valeur de F en chaque point sont principalement dues aux imprécisions des lectures sur les enregistrements d'observatoire. Au total, on peut estimer que les valeurs sont connues à 3 à 5 γ près pour chaque station.

Pour compenser les effets dus aux différences de niveau entre les stations, les valeurs de F ont été ramenées à une altitude moyenne (630 m); cette correction a été faite en admettant l'existence d'un gradient vertical moyen de $20 \gamma/\text{km}^2$.

¹ Laboratoire de tectonophysique, Université de Paris VI, 4, place Jussieu - 75230 Paris Cedex 05.

² Valeur communiquée par J. Le Mouel; le gradient moyen théorique trouvé pour cette région à partir des valeurs du champ IGRF est de $19 \gamma/\text{km}^2$.





RÉSULTATS

La carte du champ total (fig. 1), obtenue après les corrections citées plus haut, montre l'existence de deux maxima principaux associés à des gradients latéraux assez faibles (5 à 7 γ/km): l'un, d'environ 100 γ d'amplitude maximum se trouve au sud-ouest de Cuneo; il se prolonge vers le col de Tende et peut correspondre au corps géophysique d'Ivrée. L'autre maximum, d'amplitude environ 150 γ , se trouve au sud-ouest de Savone; sa partie orientale est dirigée nord-est-sud-ouest; la direction de sa partie occidentale est sensiblement normale à la précédente. Cette anomalie est associée à celle du secteur de Savone — Groupe de Voltri¹. D'autres maxima, avec forts gradients latéraux (30 à 50 γ/km) existent dans la région de Mondovi et au nord de Cuneo; ils sont dus à des structures relativement superficielles. Un groupe de minima se trouve d'autre part dans le secteur de Vintimille. Il est probablement associé au maximum mis en évidence par la carte aéro-magnétique de France dans la région Nice-Menton.

Les écarts entre le champ mesuré et le champ IGRF calculé pour chaque station à l'aide du programme écrit par le Coast and Geodetic Survey ont été déterminés (fig. 2). Les résiduelles ainsi obtenues correspondent à celles données par un lissage polynomial au deuxième ordre et mettent en relief les extrema décrits plus haut. De plus, un minimum (— 100 γ) à gradients latéraux faibles (anomalie régionale à l'échelle de la carte), existe à l'ouest-nord-ouest d'Imperia sous la zone des flyschs. Il pourrait correspondre à la grande zone de minimum située au sud de Digne et dirigée est-ouest.

Manuscrit reçu le 4 avril 1973.

¹ GUILLAUME, A.: *Thèse*, Paris, 1967 (CNRS A01622) et *Doc. Lab. géol. Fac. Sc.*, Lyon, 1969, t. 31; ALLAN, P. D. et MORELLI, C.: *Boll. di geof. theor. ed appl.*; 1971, XIII, n° 50.