

Un genre nouveau de Caesalpinieés du Gabon

Autor(en): **Pellegrin, François**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Boissiera : mémoires de botanique systématique**

Band (Jahr): **7 (1943)**

PDF erstellt am: **14.08.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-895656>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Un genre nouveau
de Caesalpiniées du Gabon

par

François PELLEGRIN
du Museum de Paris

(Manuscrit reçu le 8 décembre 1942)

L'administrateur en chef honoraire des Colonies, GEORGES LE TESTU, consacra la presque totalité de sa longue carrière coloniale au GABON. Justement convaincu que dans les pays tropicaux les richesses du sol et en particulier les ressources fournies par les végétaux sont plus importantes encore que dans les autres régions, il s'attacha, parallèlement à son rôle d'administrateur, à faire connaître la luxuriante végétation de cette colonie française et envoya, au service de Phanérogamie du Museum de PARIS, une très belle et très intéressante collection¹ M. JULES BERNARD, qui fut gouverneur du GABON, à l'encontre des usages administratifs, encouragea les recherches botaniques de LE TESTU. Ce fait exceptionnel méritait bien d'être rappelé et explique le nom choisi par LE TESTU pour notre nouveau genre : *Julbernardia*.

¹ Voir PELLEGRIN *La Flore du Mayombe* in *Mém. Soc. Linn. Normandie* (1924, 1928, 1938).

C'est une Caesalpiniee dont voici la description :

Julbernardia Pellegrin gen. nov.

Arbores inermes. Folia paripinnata, paucijuga, foliolis oppositis, coriaceis. Stipulae caducae. Inflorescentia paniculata laxa, multiflora, axillaris vel terminalis, brevis. Bracteae mox deciduae. Bracteolae 2 ad basin floris, suborbiculares, carinatae, oppositae, valvatae, alabastrum includentes, persistentes, velutinae. Receptaculum complanatum. Sepala 5, magna, subaequilonga, sed \pm lata, libera, imbricata. Petala 5, membranacea, eorum unum sepalis cir. aequilongum, longe unguiculatum, caetera minuta, anguste lanceolata, acuta. Stamina 9-10, longe exserta eorum unum liberum, caetera ima basi connata; antherae ellipticae versatiles. Ovarium sessile, 4-ovulatum; stylus filiformis; stigma capitellatum. Legumen (immaturum) oblongo-lineare, compressum, marginibus incrassetum. Semina (?).

Ce nouveau genre est voisin des *Berlinia* et des *Brachystegia*. Il se distingue des *Berlinia* par l'absence de tube calycinal et par la réduction de la corolle; il diffère aussi des *Brachystegia* et en particulier des *B.* du groupe *cynometroides* Harms, principalement par les 5 sépales bien développés et non très rudimentaires et par les pétales présents et non absents.

On distingue les espèces suivantes :

Folioles coriaces en \pm 4 paires; inflorescence axillaire, roux doré, moitié plus courte que la feuille; grand pétale de 9 mm., subauriculé, brusquement atténué en onglet de 3 mm., filets des étamines glabres . . **J. Hochreutineri**

Folioles minces en \pm 3 paires; inflorescence grise en longue panicule terminale de 15-20 cm.; grand pétale de 12 mm. obové, atténué progressivement à la base en onglet de 5 mm.; filets des deux étamines alternes avec le grand pétale \pm velus **J. ogoouensis**

Nous sommes heureux de dédier la première espèce de ce genre au savant botaniste genevois, le Professeur HOCHREUTNER, à l'occasion de son Jubilé, en remerciement à l'accueil si sympathique qu'il nous a toujours réservé depuis vingt-cinq ans, c'est-à-dire depuis mon premier passage à GENÈVE comme interné français lors de l'autre guerre.

Julbernardia Hochreutineri Pellegr. spec. nov. - Fig. 30.

Arbor; ramulis teretibus glabris. Folia paripinnata, 4-juga, foliolis oppositis, oblongis, subfalciformibus, basi cuneatis vel subrotundis, inaequalibus, apice attenuatis, breviter obtuse acuminatis, crasse coriaceis, glabris, 8-19 cm. longis, 3-6,5 cm. latis, breviter petiolulatis; costa crassa utrinque prominula, nervis 10 venisque tenue reticulatis utrinque conspicuis. Petiolus basi incrassatus, articulatus 12-15 cm. longus, subteres, supra profunde angusteque canaliculatus, glaber; petioluli 5 mm. longi, compressi, detorti, basi articulati. Stipulae caducae. Paniculae laxae, 12-15 cm. longae, axillares vel terminales, velutinae, flavae, multiflorae. Pedicelli usque 2-3 cm. longi, apice \pm compressi. Bracteae deltoideae, concavae, obtusae, extus velutinae, cir. 5 mm. longae, caducissimae. Bracteolae 2, valvatae, coriaceae, suborbiculares vel late ellipticae, apice rotundatae, extus breviter carinatae, utrinque velutinae, flavae, 12 mm. longae, 10 mm. latae. Sepala 5, libera, breviter imbricata, oblonga, obtuse mucronulata, cir. 8 mm. longa, 3 vel 5 mm. lata, subglabra sed margine dense ciliata. Petalum unum 9 mm. longum, membranaceum, limbo membranaceo subdeltoideo, obtuso, subauriculato, marginibus undulato, basi attenuato unguiculato, unguiculo crasso, subglabro, 3 mm. longo; petala 2 lateralia, lanceolata, 5 mm. longa, caetera 2, minuta. Stamina 9-10; filamenta anguste subulata, glabra; antherae ellipticae, dorsifixae. Ovarium sessile, ellipticum, apice oblique attenuatum, hirsutum; stylus filiformis, glaber, 1 cm. longus; stigma capitellatum. Fructus...

Fleurs en avril, juillet et octobre.

GABON : région de Lastoursville et Haute Ngounyé : Mbinzou (LE TESTU n. 7184, 7556 et 6543).




Fig. 30. *Julbernardia Hochreutineri* Pellegrin — 1: Port. — 2: Bractéole. — 3: Sépale. — 4: Le grand pétale et l'un des petits. — 5: Etamines encore recourbées et ovaire. — Le port est plus petit, les analyses plus grandes que nature.

Julbernardia ogoouensis Pellegr. spec. nov.

Affinis *J. Hochreutinero* a qua foliis, floribusque paullo recedit. Foliola 3-juga, submembranacea. Inflorescentia cinerea, multiflora, 15-20 cm. longa. Sepala subdeltoidea, eorum unum angustum. Petalum magnum, 12 mm. longum, anguste obovatum, basi sensim attenuatum, unguiculo 5 mm. longo, caetera petala 4, minuta. Stamina 10; filamenta 2 \pm villosula, caetera glabra. Ovarium mox glabrescens, ad marginem diu pilosum. Legumen (immaturum) oblongo-lineare, apice obliquum, compressum, marginibus incrassatis diu pilosum.

Fleurs en octobre.

GABON, région de Lastoursville : Lihouma (LE TESTU n. 7487).
