

# Angiospermae : Monocotyledones

Objektyp: **Chapter**

Zeitschrift: **Boissiera : mémoires de botanique systématique**

Band (Jahr): **12 (1966)**

PDF erstellt am: **11.09.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

● **Thuja orientalis** L.

Subspontané. Chine. Murs, bois. 4. Genève, falaises de Saint-Jean et bois de la Bâtie; Coligny; (pas signalé avant 1946).

**Juniperus communis** L.

subsp. **communis**

Coteaux arides, bois (Mesobromion ou Quercion pubescenti-petraeae). 4-5. Commun.

GNETINAE

*Ephedraceae*

● **Ephedra distachya** L.

subsp. **helvetica** (C. A. Meyer) Ascherson et Graebner (*E. helvetica* C. A. Meyer)

Introduit. Alpes. Murs. 4-5. Pas retrouvé récemment (Genève, boulevard Jacques-Dalcroze (anciennement rue des Casemates)-Saint-Antoine; pas signalé avant 1946, mais planté autour de 1930).

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONES

*Typhaceae*

**Typha minima** Hoppe

Sables humides (Phragmition). 4-5. Cartigny, boucle du Rhône; Chancy, embouchure du Longet jusque sur France; Russin, S de l'embouchure du Bouffard.

**T. angustifolia** L.

Marais, fossés (Phragmition). 6-7. Veyrier, Vessy (pas signalé avant 1942).

**T. latifolia** L.

Marais, fossés (Phragmition). 6-7. Commun.

✠ ? **T. Shuttleworthii** Koch et Sonder

Marais (Phragmition). 6-7. Pas retrouvé récemment; (jadis Anières, Les Golettes; Lancy, Saint-Georges).

*Sparganiaceae***Sparganium erectum** L. (*S. ramosum* Hudson)

subsp. **erectum** (subsp. *polyedrum* (Ascherson et Graebner) Schinz et Thell.;  
*S. ramosum* Hudson subsp. *polyedrum* Ascherson et Grabner);

subsp. **neglectum** (Beeby) Schinz et Thell. (*S. ramosum* Hudson subsp. *neglectum*  
(Beeby) Ascherson et Graebner)

Fossés, marais (Sparganio-Glycerion). 6-7. Commun.

✠ ? **S. emersum** Rehman (*S. simplex* Hudson)

subsp. **emersum**

Fossés, étangs (Phragmition). 6-7. Pas retrouvé récemment; (pas encore signalé,  
mais dans l'Herbier, échantillons anciens: Jussy, Sionnet; Choulex, Seimaz).

*Potamogetonaceae***Potamogeton densus** L.

Eaux stagnantes ou lentes (Ranunculion fluitantis). 7-8. Commun.

**P. crispus** L.

Eaux profondes (Potamion). 6-8. Lac, Rhône.

✠ ? **P. coloratus** Vahl (*P. plantagineus* DuRoi)

Marais et fossés à eau stagnante (Potamion ou Nymphaeion). 6-8. Disparu ?  
(jadis Meinier, Rouëlbeau; Anières, Les Golettes; Veyrier-Troinex).

**P. nodosus** Poiret (*P. fluitans* Roth)

Eaux stagnantes ou lentes (Ranunculion fluitantis). 7-8. Lac; (jadis Meinier,  
Rouëlbeau; Choulex).

**P. natans** L.

Etangs, mares. (Nymphaeion). 6-8. Assez commun, par ex.: Veyrier, Vessy.

**P. perfoliatus** L.

Eaux profondes et lentes (Potamion). 6-8. Commun dans le lac et le Rhône.

**P. lucens** L.

Lacs, fossés à eau un peu courante (Potamion). 7-8. Commun dans le lac et le  
Rhône; Veyrier, Vessy.

✠ **P. decipiens** Nolte (*P. lucens* × *perfoliatus*)

Pas retrouvé récemment (jadis lac et Rhône).

✠ ? *Potamogeton gramineus* L.

subsp. *gramineus*;

subsp. *heterophyllus* (Schreber) Schinz et Keller

Flaques d'eau (Ranunculion fluitantis). 7-8. Disparu ? (jadis Collonge-Bellerive, pointe de Bellerive; Genthod-Versoix).

✠ *P. nitens* Weber (*P. gramineus* × *perfoliatus*)

Genève, Port-Noir (pas signalé avant 1958).

**P. pectinatus** L.

subsp. *pectinatus*; var. *pectinatus*; var. *interruptus* Ascherson

Lac et flaques d'eau (Potamion ou Ranunculion fluitantis). 6-8. Lac et Rhône.

**P. helveticus** (G. Fischer) W. Koch (*P. pectinatus* var. *interruptus* Ascherson subvar. *vaginatus* (Turcz.) Aschershon et Graebner)

Eaux profondes ou tranquilles (Potamion ou Ranunculion fluitantis). 9-10. Lac et Rhône, pas de station connue; (pas encore signalé, mais dans l'Herbier, quelques échantillons anciens). A rechercher.

**P. pusillus** L.

Fossés, mares, eaux lentes (Potamion ou Ranunculion fluitantis). 6-8. Avusy, ancienne gravière; (jadis Genève, canal de la Coulouvrenière et Arve au bois de la Bâtie; Lancy, Saint-Georges; Plan-les-Ouates).

**P. panormitanus** Biv.

Eaux profondes (Potamion). 6-8. Lac (pas signalé avant 1937).

**Zannichellia palustris** L. (*Z. dentata* Willd.; *Z. tenuis* REUTER)

subsp. *palustris*

Eaux profondes et courantes, flaques (Potamion ou Ranunculion fluitantis). 6-10. Lac et Rhône.

*Najadaceae*✠ *Najas minor* All. (*Caulinia fragilis* Willd.)

Mares (Ranunculion fluitantis). 7-9. Disparu (jadis Genthod-Versoix).

*Juncaginaceae*✠ *Triglochin palustris* L.

Prés marécageux (*Caricion canescenti-fuscae*). 6-7. Disparu (jadis Meinier, Rouëlbeau).

*Alismataceae***Alisma Plantago-aquatica** L. (*A. Plantago* L.)

Fossés, marais (Phragmition). 6-8. Commun.

**A. lanceolatum** With. (*A. Plantago-aquatica* var. *lanceolatum* (With.) Gren. et Godron)

Fossés, marais (Phragmition). 6-8. Commun.

**Baldellia ranunculoides** (L.) Parl. (*Echinodorus ranunculoides* (L.) Engelm.)

Fossés, mares (Phragmition). 6-7. Veyrier, Vessy; (jadis plus commun).

✠? **Sagittaria sagittifolia** L.

Mares (Phragmition). 6-8. Pas retrouvé récemment; (Veyrier, Vessy, 1940; Cartigny, Petite-Grave, 1940).

*Butomaceae***Butomus umbellatus** L.

Bords des eaux, fossés (Phragmition ou Senecion fluviatilis). 6-7. Rhône, par ex.: Bernex; Aire-la-Ville; Avully; Russin; (se répandant rapidement depuis la construction du barrage de Verbois. Récemment Genthod, anse fermée du lac, introduit. Station détruite).

*Hydrocharitaceae***Anacharis canadensis** (L. C. M. Richard) Planchon (*Elodea canadensis* L. C. M. Richard)

Adventice et naturalisé. Am. Nord. Eaux lentes ou stagnantes (Potamion ou Ranunculion fluitantis). 6-8. Commun dans le lac et le Rhône; Carouge, canal; (pas signalé avant 1884).

● **Hydrocharis Morsus-ranae** L.

Introduit? Europe. Mares (Lemnion). 6-8. Pas retrouvé récemment; (Veyrier, Vessy, 1943. Pas d'échantillon dans l'Herbier).

*Gramineae*✠? **Oryza oryzoides** (L.) Brandza (*Leersia oryzoides* (L.) Swartz)

Fossés (Bidention). 8-9. Pas retrouvé récemment; (jadis Carouge, canal; Lancy, Aire).

**Typhoides arundinacea** (L.) Moench (*Phalaris arundinacea* L.)

subsp. **arundinacea**;

subsp. **picta** (L.) Janchen

Bords des eaux (Phragmition, Salicion Elaeagni ou Alno-Padion). 6-7. Assez commun, par ex.: Genève, quai des Eaux-Vives; Collonge-Bellerive, Pointe-à-la-Bise; Cartigny, boucle du Rhône; Satigny, Peney; Meyrin, bois du Lan; (jadis dans les grands marais).

● **Phalaris canariensis** L.

Adventice. Médit. Décombres, immondices. 7. Genève, La Treille, 1954; Coligny, Montalègre, 1946; Hermance, 1964; Lancy, La Praille, 1945; Vernier, Sables-d'Aïre, 1945.

● **Ph. paradoxa** L.

Adventice. Médit. Décombres, terrains vagues. 6-7. Disparu. (Genève, 1874-1886; Vandœuvres, 1876).

● **Ph. brachystachys** Link

Adventice. Médit. occ. Décombres, terrains vagues. 6-7. Disparu (Genève, les Pâquis, 1877).

**Anthoxanthum odoratum** L.

Prés, prairies, bois clairs (Arrenatherion ou Fraxino-Carpinion). 4-5. Très commun.

● **Sorghum halepense** (L.) Pers. (*Andropogon halepensis* (L.) Brot.)

Adventice. Médit. Décombres, terrains vagues, haies. 6-8. Genève, plusieurs colonies, 1946, 1948; Carouge, 1946; Plan-les-Ouates, route de Saconnex-d'Arve, 1948; (pas signalé avant 1946).

● **S. bicolor** (L.) Moench (*S. vulgare* Pers.)

Adventice. Afrique. Décombres, immondices, 7-9. Vernier, Sables-d'Aïre, 1949; (Genève, 1885).

**Bothriochloa Ischaemum** (L.) Keng (*Andropogon Ischaemum* L.)

Gazons secs, coteaux (Xerobromion). 7-9. Genève, Rhône; Soral, gravière et moulin de la Grave; Avusy; Chancy, La Malotte; Russin, Allondon; Satigny, Peney (station déjà indiquée par REUTER).

● **Miscanthus sinensis** Andersson

Subspontané. Asie. Terrains vagues, décombres. Ne fleurissant pas souvent. Vernier, Châtelaine, ch. Ph.-Sauvage, 1945 (pas signalé avant 1945).

● **Zea Mays** M. plusieurs cultivars

Cultivé et subspontané. Am. trop. Cultures, décombres. 7-8. Satigny, bois de Bay, 1945.

● **Panicum miliaceum** L.

Subspontané. Asie. Décombres, immondices. 7-9. Coligny, Montalègre, 1946; Lancy, Bachet-de-Pesay, 1946; Dardagny, La Plaine, 1945; Vernier, Sables-d'Aïre, 1948.

● **Panicum capillare** L.

Adventice. Am. Décombres, immondices, cultures. 7-9. Genève, Jonction, 1940; Lancy, La Praille; Plan-les-Ouates, route de Saconnex-d'Arve, 1948; Vernier, Sables-d'Aire, 1946; (pas signalé avant 1876).

**Echinochloa Crus-galli** (L.) Beauv. (*Panicum Crus-galli* L.)

Chemins, décombres, fossés, champs humides (Polygono-Chenopodion polyspermi, Sisymbrium, Calthion ou Bidention). 7-9. Commun.

**Digitaria sanguinalis** (L.) Scop. (*Panicum sanguinale* L.)

subsp. **pectiniformis** Henrard

Lieux cultivés, décombres, chemins (Polygono-Chenopodion polyspermi, Sisymbrium ou Polygonion avicularis). 7-9. Commun.

**D. Ishaemum** (Schreber) Schreber ex Muhl. (*Panicum Ischaemum* Schreber; *P. glabrum* Gaudin)

Champs, lieux cultivés (Polygono-Chenopodion polyspermi ou Polygonion avicularis). 7-9. Assez commun, par ex.: Genève, Perle-du-Lac; Chêne-Bourg, gare; Cologny, Montalègre.

● **Paspalum distichum** L.

subsp. **Digitaria** (Poiret) Ascherson et Graebner

Adventice. Am. Terrains vagues. 8-10. Chêne-Bourg, av. de Bel-Air, 1946 (pas signalé avant 1946).

● **Oplismenus undulatifolius** (Ard.) Roemer et Schultes

Introduit ou adventice. Eurasie. Lieux ombragés 7-9. Chancy, plusieurs colonies; (pas signalé avant 1966).

**Setaria verticillata** (L.) Beauv.

Champs, décombres (Polygono-Chenopodion polyspermi ou Sisymbrium). 7-9. Assez commun, par ex.: Thônex; Cologny, Montalègre-Ruth; Carouge, ch. de la Chapelle; Bernex, Lully.

**S. glauca** (L.) Beauv.

Cultures, champs, décombres (Polygono-Chenopodion polyspermi ou Eragrostidion). 7-9. Assez commun, par ex.: Perly-Certoux; Chancy; Vernier.

● **S. decipiens** Schimper (*S. ambigua* Guss.)

Adventice. S-O de l'Europe. Décombres. 8-10. Genève, ch. Sous-Terre; Anières-Hermance; (pas signalé avant 1884).

**S. viridis** (L.) Beauv.

Cultures, champs après la moisson (Polygono-Chenopodion polyspermi, Sisymbrium ou Caucalion). 7-9. Très commun.

● **Setaria italica** (L.) Beauv.

subsp. **italica**

Subspontané. Indes or. Cultures, décombres, immondices. 7-8. Genève, Sécheron, 1947; Cognoy, Montalègre-Ruth, 1947; Hermance, 1964; Vernier, Sables-d'Aire, 1956.

● **Pennisetum villosum** R. Br.

Adventice. Afrique. Décombres. 6-9. Pas retrouvé récemment (Genève, 1885).

**Cynodon Dactylon** (L.) Pers.

Lieux sablonneux et chauds, chemins (Polygonion avicularis ou Polygono-Chenopodion polyspermi). 7-9. Commun.

**Milium effusum** L.

Bois (Fraxino-Carpinion). 5-7. Onex, Rhône; Versoix (jadis Satigny, bois de Bay).

**Achnatherum Calamagrostis** (L.) Beauv. (*Stipa Calamagrostis* (L.) Wahlenb.; *Lasia-grostis Calamagrostis* (Link)

Terrains pierreux (Stipion Calamagrostis ou Epilobion Fleischeri). 6-7. Chêne-Bougeries, Conche; Cartigny, boucle du Rhône; (pas signalé avant 1947).

● **Heleochloa schoenoides** (L.) Host (*Crypsis schoenoides* Lam.)

Adventice. Europe mérid. et Asie occ. Décombres. 8-10. Pas retrouvé récemment (Vernier, Châtelaine, 1886).

● **Alopecurus utriculatus** (L.) Solander

Adventice. Médit. Décombres. 5-6. Pas retrouvé récemment (Carouge, 1876-1884).

**A. myosuroides** Hudson (*A. agrestis* L.)

Champs, vignes (Aphanion ou Eragrostidion). 4-9. Commun.

**A. pratensis** L.

Prés humides (Arrhenatherion, Calthion ou Molinion). 5-6. Jussy, bois Devant; Veyrier, Vessy; Onex, Gros-Chêne.

**A. geniculatus** L.

Fossés, bords des eaux (Agropyro-Rumicium). 6-8. Satigny, Château-des-Bois; (jadis Choulex; Jussy, Sionnet; Plan-les-Ouates).

**A. aequalis** Sobolewsky (*A. fulvus* Sm.)

Fossés, bords des eaux (Bidention ou Littorellion). 5-7. Cartigny, Petite-Grave; (jadis Collonge-Bellerive; Versoix).



**Phleum paniculatum** Hudson (*Ph. asperum* Jacq.)

Terrains pierreux, vignes, champs (Polygono-Chenopodion polyspermi). 5-6. Pas de station connue (jadis Chêne-Bougeries, Conche; Choulex; Bardonnex, Compesières; Satigny, Peney; Vernier; Genthod-Versoix).

**Ph. phleoides** (L.) Karsten (*Ph. Boehmeri* Wibel)

Coteaux secs (Xerobromion). 6-7. Pas de station connue (jadis Thônex, Villette; Veyrier; Avusy; Satigny, Peney; Genthod).

**Ph. pratense** L.

Prairies (Arrhenatherion). 6-7. Très commun.

**Apera Spica-venti** (L.) Beauv. (*Agrostis Spica-venti* L.): var. **Spica-venti**; var. **purpurea** Gaudin (*A. purpurea* Gaudin)

Moissons, décombres (Caucalion ou Sisymbriion). 6-7. Commun.

**A. interrupta** (L.) Beauv. (*Agrostis interrupta* L.)

Lieux sablonneux, moissons (Sisymbriion ou Caucalion). 6. Lancy, La Chapelle; Vernier, Sables-d'Aïre; (jadis Chancy; Genthod, Creux-de-Genthod).

**Agrostis stolonifera** L.

subsp. **prorepens** Koch: var. **prorepens** (*A. alba* L. var. *prorepens* (Koch) Ascherson; *A. alba* var. *decumbens* Gaudin); var. **palustris** (Hudson) Farwell (*A. alba* L. var. *pallens* Gaudin)

Marais, chemins, champs (Agropyro-Rumicion, Polygono-Chenopodion polyspermi ou Aphanion). 6-8. Commun.

**A. gigantea** Roth (*A. alba* L. var. *gigantea* Koch; *A. alba* var. *major* Gaudin)

Marais, chemins (Calthion, Molinion, Phragmition ou Stipion Calamagrostis). 6-7. Commun.

**A. tenuis** Sibth. (*A. capillaris* L.; *A. vulgaris* With.)

subsp. **tenuis**

Prés secs, clairières (Arrhenatherion ou Epilobion angustifolii). 6-8. Commun.

**A. canina** L.: var. **canina** (var. *genuina* Godron et Gren.); var. **mutica** Gaudin; var. **planifolia** C. Schröter

Bois humides (Fraxino-Carpinion ou Caricion canescenti-fuscae). 6-7. Pas de station connue (jadis Genève, bois de la Bâtie; Veyrier; Lancy, Saint-Georges; Vernier, bois des Frères; Meyrin; Bellevue; Colovrex).

**Calamagrostis varia** (Schrad.) Host (*C. montana* DC.)

Bois (Fraxino-Carpinion). 7-8. Bernex, nant de Lagnon (station déjà indiquée par REUTER; jadis Genève, bois de la Bâtie).

✠ **Calamagrostis canescens** (Weber) Roth (*C. lanceolata* Roth)

Prés marécageux (Magnocaricion). 6-8. Disparu (jadis Meinier, Rouëlbeau).

**C. Epigeios** (L.) Roth

Bords des eaux, décombres (Salicion Elaeagni et albae, Molinion ou Onopordion). 7-8. Arve et Rhône, par ex.: Genève, Bout-du-Monde; Cartigny, boucle du Rhône; Satigny, gare (adventice), 1948.

**C. Pseudophragmites** (Haller fil.) Koeler emend. Baumg. (*C. littorea* DC.)

Bords des eaux (Epilobion Fleischeri ou Salicion). 6-8. Arve et Rhône.

● **Gastridium ventricosum** (Gouan) Schinz et Thell. (*Agrostis australis* Rouy)

Adventice. Europe. Champs, moissons. 7-10. Pas retrouvé récemment (jadis assez commun).

**Holcus lanatus** L.

Prairies, champs, prés marécageux, lieux incultes (Arrhenatherion, Molinion ou Sisymbriion). 5-7. Très commun.

**H. mollis** L.

Bois clairs, champs (Fraxino-Carpinion ou Calluno-Genistion). 6-8. Commun.

**Arrhenatherum elatius** (L.) J. et C. Presl

Prairies, talus (Arrhenatherion). 6-8. Très commun.

**Avena fatua** L.

Moissons, décombres (Caucalion, Polygono-Chenopodion polyspermi ou Sisymbriion). 6-8. Bernex, Lully; Satigny, Peney.

✠ **A. vilis** Wallr. (*A. fatua* × *sativa*) (*A. hybrida* Peterm.)

Anières-Hermance, la Gravière, 1944 (pas d'échantillons dans l'Herbier).

● **A. sativa** L.subsp. **sativa**

Cultivé et parfois subspontané. Médit. et S-O de l'Asie. Décombres, immondices. 6-7. Onex, ch. des Bossons, 1950; Bellevue, Les Tuileries, 1943;

subsp. **contracta** (Neilr.) Čelak. (subsp. *orientalis* (Schreber) Werner; *A. orientalis* Schreber)

Cultivé? S-O de l'Asie. 6-7. Pas retrouvé récemment (jadis cultivé).

● **A. sterilis** L. (*A. byzantina* C. Koch)

Adventice. Médit. Ballast. 5-6. Genève, gare de marchandises, 1945 (pas signalé avant 1945).

**Helictotrichon pubescens** (Hudson) Pilger (*Avena pubescens* L.)

Prés secs (Mesobromion ou Arrhenatherion). 5-6. Commun.

**H. pratense** (L.) Pilger (*Avena pratensis* L.)

Coteaux secs (Mesobromion). 5-7. Pas de station connue (jadis Collonge-Bellerive; Vernier, bois des Frères).

**Trisetum flavescens** (L.) Beauv.

Prairies (Arrhenatherion). 5-7. Commun.

**Aira caryophyllea** L.

subsp. **caryophyllea**; (subsp. *eu-caryophyllea* Becherer);

subsp. **multiculmis** (Dumort.) Hegi (var. *major* Gaudin; *A. aggregata* Timmer. ex Boreau)

Terrains sablonneux (Alyso-Sedion ou Xerobromion). 5-6. Russin, Vers-Ginge; (jadis Genève, bois de la Bâtie; Collonge-Bellerive; Bernex; Satigny; Vernier; Meyrin; Bellevue, Colovrex).

● **A. elegans** Willd.

Adventice. Médit. Décombres. 5-6. Pas retrouvé récemment (Cologne, Frontenex, 1877; Vernier, Châtelaine, 1883).

● **Polypogon monspeliensis** (L.) Desf.

Adventice. Europe mérid. Décombres, immondices. 6-7. Pas retrouvé récemment (jadis Cologne, Frontenex; Veyrier, route de Pinchat).

**Deschampsia caespitosa** (L.) Beauv.

Bois, bords des eaux (Alno-Padion, Fraxino-Carpinion ou Calthion). 7-8. Arve et Rhône; Vernier, Montfleury; (jadis plus commun).

**D. litoralis** (Gaudin) Reuter

Bords des eaux (Calthion). 5-6. Pas de station connue (jadis assez commun).

**Sieglingia decumbens** (L.) Bernh.

Elément montagnard. Marais, lieux argileux (Mesobromion ou Molinion). 5-7. Pas de station connue (jadis Meinier; Veyrier; Troinex; Bernex; Dardagny; Vernier).

**Gaudinia fragilis** (L.) Beauv.

Prés secs, chemins (Xerobromion). 5-6. Plan-les-Ouates; (jadis Genève; Jussy; Veyrier; Satigny; Vernier; Céligny).

**Sesleria varia** (Jacq.) Wettst. (*S. coerulea* (L.) Ard.)

Elément montagnard. Pentes calcaires ombragées au bord des eaux (Seslerion coeruleae). 3-4. Arve et Rhône, par ex.: Genève, bois de la Bâtie; Veyrier-Carouge.

**Phragmites communis** Trin. (*Ph. vulgaris* Trin.): var. **communis**; var. **flavescens** (Custer) Schinz et Thell.

Bords des eaux, lieux humides (Phragmition ou Alnion glutinosae). 8-9. Var. *communis*, commun; var. *flavescens*, Bellevue, La Tuilerie.

● **Arundo Donax** L. (*Scolochloa Donax* (L.) Gaudin)

Introduit. Médit. Bords des eaux. 8-10. Aire-la-Ville, barrage de Verbois; Dardagny, bisse de l'Allondon; (pas signalé avant 1951).

**Molinia coerulea** (L.) Moench (*Molinia coerulea* (L.) Moench var. *genuina* Ascherson et Graebner)

Prairies humides, fossés, bois humides (Molinion, Mesobromion ou Fraxino-Carpinion). 7-8. Commun.

**M. arundinacea** Schrank var. **litoralis** (Host) Grabherr (*M. litoralis* Host)

Prairies humides, fossés, bords des eaux (Molinion ou Calthion). 8-9. Commun.

**Melica ciliata** L. (*M. nebrodensis* Parl.)

Lieux chauds et rocailleux (Potentillion caulescentis). 5-6. Genève, falaises de Saint-Jean; Dardagny, pont des Granges; (jadis Genève, bois de la Bâtie).

**M. nutans** L.

Bois (Fraxino-Carpinion). 4-5. Assez commun, par ex.: Plan-les-Ouates; Cartigny; Satigny; Collex-Bossy.

**M. uniflora** Retz.

Bois (Fraxino-Carpinion). 5-6. Assez commun, par ex.: Genève, ch. de la Florence; Jussy; Veyrier; Avully, Epeisses; Bellevue, bois du Vengeron.

● **Koeleria Gerardii** (Vill.) Shinnars (*K. phleoides* (Vill.) Pers.)

Adventice. Médit. or. Lieux incultes. 5-6. Russin, en aval de Verbois, 1952; Satigny, gare, 1947; Vernier, Sables-d'Aïre, 1956; (pas signalé avant 1877).

**K. pyramidata** (Lam.) Beauv. (*K. cristata* (L.) Pers.)

Prés secs, coteaux arides (Xerobromion). 5-6. Assez commun, par ex.: Chancy; Dardagny-Russin, Allondon; Satigny, Peney.

**K. macrantha** (Ledeb.) Sprengel (*K. cristata* (L.) Pers. subsp. *gracilis* (Pers.) Ascherson et Graebner)

subsp. **macrantha**

Prés secs, coteaux arides (Xerobromion). 5-6. Avusy (pas encore signalé).

● **K. panicea** (Lam.) Domin

Adventice. Médit. occ. Lieux incultes. 6-9. Dardagny, La Plaine, gare, 1945 (pas signalé avant 1945).

**Eragrostis pilosa** (L.) Beauv.

Chemins, terrains vagues. (Polygonion avicularis ou Sisymbrium). 7-8. Chêne-Bourg, ch. Hutins-des-Bois; Choulex, château de Miolans; Carouge, La Fontenette.

**E. poaeoides** Beauv. (*E. minor* Host)

Chemins, terrains sablonneux (Eragrostidion, Polygonion avicularis ou Sisymbrium). 7-8. Assez commun, par ex.: Genève, Jardin des Bastions; Chêne-Bourg; Lancy, Bachet-de-Pesay; Vernier, Sables-d'Aïre.

● **E. megastachya** (Koeler) Link (*E. cilianensis* (All.) Vignolo-Lutati)

Adventice. Eurasie. Chemins, terrains sablonneux. 7-9. Pas retrouvé récemment (jadis Genève; Avusy; Vernier, Aïre).

**Dactylis glomerata** L.

Prairies, chemins (Arrhenatherion ou Mesobromion). 5-8. Très commun.

**Poa bulbosa** L.: var. **bulbosa**; var. **vivipara** Koeler.

Lieux secs, chemins (Alyso-Sedion ou Sisymbrium). 4-5. Commun.

**P. compressa** L.subs. **compressa**

Champs, chemins sablonneux, murs (Alyso-Sedion ou Sisymbrium). 6-7. Assez commun, par ex.: Chêne-Bourg, gare; Confignon; Aire-la-Ville, Verbois; Avully, Epeisses; Vernier, bois des Frères.

**P. trivialis** L.

Prairies fertiles, graviers parfois inondés (Calthion, Arrhenatherion ou Molinion). 6-7. Commun.

**P. pratensis** L.subsp. **pratensis**;subsp. **angustifolia** (L.) Gaudin

Prairies, prés humides, chemins (Arrhenatherion ou Molinion). 5-6. Très commun.

**P. annua** L.

Pelouses, chemins, cultures (Polygono-Chenopodion polyspermi, Polygonion avicularis ou Arrhenatherion). 1-12. Très commun.

**P. nemoralis** L.

Bois (Fraxino-Carpinion). 6-7. Commun.

✠? **P. palustris** L.

Prairies humides, fossés (Phragmition, Magnocaricion ou Calthion). 6-7. Disparu? (Jamais signalé dans le canton, mais dans l'Herbier, un échantillon de Versoix, 1875).

**Briza media** L.

Prés secs (Xerobromion, Mesobromion ou Arrhenatherion). 5-7. Très commun.

**Catabrosa aquatica** (L.) Beauv.

Fossés, graviers au bord des eaux (Bidention ou Glycerio-Sparganion). 6-9. Veyrier, Vessy (jadis plus commun).

**Glyceria fluitans** (L.) R. Br.

Marais, fossés, rivières lentes (Phragmition ou Sparganio-Glycerion). 6-9. Assez commun, par ex.: Cartigny, Petite-Grave.

**G. plicata** Fries

Marais, fossés, rivières lentes (Sparganio-Glycerion ou Bidention). 6-9. Commun.

**G. striata** (Lam.) Hitchcock var. **stricta** (Schribner) Fernald

Adventice et naturalisé. Am. Nord. Prés marécageux (Molinion ou Calthion). 5-7. Meyrin, réserve de Mategnin (extension de l'importante colonie à Prévessin, Ain, découverte en 1952 seulement, et nouveau pour la Suisse à cette date).

● **Puccinellia distans** (Jacq.) Parl.

Adventice. Eurasie. Fossés. 7-8. Disparu (Vernier, Châtelaine, 1889).

● **Vulpia ciliata** (Danthoine) Link

Adventice. médit. Lieux sablonneux, décombres, ballast. 5. Genève, route de Lausanne (ch. du Foyer), 1948; Chêne-Bourg, gare et route de Jussy, 1948; Vernier, Sables-d'Aire, 1948; Versoix, gare, 1949; (station des Sables-d'Aire déjà indiquée par REUTER).

**V. Myuros** (L.) C. C. Gmelin (*V. Pseudomyuros* Gay)

Lieux sablonneux incultes (Sisymbriion ou Onopordion). 5-7. Cologny, lac, 1949; Russin, Rhône, 1950, 1951; (jadis Genève, Champel; Satigny, Peney; Genthod-Versoix).

**V. bromoides** (L.) S. F. Gray (*V. sciuroides* C. C. Gmelin)

Lieux incultes, terrains vagues (Sisymbriion ou Onopordion). 5-7. Chêne-Bourg, ch. des Deux-Communes, 1948; (jadis Genève, bois de la Bâtie; Satigny, Château-des-Bois).

● **V. incrassata** (Lam.) Parl.

Adventice. Médit. occ. Lieux incultes, décombres. 6-7. Disparu (Genève, les Pâquis, 1874).

● **Festuca maritima** L. (*Nardurus tenellus* Reichenb.)

Adventice. Médit. Lieux incultes, ballast, champs graveleux. 5-6. Chêne-Bourg, gare, 1950-1951; (jadis Genthod-Versoix).

**Festuca gigantea** (L.) Vill.

Bois, bords des eaux (Alno-Padion). 6-8. Arve et Rhône.

**F. pratensis** Hudson

Prairies, chemins (Arrhenatherion ou Mesobromion). 5-7. Très commun.

**F. arundinacea** Schreber

Lieux ombragés, bords des eaux (Alno-Padion). 6-7. Commun.

**F. glauca** Lam. (*F. ovina* L. var. *glauca* Koch)subsp. **glauca**

Lieux chauds et graveleux (Xerobromion ou Berberidion). 6-7. Satigny, bois de Bay (station déjà indiquée par REUTER).

**F. ovina** L. (*F. ovina* L. var. *vulgaris* Koch)

Prés secs, coteaux, bois clairs (Xerobromion, Quercion pubescenti-petraeae, Fraxino-Carpinion ou Berberidion). 5-7. Pas de station connue (dans l'Herbier, échantillons de Genève, Jonction; Veyrier; Satigny, bois de Bay).

**F. tenuifolia** Sibth. (*F. ovina* L. subsp. *tenuifolia* (Sibth.) Duby; *F. ovina* L. subsp. *capillata* (Lam.) Hackel; *F. capillata* Lam.)

Bois (Quercion pubescenti-petraeae ou Fraxino-Carpinion). 5-6. Assez commun, par ex.: Veyrier, bois de Veyrier; Onex.

**F. trachyphylla** (Hackel) Krajina (*F. ovina* L. var. *duriuscula* (L.) Hooker; *F. duriuscula* L.)

Prés secs et arides (Mesobromion ou Berberidion). 5-6. Assez commun, par ex.: Aire-la-Ville; Avusy; Chancy; (REUTER l'indiquait comme très commun).

**F. rubra** L.subsp. **rubra**;subsp. **trichophylla** (Ducros) Gaudin

Gazons, chemins, gravières, lisières des bois (Xerobromion, Mesobromion ou Berberidion). 5-8. Commun.

**F. heterophylla** Lam.

Bois clairs (Fraxino-Carpinion ou Quercion pubescenti-petraeae). 6-7. Assez commun, par ex.: Veyrier, Onex.

**Scelopoa rigida** (L.) Griseb.

Lieux secs, chemins, ballast (Polygonion avicularis ou Sisymbrium). 5-7. Genève, jardin des Bastions et Petit-Saconnex; Chêne-Bougeries, av. Sismondi; Chêne-Bourg, gare; Lancy, Saint-Georges; Soral, la Laire et gravière de Ségzin.

**Cynosurus cristatus** L.

Prairies, prés secs, gazons (Arrhenatherion ou Mesobromion). 6-7. Commun.

● **Cynosurus echinatus** L.

Adventice. Médit. Lieux incultes, décombres. 5-7. Pas retrouvé récemment (jadis autour de Genève).

**Bromus ramosus** Hudson (*B. asper* L.)

subsp. **ramosus**

Bois (Fraxino-Carpinion). 6-8. Assez commun, par ex.: Veyrier, bois de Veyrier (pas signalé avant 1944, mais plusieurs échantillons plus anciens dans l'Herbier, le plus ancien de 1847).

**B. asper** Murray emend. Beneken (*B. ramosus* subsp. *Benekenii* (Lange) Schinz et Thell.; *B. Benekenii* (Lange) Trimen)

Bois, haies (Fraxino-Carpinion). 6-7. Plan-les-Ouates, bois du Milly (pas indiqué avant 1946. Pas d'échantillon de Genève dans l'Herbier).

**B. erectus** Hudson

subsp. **erectus**

Prés secs, prairies, chemins (Xerobromion, Mesobromion, Arrhenatherion ou Sisymbrium). 5-7. Très commun.

● **B. inermis** Leysser

Adventice. Eurasie. Chemins, haies. 6-7. Genève, Plainpalais, rue des Rois, 1953; Lancy, rampe de Saint-Georges, 1949; (pas signalé avant 1949).

**B. sterilis** L.

Lieux incultes, chemins (Sisymbrium). 5-6. Commun.

**B. tectorum** L.

Lieux incultes, chemins, ballast (Sisymbrium). 5-6. Assez commun, par ex.: Chêne-Bourg, gare).

● **B. madritensis** L.

Adventice. Médit. Lieux incultes, ballast. 4-6. Genève, gare de Marchandises, 1945; Chêne-Bourg, gare, 1947; (jadis Genève, les Pâquis).

● **B. villosus** Forskål (*B. rigidus* Roth)

Adventice. Médit. Lieux incultes. 4-5. Genève, Conservatoire botanique, 1941; (les Pâquis, 1877).

**B. secalinus** L.

subsp. **secalinus**

Prés, chemins, moissons (Aphanion ou Caucalion). 6-7. Pas de station connue (jadis Collonge-Bellerive, Vézenaz; Jussy, Sionnet; Meinier, Rouëlbeau; Veyrier; Genthod-Versoix).



**Bromus mollis** L (*B. hordeaceus* L.)

Champs, chemins (Arrhenatherion ou Sisymbriion). 5-6. Commun.

● **B. unioloïdes** (Willd.) Humb. et Kunth (*B. catharticus* Vahl)

Adventice. Am. Sud. Terrains vagues. 6-7. Lancy, La Praille, 1951 (pas signalé avant 1951).

**B. arvensis** L.

Graviers, ballast (Sisymbriion). 6-8. Chêne-Bourg, gare; Carouge, ch. de la Chapelle; Veyrier; (jadis Genève, Queue-d'Arve; Vernier, Châtelaïne; Versoix).

**B. commutatus** Schrader (*B. pratensis* Ehrh.)

Champs, prés, chemins, buissons (Aphanion ou Arrhenatherion). 5-6. Très commun.

● **B. squarrosus** L.: var. **squarrosus**; var. **villosus** (Gmelin) Koch

Adventice. Médit. Lieux incultes, décombres, ballast. 5-6. Chêne-Bourg, gare, 1948; Dardagny, La Plaine, gare, 1950; Vernier, Sables-d'Aïre, 1956; (Versoix, 1862).

● **B. lanceolatus** Roth (*B. macrostachys* Desf.)

Adventice. Médit. Lieux incultes, décombres. 6-7. Pas retrouvé récemment (jadis Genève, les Pâquis; Vernier, Châtelaïne; Meyrin, Feuillasse).

**Brachypodium pinnatum** (L.) Beauv. var. **glabrum** Graebner

Coteaux, lisières des bois (Mesobromion, Molinion ou Geranion sanguinei). 5-7. Très commun.

**B. sylvaticum** (Hudson) Beauv.: var. **glabrescens** Coss. et Germ.; var. **villosum** Lej. et Court.

Bois, lieux ombragés (Fraxino-Carpinion, Alno-Padion ou Quercion pubescenti-petraeae). 6-8. Commun.

**Agropyron caninum** (L.) Beauv.

Lieux ombragés, haies (Alno-Padion, Salicion albae ou Senecion fluviatilis). 6-7. Jussy; Carouge, La Chapelle; Onex; Bernex, Lully; Dardagny, Allondon; Vernier, Sables-d'Aïre; Versoix.

**A. repens** (L.) Beauv.subsp. **repens**

Chemins, haies, cultures (Agropyro-Rumicion, Alliarion ou Polygono-Chenopodion polyspermi). 6-7. Commun;

subsp. **litorale** (Host) Ascherson et Graebner (*A. litorale* (Host) Dumort.)

Chemins, bords des eaux (Agropyro-Rumicion). 6-7. Genève, Bout-du-Monde (pas encore signalé, mais constaté en 1946).

● **Agropyron intermedium** (Host) Beauv. (*A. campestre* Godron et Gren.)

subsp. **intermedium**

Adventice. Europe. Coteaux arides, chemins. 6-7. Pas retrouvé récemment (jadis Vernier, Aire; Genthod-Versoix; Céligny).

● **Triticum aestivum** L. (*T. vulgare* Vill.)

Cultivé et subspontané. Asie Mineure. Immondices. 5-6. Assez commun.

● **T. turgidum** L.

Cultivé. Asie Mineure. 6. Pas constaté récemment (planté pendant la guerre, par ex.: Onex; Russin).

● **Aegilops ovata** L.

Adventice. Médit. Lieux incultes. 5-6. Pas retrouvé récemment (Genève, les Pâquis, 1874).

● **Ae. cylindrica** Host

Adventice. Médit. or. Lieux incultes. 5-6. Chêne-Bourg, gare, 1947 (pas signalé avant 1947).

● **Ae. squarrosa** Roth

Adventice. Asie occ. Lieux incultes. 5-6. Pas retrouvé récemment (Genève, les Pâquis, 1876).

● **Secale cereale** L.

Cultivé. Iran. 6. Peu fréquent (jadis plus commun).

**Hordeum murinum** L.

subsp. **murinum**;

subsp. **leporinum** (Link) Ascherson et Graebner

Chemins, lieux incultes (Sisymbrium). 5-7. Commun.

**H. nodosum** L. (*H. secalinum* Schreber)

Prés secs, chemins (Xerobromion). 6. Plan-les-Ouates; (jadis Genève, Petit-Saconnex; Anières).

● **H. distichon** L.

subsp. **distichon**

Cultivé. Asie occ. 6. Pas constaté récemment (cultivé pendant la guerre, par ex.: Meinier, Carre-d'Amont).

● **H. vulgare** L.

subsp. **hexastichon** (L.) Čelak. (*H. hexastichum* L.)

Cultivé. Asie. 5-7. Assez commun.

● **Hordeum marinum** Hudson (*H. marinum* With.)

Adventice. Europe occ. et mérid. Lieux incultes, décombres. 5-6. Genève, rue de Lausanne, 1946; (jadis les Pâquis et Plainpalais; Cologny, Frontenex).

**Hordelymus europaeus** (L.) Jessen ex Harz (*Elymus europaeus* L.)

Élément montagnard. Bois (Fraxino-Carpinion). 6-7. Jussy, La Forêt (pas signalé avant 1948).

● **Lolium temulentum** L.

Adventice. Médit. Moissons, décombres. 6-7. Peu fréquent, par ex.: Genève, Sécheron, 1947; (jadis Jussy; Céligny).

● **L. multiflorum** Lam.: var. **longiaristatum** Ascherson et Graebner; var. **muticum** DC.

Cultivé et subsponané. Médit. Cultures, chemins. 6-9. Assez commun, par ex.: Genève, quai Turrettini-rue du Temple et Malagnou.

**L. perenne** L.: var. **cristatum** Döll.; var. **tenue** (L.) Sm.

Pelouses, chemins (Sisymbrien). 6-9. Très commun.

**L. rigidum** Gaudin in Reuter: (*L. strictum* C. Presl)

Champs secs, terrains caillouteux, moissons (Aphanion ou Caucalion). 5-6. Pas de station connue (REUTER l'indiquait comme assez commun).

● **Pseudosasa japonica** (Siebold et Zucc.) Makino (*Arundinaria japonica* Siebold et Zucc.)

Subsponané. Japon. Immondices. Fleurissant exceptionnellement. Chêne-Bougeries, falaise de l'Arve, 1966; Vernier, Sables-d'Aire, 1956; (pas signalé avant 1956).

*Cyperaceae*

✠? **Cyperus flavescens** L.

Marais (Magnocaricion). 7-9. Disparu? (Jadis Genève, Arve; Lancy, Bachet-de-Pesay; Chancy, Passeiry; Satigny, Chouilly; Genthod; Versoix).

**C. fuscus** L.

Marais (Nano-Cyperion). 7-9. Pas de station connue (jadis Genève, Queue-d'Arve; Collonge-Bellevue; Satigny; Genthod; Versoix).

● **C. longus** L.

Adventice. Médit. Prés marécageux. 7-9. Pas retrouvé récemment (jadis Cologny, Frontenex; Genthod; Versoix).

**Schoenus nigricans** L.

Prés marécageux (*Eriophorion latifolii* ou Molinion). 5-6. Chancy, La Malotte; (jadis dans les grands marais).

✠ **Rynchospora alba** (L.) Vahl

Chemins fangeux (Nanocyperion). 6-7. Disparu (jadis Genève; Jussy, Sionnet).

**Cladium Mariscus** (L.) Pohl (*Mariscus serratus* Gilib.)

Marais, bords des eaux (Magnocaricion). 6-7. Collonge-Bellerive, Pointe-à-la-Bise; Cartigny, boucle du Rhône; (jadis dans les grands marais).

**Eleocharis acicularis** (L.) Roemer et Schultes

Bords des eaux, lieux humides et ombragés (Littorellion ou Nanocyperion). 6-8. Collonge-Bellerive, Pointe-à-la-Bise; Aire-la-Ville, Verbois; (jadis Veyrier; Genthod-Versoix).

**E. palustris** (L.) Roemer et Schultes

subsp. **palustris** (subsp. *microcarpa* Walters);

subsp. **vulgaris** Walters

Prés marécageux, bords des eaux (Eriophorion latifolii ou Phragmition). 5-8. Assez commun, par ex.: Veyrier, Vessy; Cartigny, Petite-Grave; (jadis plus commun).

**E. uniglumis** (Link) Schultes (*E. palustris* subsp. *uniglumis* (Link) Hartman)

Prés marécageux, graviers humides (Magnocaricion, Eriophorion latifolii ou Nanocyperion). 5-8. Pas de localité connue (jadis Thônex; Collonge-Bellerive; Puplinge; Meinier; Anières; Satigny; Genthod; Versoix).

✠ **E. ovata** (Roth) Roemer et Schultes (*E. soloniensis* (Dubois) Hara)

Chemins fangeux dans les bois (Nanocyperion). 6-8. Disparu (jadis Vernier, bois des Frères; Versoix. Existait à proximité du canton, à Prévessin, Ain jusqu'en 1964). A rechercher.

✠ **Isolepis setacea** (L.) R. Br. (*Scirpus setaceus* L.)

Chemins fangeux dans les bois, grèves périodiquement inondées (Nanocyperion ou Littorellion). 6-8. Disparu (jadis Collonge-Bellerive; Bellevue, Colovrex; Collex-Bossy).

✠ ? **Schoenoplectus supinus** (L.) Palla (*Scirpus supinus* L.)

Grèves périodiquement inondées (Nanocyperion). 7-9. Pas retrouvé récemment (jadis Collonge-Bellerive, Pointe-à-la-Bise; Genthod-Versoix).

**S. lacustris** (L.) Palla (*Scirpus lacustris* L.)

Eaux stagnantes ou lentes (Phragmition). 6-8. Assez commun, par ex.: Collonge-Bellerive, Pointe-à-la-Bise; Cartigny, boucle du Rhône et Petite-Grave; (jadis plus commun).

**Schoenoplectus Tabernaemontani** (C. C. Gmelin) Palla (*Scirpus Tabernaemontani* Gmelin)

Eaux stagnantes ou lentes (Phragmition). 6-8. Pas de station connue (jadis Collonge-Bellerive, lac; Jussy, Sionnet; Meinier; Veyrier; Lancy, Aire).

◆ **S. triqueter** (L.) Palla

Jamais signalé, mais hybride *S. Tabernaemontani* × *triqueter* indiqué. A rechercher.

× **S. Scheuchzeri** (Brügger) Palla (*S. Tabernaemontani* × *triqueter*)

Pas retrouvé récemment (Collonge-Bellerive, Pointe-à-la-Bise, 1920).

✠ **Holoschoenus romanus** (L.) Fritsch (*H. vulgaris* Link; *Scirpus Holoschoenus* L.): var. **vulgaris** (Koch) (*S. Holoschoenus* L. var. *vulgaris* Koch); var. **macrostachyus** (Husnot) (*S. Holoschoenus* L. var. *macrostachyus* (Husnot) Becherer)

Bords des eaux, sables humides (Agropyro-Rumicion ou Phragmition). 6-8. Disparu (jadis Genthod-Versoix, lac).

**Bolboschoenus maritimus** (L.) Palla (*Scirpus maritimus* L.)

Mares, prés humides (Phragmition). 6-9. Veyrier, Vessy; Onex, Aire; (station de Vessy existant au moins depuis 1891, échantillons d'herbier de cette date; jadis Meyrin, route de Châtelaine).

**Scirpus sylvaticus** L.

Bords des eaux (Calthion ou Alno-Padion). 5-7. Onex, Aire; Bernex, Aire; Dardagny, La Plaine, de Forge à Moulin; (jadis Collonge-Bellerive, La Belotte; Meinier, Rouëlbeau; Satigny; Vernier; Pregny-Chambésy-Bellevue, Vengeron).

✠ ? **Eriophorum angustifolium** Honckeny

Prés marécageux (Caricion canescenti-fuscae ou Eriophorion latifolii). 4-5. Disparu? (Jadis Meinier, Rouëlbeau; Avusy; Avully, Epeisses; Meyrin, Feuillasse).

**E. latifolium** Hoppe

Marais (Eriophorion latifolii). 4-5. Chancy, La Malotte; (indiqué comme très commun par REUTER).

**Carex Davalliana** Sm.

Marais spongieux (Eriophorion latifolii). 4-5. Chancy, La Malotte; Meyrin, Feuillasse; (moins commun que du temps de REUTER).

◆ **C. pulicaris** L.

Signalé par erreur: Chancy, 1948.

**Carex disticha** Hudson (*C. intermedia* Good.)

Marais (Magnocaricion). 4-5. Meyrin, bois du Lan et Mategnin; Bellevue, marais du Four.

**C. Otrubae** Podpera (*C. lamprophysa* Samuelsson; *C. vulpina* L. var. *nemorosa* Gaudin; *C. nemorosa* Rebentisch)

Marais, fossés (Magnocaricion ou Agropyro-Rumicion). 4-5. Assez commun, par ex.: Veyrier, Vessy.

**C. vulpina** L.

Marais, fossés (Magnocaricion, Phragmition ou Agropyro-Rumicion). 4-6. Commun.

**C. spicata** Hudson (*C. muricata* L.; *C. contigua* Hoppe)

Talus, chemins, lisières des bois, prés humides (Epilobion angustifolii, Molinion ou Sisymbrium). 5-6. Commun. Egalement Genève, La Treille.

**C. paniculata** L.

Marais (Magnocaricion ou Alnion glutinosae). 4-6. Collonge-Bellerive, Pointe-à-la-Bise; Chancy, La Malotte; (jadis Meinier, Rouëlbeau; Grand-Saconnex; Versoix).

**C. remota** L.

Bois humides (Alno-Padion ou Fraxino-Carpinion). 5-6. Meyrin, bois du Lan (pas signalé dans le canton avant 1947, mais représenté dans l'Herbier par plusieurs échantillons de Genève, dès 1845).

**C. leporina** L.

Prés humides, lisières des bois (Caricion canescenti-fuscae ou Sambuco-Salicion capreae). 5-6. Pas de station connue (jadis Genève, bois de la Bâtie; Veyrier; Chancy; Satigny; Peney; Vernier, bois des Frères; Bellevue, marais du Four).

**C. elongata** L.

Lieux humides et ombragés (Alnion glutinosae). 4-6. Pas de station connue (Bellevue, Valavran, 1920).

**C. elata** All. (*C. stricta* Good.)

Bords des eaux, marais (Magnocaricion). 4-5. Assez commun, par ex.: Collonge-Bellerive, Pointe-à-la-Bise; Presinge; Bellevue, marais du Four; Versoix; (jadis plus commun).

✠? **C. acuta** L. (*C. gracilis* Curtis)subsp. **acuta**

Bords des eaux, marais (Magnocaricion). 5-6. Cartigny, boucle du Rhône? Identification incertaine (jadis dans les grands marais; Versoix, lac).

**Carex fusca** All. (*C. vulgaris* Fries; *C. chlorocarpa* Wimmer)

Prés marécageux, mares (Caricion canescenti-fuscae, Eriophorion latifolii ou Calthion). 5-6. Chancy, La Malotte; Satigny, Les Granges-Peissy; Meyrin, Mategnin; Bellevue, marais du Four; (pas signalé avant 1921).

**C. montana** L.

Bois clairs (Fraxino-Carpinion ou Quercion pubescenti-petraeae). 4-5. Commun.

◆ **C. pilulifera** L.

Signalé par erreur à Veyrier; Confignon; Aire-la-Ville; Avusy; Chancy; Meyrin, 1946 et 1956.

**C. tomentosa** L.

Prés marécageux, bois humides (Molinion ou Alno-Padion). 4-5. Commun.

**C. caryophyllea** La Tourrette (*C. verna* Chaix)

Gazons secs, coteaux (Xerobromion, Mesobromion ou Molinion). 3-4. Commun.

**C. pilosa** Scop.

Bois (Fraxino-Carpinion). 4-5. Onex, bois Carrien-Bernex, nant de Lagnon; Avully, Epeisses; Vernier, ch. des Moulins; (indiqué par REUTER dans les mêmes stations; jadis Hermance).

**C. pallescens** L.

Bois, prés marécageux (Epilobion angustifolii ou Molinion). 5-6. Commun.

**C. pendula** Hudson (*C. maxima* Scop.)

Bois humides, bords des eaux (Alno-Padion). 5-6. Carouge, canal; Avusy, la Laire; Chancy; (jadis Collonge-Bellerive; Hermance; Troinex; Lancy, Saint-Georges; Vernier, bois des Frères).

**C. liparocarpos** Gaudin (*C. nitida* Host)

Lieux sablonneux et arides (Xerobromion). 4-5. Commun dans le S-O du canton.

**C. flacca** Schreber (*C. glauca* Scop.)

Endroits humides, bois (Molinion ou Fraxino-Carpinion). 4-5. Commun.

**C. panicea** L.

Prés humides (Molinion, Eriophorion latifolii ou Caricion canescenti-fuscae). 4-5. Assez commun, par ex.: Presinge; Jussy; Chancy, La Malotte.

**C. alba** Scop.

Bois (Fraxino-Carpinion ou Alno-Padion). 4-5. Cartigny, embouchure du nant des Crués; (jadis Veyrier, Vessy; Onex; Satigny, bois de Bay; Vernier, le Lignon).

**C. digitata** L.

Bois (Fraxino-Carpinion ou Quercion pubescenti-petraeae). 3-4. Commun.

**Carex sylvatica** Hudson

Bois (Fraxino-Carpinien). 5-6. Commun.

◆ ? **C. flava** L.

Marais, fossés (Eriophorion latifolii ou Calthion). 5-6. Pas de station connue (indiqué par REUTER dans la plaine, mais pas d'échantillon du canton dans l'Herbier).

◆ × ? **C. Pieperiana** P. Junge (*C. flava* × *lepidocarpa*)

Dans l'Herbier, un échantillon: Versoix, La Bâtie, 1854. Détermination douteuse.

**C. lepidocarpa** Tausch (*C. flava* L. subsp. *lepidocarpa* (Tausch) Lange)

Marais, fossés (Eriophorion latifolii ou Calthion). 4-6. Assez commun, par ex.: Cartigny, boucle du Rhône; Chancy, La Malotte; Meyrin, bois du Lan.

**C. serotina** Mérat (*C. flava* subsp. *Oederi* (Retz.) Syme; *C. Oederi* Ehrh.)

Marais, grèves périodiquement inondées (Eriophorion latifolii ou Nanocyperion). 5-6. Assez commun, par ex.: Cartigny, boucle du Rhône.

**C. distans** L.

Prés humides, fossés (Eriophorion latifolii ou Molinion). 4-5. Commun.

**C. Hostiana** DC. (*C. Hornschuchiana* Hoppe)

Marais (Eriophorion latifolii ou Caricion canescenti-fuscae). 4-5. Pas de station connue (jadis Jussy; Meinier; Anières; Troinex; Chancy; Versoix).

**C. Pseudocyperus** L.

Grèves périodiquement inondées, prés marécageux (Phragmition ou Magnocaricion). 5-6. Collonge-Bellerive, Pointe-à-la-Bise (pas signalé avant 1951).

✠ ? **C. lasiocarpa** Ehrh. (*C. filiformis* L.)

Marais (Magnocaricion). 5-6. Disparu ? (Jadis dans les grands marais).

**C. hirta** L.: var. **hirta**; var. **sublaevis** Hornem.

Prés marécageux, fossés, graviers humides (Molinion ou Agropyro-Rumicion). 5-6. Commun.

✠ ? **C. rostrata** Stokes (*C. inflata* Hudson; *C. ampullacea* Good.)

Bords des eaux (Magnocaricion). 4-5. Pas retrouvé récemment; (pas indiqué dans le canton par REUTER, mais plusieurs échantillons dans l'Herbier: Collonge-Bellerive; Veyrier; Bardonnex, Compesières).

× **C. Pannewitziana** Figert (*C. rostrata* × *vesicaria*)

Pas retrouvé récemment (dans l'Herbier, un échantillon: Meinier, La Pallanterie, 1895).



**Carex vesicaria** L.

Marais (Magnocaricion). 5-6. Assez commun, par ex.: Collonge-Bellerive, Pointe-à-la-Bise et La Capite; Bellevue, Valavran.

**C. acutiformis** Ehrh. (*C. paludosa* Good.)

Marais, fossés, bords des eaux (Magnocaricion, Alno-Padion ou Alnion glutinosae). 4-6. Commun.

**× C. Ducellieri** Beauverd (*C. acutiformis* × *vesicaria*)

Pas retrouvé récemment (Bellevue, Valavran, 1920).

**C. riparia** Curtis

Marais, fossés, bords des eaux (Magnocaricion). 5-6. Commun.

*Palmae*● **Phoenix dactylifera** L.

Adventice. Asie occ. et Afrique du Nord. Immondices. Germinations avec 1-2 feuilles. Pas retrouvé récemment (Genève, 1879, 1880; Vernier, Sables-d'Aire, 1940).

*Araceae***Arum maculatum** L. (*A. vulgare* L.)

Haies, bois frais (Fraxino-Carpinon ou Alno-Padion). 4-5. Très Commun. Forme à feuilles maculées de noir: Corsier, O du village; Presinge, Abbaye; (jadis Pregny-Chambésy).

**A. italicum** Miller

Subspontané et naturalisé. Médit. Haies, lieux ombragés (Fraxino-Carpinon ou Alno-Padion). 4-5. Genève, ch. de Vermont; Collonge-Bellerive, La Capite; Presinge, ancien parc du château; Onex, plusieurs colonies; Perly-Certoux, Aire; (pas signalé avant 1939).

**Acorus Calamus** L.

Introduit et naturalisé. Circumboréal. Bords des eaux (Phragmiton). 6. Genthod, anse fermée du lac (pas signalé avant 1943).

*Lemnaceae***Spirodela polyrrhiza** (L.) Schleiden (*Lemna polyrrhiza* L.)

Eaux stagnantes (Lemnion). 5-9. Collonge-Bellerive, Pointe-à-la-Bise; Satigny, Château-des-Bois; Vernier, Sables-d'Aire, ancien bras du Rhône; (jadis Genève, fossés de la ville).

**Lemna trisulca** L.

Eaux stagnantes (Lemnion). 5-9. Veyrier, Vessy; Meyrin, Feuillasse; (jadis Genève, « Fossés verts »).

**L. minor** L.

Eaux stagnantes (Lemnion). 5-9. Commun.

**L. gibba** L.

Eaux stagnantes (Lemnion). 5-9. Pas de station connue (jadis Genève, Synagogue et Jonction).

*Commelinaceae*● **Commelina communis** L.

Adventice. Chine. Immondices. 7-9. Genève, rue Schaub, 1966; Vernier, Sables-d'Aïre, 1950 (pas signalé avant 1950).

*Juncaceae***Juncus inflexus** L. (*J. glaucus* Willd.)

Lieux humides (Agropyro-Rumicion). 6-7. Commun.

**J. conglomeratus** L.

Bois humides, prés marécageux (Calthion ou Molinion). 6-7. Pas de station connue (jadis Genève, bois de la Bâtie; Jussy; Veyrier; Avusy; Satigny, bois de Bay; Céligny).

**J. effusus** L.: var. **effusus**; var. **fistulosus** Buchenau

Lieux humides et ombragés (Calthion ou Molinion). 6-7. Commun.

**J. tenuis** Willd. (*J. macer* S. F. Gray)

Adventice et naturalisé. Am. Nord. Bois humides, chemins fangeux (Polygonion avicularis). 6-9. Genève, jardin des Bastions; Jussy, vers Monniaz; Veyrier; Bellevue, Valavran-Collex-Bossy; Versoix, Ecogia-Sauverny; (pas signalé avant 1920).

**J. compressus** Jacq.

Chemins, prés humides (Agropyro-Rumicion ou Nanocyperion) 6-7. Bernex, Lully; Cartigny, boucle du Rhône; Avusy; (jadis assez commun).

**J. bufonius** L.

Lieux humides, chemins fangeux (Nanocyperion). 5-9. Commun.

✠ ? **J. alpinus** Vill. var. **rariflorus** Hartman

Élément montagnard. Alluvions humides (Nanocyperion). 6-8. Pas retrouvé récemment (jadis Genève, Jonction; Chêne-Bougeries, Arve; Jussy, Sionnet).

**Juncus articulatus** L. (*J. lamprocarpus* Ehrh.)

Lieux humides (Calthion, Agropyro-Rumicion ou Nanocyperion). 6-7. Commun.

**Luzula pilosa** (L.) Willd.

Bois (Fraxino-Carpinion). 4-5. Commun.

**L. Forsteri** (Sm.) DC.

Bois graveleux (Fraxino-Carpinion). 4-5. Bellevue, bois du Vengeron (station déjà indiquée par REUTER. Jadis Chancy; Satigny, bois de Bay).

**L. nivea** (L.) DC.

Bois (Fraxino-Carpinion). 5-6. Assez commun, par ex.: Genève, bois de la Bâtie; Onex; Bellevue, bois du Vengeron; (station du bois de la Bâtie, déjà indiquée par REUTER).

**L. campestris** (L.) DC.

Gazons, lisières des bois (Mesobromion). 4. Commun.

**L. multiflora** (Retz.) Lejeune var. **multiflora**

Bois humides (Epilobion angustifolii ou Molinion). 5-6. Assez commun, par ex.: Confignon; Russin, bois Bouffard.

*Liliaceae***Colchicum autumnale** L.

Prés humides (Arrhenatherion ou Molinion). 8-10. Commun.

● **Asphodeline liburnica** (Scop.) Reichenb.

Introduit. Balkans. Coteaux secs. 6. Genève, bois de la Bâtie; Satigny, bois de Bay (pas signalé avant 1952, mais introduction plus ancienne).

**Anthericum Liliago** L. (*Phalangium Liliago* (L.) Schreber)

Coteaux arides, terrains pierreux (Xerobromion). 4-6. Bernex, Aire à Lully (introduit); Avusy, Moulin-de-Veigy; Satigny, bois de Bay (station déjà indiquée par REUTER).

**A. ramosum** L. (*Phalangium ramosum* (L.) Lam.)

Coteaux arides, terrains pierreux, lisières des bois (Xerobromion ou Mesobromion). 6-7. Commun.

● **Hemerocallis fulva** L.

Subspontané. Eurasie. Endroits humides, immondices. 6. Chêne-Bougeries, Arve; Collonge-Bellerive, Pointe-à-la-Bise; Carouge, Bachet-de-Pesay; Veyrier, Vessy; Bernex, Aire en amont du pont de Lully; Satigny, Montfleury; Vernier, Sables-d'Aire; (pas signalé avant 1921).

**Gagea villosa** (Bieb.) Duby (*G. arvensis* (Pers.) Dumort.)

Champs, vignes (Aphanion, Polygono-Chenopodion polyspermi ou Eragrostidion). 3-4. Vandœuvre; Choulex; Jussy; Meinier; Corsier; Plan-les-Ouates; Onex; Perly-Certoux, Perly; Bernex, Loëx; Soral; Avusy, Sézegnin.

**G. lutea** (L.) Ker-Gawler

Haies, bois humides (Alno-Padion ou Fraxino-Carpinion). 4. Aire-la-Ville, vers le Moulin-de-Vert; Grand-Saconnex; Le Pommier; (indiquées par REUTER; Veyrier; Soral. Dans l'Herbier et dans l'Herbier Reuter, par d'échantillon de Soral. Il doit s'agir d'une confusion avec *G. pratensis* qui existe encore à Soral).

**G. pratensis** (Pers.) Dumort. (*G. stenopetala* Reichenb.)subsp. **pratensis**

Haies, champs (Aphanion ou Fraxino-Carpinion). 4. Soral, en direction de Laconnex (station déjà indiquée par REUTER. Jadis Pregny-Chambésy, ch. de Pregny au Grand-Saconnex; Collex-Bossy).

**Allium ursinum** L.

Bois humides (Alno-Padion ou Fraxino-Carpinion). 4-5. Chêne-Bougeries, La Gradelle; Presinge, Abbaye; Corsier, nant d'Aisy; Anières, l'Hermance; Hermance; Carouge, Arve sous Pinchat; Veyrier, Soujet; Troinex, la Drize; Onex-Bernex, Aire; Avusy, la Laire; Pregny-Chambésy; Céligny; (pas encore signalé, mais dans l'Herbier, échantillons récoltés dès 1843).

**A. vineale** L.: var. **vineale**; var. **compactum** Thuill.

Champs, vignes (Polygono-Chenopodion polyspermi ou Eragrostidion). 6-7. Assez commun, par ex.: Presinge; Jussy; Bernex, Lully; Satigny, Peissy; (indiqué comme très commun par REUTER).

**A. sphaerocephalon** L.

Terrains pierreux (Epilobion Fleischeri ou Alysso-Sedion). 6-7. Dardagny-Russin, Allondon; (jadis Chêne-Bourg; Collonge-Bellerive, La Gabiule; Carouge, Pinchat; Genthod; Versoix).

**A. Scorodoprasum** L.

Haies, taillis (Alno-Padion ou Prunion fruticosae). 5-7. Veyrier, bois de Veyrier; Dardagny, Gottets; Russin, viaduc du ch. de fer; Grand-Saconnex, N du Grand-Morillon.

● **A. Porrum** L. (*A. Ampeloprasum* L. subsp. *Porrum* (L.) Breistr.)

Cultivé et subsponané. Médit. Décombres, immondices. 6-7. Versoix, 1946.

● **A. Cepa** L.

Cultivé. Asie occ. 6.

**Allium Schoenoprasum L.**● subsp. **Schoenoprasum**

Cultivé et subspontané. Alpes. 5-6. Avusy, 1966;

subsp. **sibiricum (L.) Hartman**

Élément montagnard. Bords des eaux (Calthion). Collonge-Bellerive, Pointe-à-la-Bise; Cartigny, boucle du Rhône; Chancy, Rhône sous Longet; (jadis plus commun).

**A. angulosum L. (A. acutangulum Schrad.)**

Prés marécageux (Molinion ou Phragmition). 7. Presinge, Sur-la-Fontaine; (jadis dans les grands marais; Bardonnex, Compesières).

● **A. montanum F. W. Schmidt (A. senescens L.)**

Adventice ou introduit. Eurasie mérid. Terrains pierreux. 6-9. Genève, toit du Conservatoire botanique, 1954-1966 et bois de la Bâtie; Satigny, bois de Bay; (pas signalé avant 1953).

**A. oleraceum L.: var. oleraceum; var. complanatum Fries**

Champs, haies, taillis (Polygono-Chenopodion polyspermi, Aphanion ou Prunion fruticosae). 6-7. Commun.

**A. carinatum L.**

Taillis, lisières des bois (Molinion ou Prunion fruticosae). 6-7. Commun.

● **A. roseum L.**

Introduit. Médit. Terrains pierreux. 6-7. Bernex, Aire en amont du pont de Lully (pas signalé avant 1953).

**Lilium Martagon L.**

Élément montagnard. Bois humides (Fraxino-Carpinion). 5-6. Genève, bois de la Bâtie; Chêne-Bougeries, Arve; Veyrier, Soujet; Cartigny, Moulin-de-Vert; (station du bois de la Bâtie déjà indiquée par REUTER).

**Tulipa sylvestris L.**

Haies, taillis (Prunion fruticosae). 4-5. Choulex, Miolan; Chêne-Bougeries, falaises de l'Arve; Veyrier, Arve sous Sierne; Vernier, sous le château; (stations de Miolan et de Sierne déjà indiquées par REUTER).

**Erythronium Dens-canis L.**

Bois, pentes de ravins (Fraxino-Carpinion ou Quercion pubescenti-petraeae). 3-4. Onex, Rhône; Bernex, nant de Lagnon; Chancy; (jadis sur toute la rive gauche du Rhône, de Genève à Chancy; Satigny, bois de Bay; Vernier, bois des Frères).

**Scilla bifolia** L.: parfois à fleurs roses ou blanches

Haies, bois humides (Alno-Padion ou Fraxino-Carpinion). 3-4. Commun.

● **S. autumnalis**subsp. **autumnalis**

Introduit. Médit.-subatl. Terrains pierreux. 8-9 Satigny, E de Peney-Dessous (pas signalé avant 1954, mais introduit en 1951).

● **S. non-scripta** (L.) Hoffmannsegg et Link

Subspontané. Médit-atl. Bois humides, haies. 4-5. Soral, la Laire sous Sézegnin; Satigny, Peissy; (stations provenant de déchets de culture. Pas signalé avant 1953).

● **S. italica** L.

Introduit. Europe mérid. Bois. 4-5. Bernex, Aire à Lully (pas encore signalé, mais constaté dès 1956).

**Ornithogalum umbellatum** L.

Champs (Aphanion ou Caucaalion). 4-5. Genève, Malagnou et Chêne; Veyrier, Vessy; Troinex; Confignon; Cartigny, commun de Vert; Avusy, Athenaz; Satigny; (station de Troinex déjà indiquée par REUTER).

**O. nutans** L.

Champs, vergers, haies (Arrhenatherion, Aphanion ou Prunion fruticosae). 4-5. Thônex; Cologny, route de Frontenex; Puplinge-Presinge; Meinier, route de Gy; Bernex, Confignon; Cartigny, Petite-Grave; Dardagny; Vernier, ch. de la Grille; Grand-Saconnex, champs de la Croix; Genthod-Bellevue, près de la gare; Céligny, S du pont du Brassus; (en voie d'extension).

**O. pyrenaicum** L. (*O. pyrenaicum* var. *flavescens* (Lam.) Baker)

Bois humides (Alno-Padion ou Fraxino-Carpinion). 5-6. Assez commun, par ex.: Choulex, le long de la Seimaz; Veyrier, Arve; Onex-Bernex, Aire; Versoix, bois du Faisan.

● **O. narbonense** L.

Introduit ou subspontané. Médit. Pentes herbeuses, lisières des bois. 5-6. Genève, bois de la Bâtie; Lancy-Confignon, ch. des Verjus; Versoix, propriété La Vieille-Maison; (pas signalé avant 1942, mais introduit au bois de la Bâtie autour de 1890).

**Muscari comosum** (L.) Miller

Champs, moissons, pentes herbeuses (Aphanion ou Caucaalion). 4-5. Commun, aussi Genève, promenade de La Treille (station déjà indiquée par REUTER).

**Muscari botryoides** (L.) Miller

Champs (Aphanion). 4-5. Genthod, campagne Mailly (pas signalé avant 1934).

**M. racemosum** (L.) Miller

Champs, vignes, pentes herbeuses (Mesobromion, Aphanion ou Eragrostidion). 4-5. Commun, aussi Genève, bois de la Bâtie (introduit).

**M. neglectum** Guss.

Champs, vignes, pentes herbeuses (Mesobromion, Aphanion ou Eragrostidion). 4-5. Genève, bois de la Bâtie (introduit); Bardonnex, plusieurs colonies; Confignon; (les stations dans la commune de Bardonnex furent découvertes en 1856 déjà par le curé CHAVIN).

● **Yucca Smalliana** Fernald (*Y. filamentosa* L.)

Persistant de cultures. S-E des Etats-Unis. Talus, bords des chemins. 6-9. Genève, La Treille; Vernier, Canada (pas encore signalé).

**Asparagus officinalis** L.

Sables, bords des rivières (Alnion-Glutinosae ou Berberidion). 5-6. Bernex, Aire à Lully; Cartigny, boucle du Rhône; Russin, Grandes-Vignes.

● **Ruscus aculeatus** L.

Subspontané ou introduit. Médit. Haies, bois. 4. Confignon; (jadis Genève, Petit-Saconnex).

**Maianthemum bifolium** (L.) F. W. Schmidt

Élément montagnard. Bois (Fraxino-Carpinion ou Alno-Padion). 4-5. Jussy; Bernex, N de Loëx; Bellevue, Valavran; Collex-Bossy, Pré-Lapalud; Versoix.

**Polygonatum multiflorum** (L.) All. (*Convallaria multiflora* L.)

Bois, haies (Fraxino-Carpinion). 4-5. Commun.

◆ **P. odoratum** (Miller) Druce (*P. officinale* All.; *Convallaria Polygonatum* L.)

Dans l'Herbier, un échantillon: Genève, 1792. Certainement environs de Genève, en France.

**Convallaria majalis** L.

Bois (Fraxino-Carpinion). 4-5. Commun.

**Paris quadrifolia** L.

Bois (Fraxino-Carpinion). 4-5. Commun.

*Amaryllidaceae***Leucojum vernum** L.

Elément montagnard ou subsontané. Bois frais, haies (Alno-Padion ou Fraxino-Carpinion). 2-3. Chêne-Bougeries, Conche au bois Nancy; Satigny, Grands-Bois; (pas signalé avant 1948).

**Narcissus Pseudonarcissus** L.

Bois frais (Fraxino-Carpinion). 3-4. Collonge-Bellerive, La Savonnière; Bernex, nant de Lagnon (introduit?); (station de Collonge-Bellerive déjà indiquée par REUTER. Jadis Confignon, Aire, à fleurs doubles).

**N. biflorus** Curtis

Prairies humides (Molinion). 4-5. Avusy, route de Sézegnin; (jadis assez commun).

● **N. poeticus** L.

Subsontané. Médit. occ. Prairies. 4-5. Soral, 1954; Céligny, 1966.

*Dioscoreaceae***Tamus communis** L.

Bois, buissons (Fraxino-Carpinion ou Berberidion). 5-6. Commun.

*Iridaceae***Crocus albiflorus** Kit. (*C. vernus* All.)

Elément montagnard. Prairies (Arrhenatherion). 3. Grand-Saconnex, Le Pomier; (jadis Satigny, Choully).

**Iris pallida** Lam.

Subsontané et naturalisé. Médit. Taillis (Berberidion ou Prunion fruticosae). 5. Avusy, la Laire à Sézegnin; Chancy, La Malotte; Russin, Allondon; (pas encore signalé, mais constaté dès 1954).

● **I. germanica** L.

Subsontané. Médit. Immondices. 4-5. Vernier, Sables-d'Aïre, 1948 (pas signalé avant 1948).

**I. Pseudacorus** L.

Marais, fossés (Phragmition ou Magnocaricion). 5-6. Assez commun, par ex.: Collonge-Bellerive; Choulex; Meinier; Aire-la-Ville; Cartigny; Satigny; Meyrin; Bellevue.



● **Iris halophila** Pallas

Introduit ou subspontané. Asie. Pentès herbeuses. 5. Genève, La Treille (pas signalé avant 1956, mais plus ancien).

I. **foetidissima** L.

Adventice et naturalisé. Médit. et Europe atl. Haies, taillis, décombres (Fraxino-Carpinion ou Prunion fruticosae). 6-7. Genève, Petit-Saconnex; Chêne-Bougeries, Conche au bois Nancy; Collonge-Bellerive, Pointe-à-la-Bise; Veyrier, Villette et pont de Vessy; Onex; Confignon, S du village; Grand-Saconnex; Bellevue, La Tuilerie; (pas signalé avant 1942. En voie d'extension).

**Gladiolus italicus** Miller (*G. segetum* Ker-Gawler)

Champs (Aphanion). 6. Pregny-Chambésy, au-dessus de Pregny; (jadis Bardonnex, Compesières).

G. **paluster** Gaudin

Prés marécageux, taillis humides (Molinion). 6. Presinge, La Renfile aux Prés-de-l'Ecu; Russin, plusieurs colonies; (jadis Satigny, Peissy).

✕ **Tritonia crocosmiflora** (Lemoine) Nicholson. (*T. aurea* Poppe × *Pottsii* Ascherson et Graebner)

Subspontané. Afrique du Sud. Immondices. 7-8. Hermance, 1945 (pas encore signalé).

*Orchidaceae***Ophrys insectifera** L. (*O. muscifera* Hudson)

Coteaux arides (Mesobromion). 5-6. Aire-la-Ville; Chancy-Avully; Satigny, combe d'Arnais; Vernier, bois des Frères (station déjà indiquée par REUTER).

**O. apifera** Hudsonsubsp. **apifera**

Coteaux arides (Mesobromion). 6. Veyrier, bois de Veyrier; Grand-Saconnex, en direction du Grand-Morillon; (jadis Anières; Bernex; Vernier, bois des Frères);

✕ subsp. **Botteronii** (Chodat) Ascherson et Graebner

Coteaux arides (Mesobromion). 6. Disparu (jadis Vernier, bois des Frères).

**O. fuciflora** (Crantz) Moench (*O. Arachnites* (Scop.) Murray)

Prés secs, buissons (Xerobromion). 5-6. Avusy; Chancy; Avully, Epeisses; Russin.

**O. sphegodes** Miller (*O. aranifera* Sm.)subsp. **sphegodes**: var. **sphegodes**; var. **fucifera** Reichenb. fil.

Coteaux arides (Mesobromion). 4-6. Assez commun, par ex.: Aire-la-Ville; Avusy, la Laire; Vernier, bois des Frères (station déjà indiquée par REUTER).

**Orchis Morio** L.: parfois à fleurs roses ou blanches

Prés humides (Mesobromion ou Molinion). 4-5. Commun.

✠ **O. coriophora** L.

subsp. **coriophora**;

subsp. **fragrans** (Pollini) E. G. Camus

Prés humides (Molinion ou Calthion). 5-6. Disparu (jadis Veyrier; Troinex; Conflignon, Aire rive droite).

**O. militaris** L. (*O. galeata* Lam.)

Pentes buissonneuses (Mesobromion ou Molinion). 5-6. Assez commun, par ex.: Aire-la-Ville; Dardagny-Russin, Allondon; Vernier, bois des Frères (station déjà indiquée par REUTER).

✕ **O. Beyrichii** Kerner (*O. militaris* × *simia*)

Aire-la-Ville, bois de la Pesse; (jadis Chancy; Dardagny, La Plaine; Satigny, Peney; Vernier, Aire).

✕ **O. hybrida** Boenn. (*O. militaris* × *purpurea*) (*O. Jacquinii* Boenn.)

Pas retrouvé récemment (jadis Dardagny, La Plaine; Vernier, bois des Frères; Bellevue, bois du Vengeron).

**O. simia** Lam.

Coteaux secs (Mesobromion). 4-6. Assez commun, par ex.: Aire-la-Ville, bois de la Pesse; Cartigny, Côtes-de-Bonnes; Soral, au-dessus du Moulin-de-Veigy; Avusy, la Laire; Chancy, La Malotte; Avully, Epeisses; Satigny, Peney (station déjà connue par REUTER).

**O. ustulata** L.

Prés secs (Mesobromion). 5-6. Assez commun, par ex.: Soral, route de Sézegin; Avusy, la Laire; Dardagny, Allondon; Russin, Les Bailleys; Vernier, bois des Frères; Meyrin, Feuillasse; (jadis plus commun).

**O. purpurea** Hudson: parfois à fleurs blanches

Bois clairs, buissons, prés secs (Quercion pubescenti-petraeae, Alno-Padion ou Mesobromion). 5. Assez commun, par ex.: Jussy; Corsier, nant d'Aisy; Lancy, Rhône sous Petit-Lancy; Bernex; Aire-la-Ville; Satigny, Peney; Grand-Saconnex; Genthod-Versoix.

✕ **O. angusticuris** Franchet (*O. purpurea* × *simia*)

Pas retrouvé récemment (jadis Bellevue, bois du Vengeron).

**O. mascula** L.

subsp. **mascula**

Prés humides, lisières des bois (Mesobromion ou Fraxino-Carpinion). 4-5. Assez commun, par ex.: Jussy; Lancy, Saint-Georges; (jadis très commun).

**Orchis palustris** Jacq.

Prés marécageux (Magnocaricion ou Calthion). 5-6. Collonge-Bellerive, Pointe-à-la-Bise; (jadis Jussy, Sionnet; Meinier, Rouëlbeau).

✠ **O. laxiflora** Lam.

Prés marécageux (Magnocaricion ou Calthion). 5. Disparu (jadis Jussy, Sionnet; Avusy).

✕ **O. alata** Fleury (*O. laxiflora* × *morio*)

Disparu (jadis Meinier, Rouëlbeau-Sionnet).

✕ **O. intermedia** (Lloyd) Gadeceau (*O. laxiflora* × *palustris*)

Disparu (Jadis Meinier, Rouëlbeau-Sionnet).

**O. maculata** L.: parfois à fleurs blanches

subsp. **maculata**;

subsp. **Helodes** (Griseb.) E. G. Camus

Bois, buissons (Molinion, Fraxino-Carpinion ou Quercion pubescenti-petraeae). 5-6. Commun.

✕ ? (*O. maculata* × *palustris*)

Signalé à Jussy, Sionnet, en 1919. Détermination douteuse, les espèces du sous-genre *Orchis* ne s'hybrident pas avec les espèces du sous-genre *Dactylorchis*.

✕ **O. jenensis** Brand (*O. maculata* × *Traunsteineri*)

Disparu? (jadis Genève. Pas d'indication de localité, pas d'échantillon dans l'Herbier).

**O. latifolia** L.

subsp. **latifolia**

Prés marécageux (Molinion ou Calthion). 5. Jussy, Grands-Bois; Dardagny, bisse de l'Allondon; Bellevue, marais du Four; (jadis Collonge-Bellerive; Meinier; Troinex; Avusy; Vernier; Versoix).

✕ **O. Braunii** Halácsy (*O. latifolia* × *maculata*)

Pas retrouvé récemment (jadis « Genève »).

✕ **O. Dufftiana** M. Schulze (*O. latifolia* × *Traunsteineri*)

Disparu (jadis « Genève »).

**O. incarnata** L.

subsp. **incarnata**

Marais (Molinion ou Calthion). 5-6. Jussy, Grands-Bois; Collonge-Bellerive, Pointe-à-la-Bise; Meyrin, Feuillasse et Mategnin; Bellevue, marais du Four; (jadis Jussy, Sionnet; Veyrier).

✕ **Orchis maculatiformis** Rouy (*O. incarnata* × *maculata*)

Pas retrouvé récemment (jadis « Genève »).

✕ **O. Aschersoniana** Hausskn. (*O. incarnata* × *latifolia*)

Pas retrouvé récemment (jadis Jussy, Sionnet).

✕ **O. Traunsteineri** Sauter

Marais (Caricion canescenti-fuscae ou Molinion). 5-6. Disparu (jadis dans plusieurs localités, d'après Chenevard. Dans l'Herbier, seulement échantillons de Jussy, Sionnet).

**Aceras anthropophorum** (L.) R. Br.

Coteaux arides, talus (Mesobromion ou Geranion sanguinei). 5-6. Anières; Avusy, Sézegnin; Russin, Les Bailleys; Satigny; (jadis Genève, Sous-Terre; Chancy; Vernier; Bellevue).

✕ **Orchiaceras Bergsonii** E. G. Camus (*Aceras anthropophorum* × *Orchis Simia*)

Pas de station connue (récemment Russin, Les Bailleys).

✕ **O. spurium** (Reichenb.) E. G. Camus (*Aceras anthropophorum* × *Orchis militaris*)

Avusy, Sézegnin, 1950 (pas signalé avant 1950).

**Himantoglossum hircinum** (L.) Sprengel (*Loroglossum hircinum* (L.) L. C. M. Richard)

Coteaux secs, taillis (Mesobromion erecti ou Berberidion). 5-6. Genève, parc de l'Ariana et Grange-Falquet; Anières; Bernex, Lully; Avully-La Plaine; Satigny, Peney; Grand-Saconnex; (jadis Meinier, Le Carre; Hermance; Vernier; Bellevue; Genthod).

**Anacamptis pyramidalis** (L.) L. C. M. Richard

Coteaux secs (Mesobromion ou Berberidion). 6. Chêne-Bougeries, ch. des Voirons; Onex, Les Evaux; Soral, la Laire; Avusy, sous Sézegnin; Chancy; Avully, Epeisses; Russin, Allondon; (jadis Hermance; Satigny; Vernier, bois des Frères; Bellevue).

✕ ? **Herminium Monorchis** (L.) R. Br.

Pentes herbeuses (Mesobromion ou Molinion). 5-6. Disparu? (Jadis Genève, bois de la Bâtie; Veyrier; Vernier, bois des Frères).

**Coeloglossum viride** (L.) Hartman (*Platanthera viridis* (L.) Lindley)

Élément montagnard. Prés marécageux (Mesobromion ou Molinion). 5-6. Bellevue, bois d'Avault; (jadis Genève, Châtelaine; Meinier, Rouëlbeau; Vernier, Aire et bois des Frères).

**Gymnadenia conopsea** (L.) R. Br.

Prés et bois argileux (Mesobromion, Molinion ou Fraxino-Carpinion). 5-6. Assez commun, surtout dans le S-O du canton, par ex.: Jussy, Aire-la-Ville; Avusy; Chancy; Dardagny-Russin, Allondon.

× **Gymnadenia Chodatii** Lendner (*G. conopsea* × *Platanthera bifolia*)

Pas retrouvé récemment (jadis Satigny, Peney).

◆ **G. odoratissima** (L.) L. C. M. Richard

Indiqué à Meinier, Corsinge, en 1921. Pas d'échantillon du canton dans l'Herbier, ni dans l'Herbier REUTER. Confusion probable avec *G. conopsea*.

**Platanthera bifolia** (L.) L. C. M. Richard

Lisières des bois, coteaux (Quercion pubescenti-petraeae, Berberidion ou Molinion). 5-6. Assez commun, par ex.: Jussy; Aire-la-Ville; Satigny, Peney; Vernier, bois des Frères; (jadis très commun).

**P. chlorantha** (Custer) Reichenb.

Bois, coteaux (Quercion pubescenti-petraeae, Berberidion ou Molinion). 5-6. Jussy, bois Devant; Bernex, Loëx; Avusy, Crêt-de-Larnex; Russin, Bouffard; (pas signalé avant 1920).

**Epipactis palustris** (L.) Crantz

Marais, pentes argileuses (Magnocaricion ou Molinion). 6-7. Jussy, bois Devant; Chancy, Cannelet; Avully, Rhône à Epeisses; Vernier, bois des Frères; Meyrin, Feuillasse; Bellevue, La Tuilerie; (plus commun qu'autrefois).

**E. atrorubens** (Hoffm.) Schultes (*E. atropurpurea* Rafin.; *E. rubiginosa* Gaudin)

Bois secs (Quercion pubescenti-petraeae ou Fraxino-Carpinion). 6-7. Bernex, nant de Lagnon; Bellevue, bois du Vengeron; (pas signalé avant 1947).

**E. Helleborine** (L.) Crantz (*E. latifolia* (Hudson) All.)

subsp. **Helleborine**

Bois, buissons (Fraxino-Carpinion ou Alno-Padion). 7-8. Assez commun, par ex.: Aire-la-Ville; Cartigny; Satigny, Peney; Versoix.

**Cephalanthera rubra** (L.) L. C. M. Richard

Bois (Fraxino-Carpinion ou Quercion pubescenti-petraeae). 6. Genève, Champel sous Beau-Séjour; Aire-la-Ville, bois de la Pesse; Satigny, bois de Bay et Pérouse; (jadis Vernier, bois des Frères; Bellevue, bois du Vengeron).

**C. Damasonium** (Miller) Druce (*C. alba* (Crantz) Simonkai; *C. pallens* L. C. M. Richard)

Bois (Fraxino-Carpinion). 5-6. Avully, Epeisses; Bellevue, bois du Vengeron; Versoix, bois du Faisan; (station du Vengeron déjà indiquée par REUTER. Jadis Vernier, bois des Frères).

**C. longifolia** (L.) Fritsch (*C. ensifolia* L. C. M. Richard)

Bois (Fraxino-Carpinion ou Quercion pubescenti-petraeae). 5-6. Vandœuvres; Aire-la-Ville, bois de la Pesse; Chancy, La Malotte-Martinet; (jadis Vernier, bois des Frères).

**Limodorum abortivum** (L.) Swartz

Bois clairs, coteaux (Quercion pubescenti-petraeae ou Fraxino-Carpinion. 5-6. Genève, parc de l'Ariana; Vandœuvres, Chougny; Bernex, nant de Lagnon; Dardagny, Macley; Satigny, Grands-Bois et combe d'Arnais; Vernier, bois des Frères (station déjà indiquée par REUTER. Indiqué par erreur Bernex, Lully, 1954).

**Spiranthes spiralis** (L.) Chevall. (*S. autumnalis* L. C. M. Richard)

Endroits argileux, buissons (Mesobromion, Molinion ou Berberidion). 8-9. Avusy, la Laire sous Sézegnin; (jadis Collonge-Bellerive; Plan-les-Ouates; Bardonnex, Compesières; Vernier, Aïre).

✠ **S. aestivalis** (Poiret) L. C. M. Richard

Pres marécageux (*Eriophorion latifolii*). 7. Disparu (jadis Meinier, Rouëlbeau; Veyrier).

**Listera ovata** (L.) R. Br.

Coteaux, bois clairs (Mesobromion, Fraxino-Carpinion ou Alno-Padion). 5-6. Assez commun, par ex.: Aire-la-Ville; Avusy, la Laire; Satigny; Vernier, bois des Frères; Versoix, bois du Faisan; (station du bois des Frères déjà indiquée par REUTER).

**Neottia Nidus-avis** (L.) L. C. M. Richard

Bois (Fraxino-Carpinion ou Quercion pubescenti-petraeae). 5. Genève, bois de la Bâtie; Jussy, Bois-Devant; Veyrier, bois de la Blanche; Chancy, bois des Crévasses; Avully, Epeisses; Bellevue, bois du Vengeron; Versoix, bois de Roulavaz et Grand-Bois; Céligny.

✠ ? **Goodyera repens** (L.) R. Br.

Bois moussus (Fraxino-Carpinion). 7-8. Pas retrouvé récemment (jadis Bellevue, bois du Vengeron).

## DICOTYLEDONES

*Salicaceae***Salix triandra** L. (*S. amygdalina* L.)

subsp. **triandra**;

subsp. **discolor** (Koch) Arcangeli

Bords des eaux (*Salicion albae*). 4-5. Commun le long de l'Arve et du Rhône; Meyrin, Mategnin.