

Noronhia variabilis

Objekttyp: **Chapter**

Zeitschrift: **Boissiera : mémoires de botanique systématique**

Band (Jahr): **70 (2016)**

PDF erstellt am: **27.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

85. *Noronhia variabilis* Hong-Wa, spec. nova (Fig. 69, 70).

— *Noronhia* sp. 2, sp. 4 in GAUTIER (2002 : 202).

Typus: MADAGASCAR. Prov. Antsiranana: DIANA, Ambato FC, à 40 km au N d'Ambohitra sur le versant S de la Montagne d'Ambato, 13°26'S 48°33'E, 90-459 m, 22.XI.1996, Randrianaivo et al. 27 (holo-: MO-6615560!; iso-: G, NY, P [P03559017]!, TAN!).

Diagnosis *Noronhia variabilis* Hong-Wa can be distinguished from other members of the genus by its often non-woody, reddish petioles, its coriaceous, elliptic to oblong leaf blades, and its ovoid to subglobose fruits, with smooth surface and woody endocarp.

Description Trees to 15 m tall, trunk to 12 cm diameter; young twigs cylindrical to flattened, 1-2.7 mm diameter, glabrous; bark dark gray, smooth. Leaves opposite, persistent; bud scales persistent to deciduous; blades light green above, yellowish below, elliptic to oblong, 4.5-13 × 2-5 cm, coriaceous, glabrous, domatia absent, base attenuate, margin flat, apex acute, the point 1-5 mm long, midrib slightly sunken above, distinctly raised below, secondary veins slightly conspicuous, 5-12 per side, 6-19 mm apart, looping 2-5 mm from the margin; petiole reddish, 4-15 × 1-2.5 mm, usually not woody, glabrous. Flowers unseen, but infructescence thyrsoid. Fruiting pedicel 2-11 × 1.5-6.5 mm; young fruits green, purple black when mature, ovoid to subglobose, 12-26 × 10.5-22 mm, smooth, apex flat to apiculate; dry pericarp 0.6-1.6 mm thick; endocarp woody; seed 13.5-21 × 10-15 mm.

Etymology The specific epithet refers to the variability found within this taxon, especially in the shape and size of its leaves.

Distribution, ecology and phenology *Noronhia variabilis* occurs in low- to high-elevation humid forests in the northern region, from Daraina to Manongarivo (Fig. 68). It fruits from May to August.

Conservation status The assessment included 13 collections representing 12 localities and resulted in an EOO of 5,196 km², an AOO of 36 km², and eight subpopulations representing seven populations, of which five occur within protected area (Galoko, Loky-Manambato, and Manongarivo). Wood harvesting, illicit exploitation, and land conversion are projected to lead to continuing decline in habitat quality, AOO and number of mature individuals in the near future. Therefore, *N. variabilis* is assigned a preliminary status of “Vulnerable” [VU Blab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)].




Fig. 69.

Noronhia variabilis Hong-Wa.

- A.** Fruiting branch; **B.** Adaxial side of leaf blade;
- C.** Abaxial side of leaf blade; **D.** Fruit.

[Randrianaivo 27, MO] Drawings: R.L. Andriamiarisoa

Notes *Noronhia variabilis* resembles *N. macrocarpa*, from which it differs by its elliptic to oblong (vs. lanceolate to obovate) leaves with an acute (vs. acuminate) apex, and its ovoid to subglobose (vs. ovoid) and smooth (vs. rugose) fruits with a flat to apiculate (vs. flat to bluntly pointed) apex. The new species can be recognized by its often non-woody, reddish petioles, coriaceous, elliptic to oblong leaf blades, and ovoid to subglobose fruits.

Paratypi **MADAGASCAR. Prov. Antsiranana:** Antsatrotro, Manongarivo RS, 14°04'57"S 48°22'49"E, 1350 m, 17.VIII.1994, Andriatsiferana et al. 1695 (G, MO, TAN); *ibid. loc.*, 14°04'57"S 48°22'49"E, 1350 m, 17.VIII.1994, Andriatsiferana et al. 1704 (MO); Ambilobe, Beramanja, Anketrabe, forêt de Kalabenono, 13°38'31"S 48°40'25"E, 700 m, 25.XI.2006, Callmander et al. 607 (G, MO, P, TAN); Ambahatra, cours supérieur, 13°59'S 48°26"E, 850 m, 28.II.1999, Gautier 3432 (G, MO); Daraina, forêt d'Antsahabe, 13°13'23"S 49°32'47"E, 1030 m, 24.XI.2004, Gautier 4740 (Daraina, G, K, MO, TEF); Manongarivo Massif, E of Ankaramy, 14°05'S 48°20"E, 1100-1175 m, 19.X.1994, McPherson & van der Werff 16419 (G, K, MO, TAN); Manongarivo RS, Ankaramibe, Antsatrotro, 14°04'57"S 48°22'53"E, 1350 m, 13.VIII.1994, Rahajasoa et al. 384 (K, MO, P); *ibid. loc.*, 14°05'S 48°24"E, 679-1876 m, 12.I.1994, Rakotomalala 120 (G, MO, P); Vohémar, Daraina, forêt d'Ampondrabe, 12°57'29"S 49°41'50"E, 580 m, 11.IV.2004, Ranirison 634 (Daraina, G, K, MO, TEF); Ambilobe, Beramanja, Anketrabe, forêt de Kalabenono, 13°38'40"S 48°40'26"E, 700 m, 28.IX.2013, Ratovoson 2042 (G, MO, P, TAN); *ibid. loc.*, 13°39'01"S 48°40'26"E, 800 m, 27.XI.2006, Razafitsalama 1180 (MO, TAN); Ambanja, Marovato, [13°58"S 48°50"E], 15.VII.1953, Réserves Naturelles 5740 (P, TEF).



Fig. 70. *Noronhia variabilis* Hong-Wa [Razafitsalama 1180]

Photo: J. Razafitsalama.