

Autor(en): **[s.n.]**

Objektyp: **Preface**

Zeitschrift: **Bulletin de la Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles**

Band (Jahr): **121 (1998)**

PDF erstellt am: **16.08.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

AVANT-PROPOS

Après les deux tomes du Bulletin et le mémoire parus l'année dernière, 1998 retrouve en quelque sorte sa vitesse de croisière. Le numéro 121 présente toutefois une particularité: l'abondance inusitée de planches en couleur, abondance qui n'est malheureusement pas signe de l'opulence de la S.N.S.N. En effet, ces illustrations sont à la charge des auteurs ... ou de leurs sponsors ! Il a toutefois paru élégant aux rédacteurs d'habiller cette livraison d'une couverture un brin plus soyeuse afin de souligner le fait.

Les différents articles couvrent une large partie des sciences naturelles, paléontologie, phanérogamie, algologie, écologie végétale et pédologie, entomologie, conservation de la nature. Répondant au vœu exprimé par des membres de la Société, les rédacteurs ont rédigé une brève introduction au contenu scientifique de ce numéro, sans pour autant la transformer en un glossaire des mots difficiles !

On remarquera d'emblée que la paléontologie se taille la part de ... l'allosaure !

L'imagerie a largement mis à la mode les dinosaures qu'avec plus ou moins de réussite livres et films tentent de faire revivre. Mais ce que l'on sait moins, c'est comment les paléontologues acquièrent les connaissances nécessaires à la reconstitution non seulement des formes, mais aussi du comportement et de l'écologie de ces animaux. J. AYER a travaillé sur un site de fouilles aux USA. Il raconte comment les ossements fossiles sont dégagés du sol, préparés, et comment un environnement vieux de quelque 150 millions d'années peut être reconstitué. Cet article d'information générale frappera le lecteur par la qualité de son illustration. Il annonce une exposition "Dinosaures" qui sera présentée par le Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel en 1999.

Les listriodons sont des mammifères fossiles à allure de sangliers qui ont vécu au Miocène inférieur et moyen (il y a donc 15 à 20 millions d'années) en Europe et dans le sous-continent indien. Les ossements d'une espèce-type, *Listiodon splendens*, avaient été trouvés en 1839 par Célestin Nicolet à la Chaux-de-Fonds. Ils viennent d'être réexaminés par J. VAN DER MADE spécialiste de ce groupe de mammifères. Son article est précédé par celui de M. S. JACQUAT qui présente l'aspect historique et évoque la forte personnalité de C. Nicolet.

Troisième volet paléontologique, l'article de P. MOREL examine des ossements d'élan trouvés il y a plus d'un siècle dans un gouffre situé près des Verrières. La datation par le radiocarbone permet de situer dans le temps la présence de ces animaux dans les forêts jurassiennes, alors que leur aire de répartition européenne ne couvre plus aujourd'hui que la Scandinavie et l'est de notre continent.

La Phanérogamie est représentée par deux publications. Les Pandanacées constituent une importante famille de plantes monocotylédones dont on connaît actuellement plus de trois cents espèces dans l'Ancien Monde intertropical; K. L. HUYNH poursuit ses études sur le genre *Pandanus* en décrivant deux nouvelles espèces de Madagascar.

Puis S. M. GHAFARI et S. B. DJAVADI, deux botanistes iraniens, présentent l'étude chromosomique de neuf espèces de *Cousinia*, pour la plupart endémiques en Iran. Ce sont des Astéracées, famille que les plus âgés des lecteurs connaissent encore souvent sous le nom de Composées.

Après une absence qui suivit la disparition de Marguerite Wüthrich, on retrouve dans le Bulletin, grâce à F. Straub, des articles d'algologie. Dans ce numéro, O. REYMOND, F. STRAUB et H. R. PREISIG signalent pour la première fois *Chrysonobula holmesi* en Suisse et discutent de sa position systématique. Il s'agit d'une algue qui forme des amas mucilagineux sur les fonds caillouteux des cours d'eau propres. Les auteurs étudient, sous l'angle de la bioindication, les diatomées qui se développent dans le mucilage de *Chrysonobula*.

L'écologie végétale est représentée par trois travaux. Dans le premier, G. VADI et J.M. GOBAT traitent du problème de la podzolisation dans le Jura à la fois sous l'angle de la pédologie et de la phytosociologie. Les PODZOSOLS sont des sols de climats froids et humides. Ils sont caractérisés par des processus de chéluviation, c'est-à-dire d'entraînement de matière organique et de métaux, de fer par exemple, de la surface vers la profondeur. Les auteurs discutent de la présence de ces sols dans le Jura, en dépit de conditions pédologiques défavorables et établissent un lien entre la présence des PODZOSOLS et celle de la pessière à blechnum (une fougère caractéristique).

Dans un milieu différent, P. CORNALI présente le second volet de son étude des pinèdes de la rive sud du lac de Neuchâtel. La biomasse végétale, la quantité de litière et la vitesse de sa décomposition, la productivité de cette forêt sont quantifiées. La dynamique du groupement végétal, examinée à la lumière de ces données, indique une évolution vers une forêt de feuillus.

Enfin, W. MATHEY a procédé en 1998 à l'inventaire des gouilles dans la tourbière du Cachot (vallée de la Brévine). Ces points d'eau si caractéristiques des zones ouvertes à sphaignes avaient été recensés une première fois en 1968. La comparaison montre une diminution considérable de leur surface en une trentaine d'année.

L'entomologie est également présente. S. BARBALAT continue son étude des coléoptères vivant dans les forêts des Gorges de l'Areuse (Bulletins 118, 119, 120). Son article est consacré aux lucanidés (famille du lucane cerf-volant) et aux scarabées mangeurs de feuilles et de fleurs (chacun connaît au moins la cétoine dorée). Comme dans ses publications précédentes, l'auteur relève le lien entre la diversité structurale de la forêts (vieux arbres, lisières naturelles, clairières) et la diversité entomologique.

Puis, dans une note, E. DELLA SANTA mentionne la présence d'une espèce de fourmi tropicale trouvée sur un frangipanier au Papiliorama de Marin.

Enfin, comme de coutume, le Bulletin contient quatre rapports scientifiques concernant la météorologie régionale, le diagnostic parasitaire, l'aéropalynologie et, pour la troisième fois, Nature neuchâteloise, qui renseigne sur l'activité des services cantonaux concernés, de celui de la Protection de la Nature en particulier, en 1997. Un article concernant le plan de gestion du Loclat près de Saint-Blaise complète le rapport.

De quoi occuper quelques longues soirées d'hiver !

Les rédacteurs
Willy Matthey et Jacques Ayer