

Zeitschrift: Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles
Band: 23 (1887-1888)
Heft: 96

Artikel: Note sur un veau monstrueux
Autor: Bugnion, E.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-261390>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 16.10.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

NOTE SUR UN VEAU MONSTRUEUX

par Ed. BUGNION

Ce veau, présenté dans la séance du 15 juin, offre, ainsi qu'on l'observe quelquefois, plusieurs anomalies réunies sur le même individu, savoir :

1° Une *méningocèle* volumineuse, soit présence dans la région de la calotte crânienne d'une poche remplie de liquide, de la grosseur d'une tête d'homme environ, multiloculaire, constituée par la dure-mère et par la peau, plus développée à droite qu'à gauche, de manière à pendre comme une bourse au côté droit de la tête. L'ossification s'étant arrêtée à la base de la poche, on sent en arrière, au travers de ses parois, la pointe supérieure ou lambda de l'occipital, à peu près normalement développé, et de chaque côté les rudiments du frontal et du pariétal se terminant par un bord très net, comme les arcs des vertèbres dans le spina bifida. En fendant la poche, on constate qu'elle est formée par la dure-mère, parfaitement lisse à l'intérieur, et que la substance cérébrale est réduite en avant du tentorium à quelques rudiments englobés dans les filaments de la pie-mère et trop ramollis pour pouvoir être distingués nettement; le cervelet et la moelle allongée sont, au contraire, assez bien formés.

2° Un arrêt de développement de la mâchoire inférieure, réduite aux deux tiers environ de sa dimension normale.

3° Un arrêt de développement des membres antérieurs, ces parties étant représentées de chaque côté par un petit bourgeon conique, long de 3 centimètres, recouvert par la peau et dépourvu de pièces osseuses ou cartilagineuses à l'intérieur.

4° Une hernie ombilicale, avec procidence de l'estomac (caillette) et d'une portion de l'intestin grêle, dans le pédicule amniotique dilaté.

5° Une malformation du bassin, avec arrêt de développement des cartilages pubiens et rapprochement anormal des articulations coxofémorales, au point que les fémurs, qui ont subi une rotation en dedans, se touchent par leurs faces externes.

6° Un double pied bot des membres postérieurs, les doigts étant repliés en flexion forcée.

7° Enfin, dans la région lombaire droite, se trouve un *nævus* long de 10 centim. sur 5, formé d'un bourrelet de peau épaissi, proéminent et plissé sur lui-même.

Ce veau, un fœtus du sexe féminin, a été expulsé à l'âge de 8 mois par une vache qui avait déjà mis bas précédemment deux produits monstrueux. Les annexes n'ont malheureusement pas été conservées.

La pièce, qui fait partie de notre collection anatomique, a été obtenue de M. Valet, agriculteur à Renens, grâce à l'obligeante intervention de M. Bieler.

