

Une variété de la belette

Autor(en): **Narbel, P.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles**

Band (Jahr): **41 (1905)**

Heft 152

PDF erstellt am: **30.06.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-267587>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

UNE VARIÉTÉ DE LA BELETTE

PAR

P. NARBEL

La Suisse possède deux petits carnassiers qui se ressemblent beaucoup et qui sont souvent confondus, ce sont : l'hermine (*fætorius erminea*) et la belette (*fætorius pusillus*).

Cependant le diagnostic différentiel entre les deux espèces est facile à établir. Toutes deux sont brunes avec le ventre blanc, mais l'hermine a une queue assez longue, atteignant souvent la moitié de la longueur du corps. En outre cette queue est terminée invariablement par une touffe de poils noirs.

La belette, au contraire, a une queue beaucoup plus courte et ne présentant jamais cette touffe noire terminale.

Un autre caractère, qui du reste n'est pas aussi absolu, est que l'hermine change régulièrement de poil en hiver pour devenir blanche, ne gardant que sa touffe de poils noirs au bout de la queue, tandis que la belette conserve la même livrée toute l'année, sous nos latitudes tout au moins.

Enfin le trait le plus saillant qui sépare nettement ces deux espèces, c'est la taille de ces animaux. Tandis que la belette ne dépasse guère 26 à 27 cm. de longueur, une hermine adulte n'a jamais moins de 39 à 40 cm. Ces différences de taille sont constantes et présentent une importance considérable au point de vue des caractères spécifiques.

En effet il existe autour de la Suisse une variété de belette qui semble prendre place assez exactement entre notre belette et notre hermine indigènes.

M. le professeur Galli a signalé le premier le fait qu'en Valteline la belette atteint régulièrement des dimensions beaucoup plus considérables que l'espèce suisse. Il a bien voulu remettre un exemplaire de cette variété à l'auteur de ces notes. Cet exemplaire, dont les dimensions sont données ci-dessous, a la taille d'une jeune hermine, mais l'aspect très net d'une belette. La queue est courte et sans touffe terminale. Le ventre est d'un beau blanc, semé de quelques petites taches brunâtres. Le dos est d'un beau brun-roux.


De plus, ces belettes de Valteline, comme les nôtres, gardent la même livrée toute l'année, et M. le professeur Galli n'a jamais rencontré d'individus blancs en hiver. Cette variété intéressante quant à ses dimensions n'existe pas en Valteline seulement. M. Engel a bien voulu nous envoyer deux exemplaires absolument semblables à celui de la Valteline, et qui proviennent de Ripaille près Thonon, en Savoie. Ces deux sujets ne sont pas des individus isolés, mais bien des représentants d'une variété connue des garde-chasses qui en prennent souvent de semblables. Il est intéressant de signaler qu'en Savoie on trouve, côte à côte à cette variété plus grande, des sujets nettement adultes et qui ne dépassent pas les dimensions de l'espèce qu'on trouve en Suisse.

Nous donnons ici les dimensions principales des sujets de la Valteline et de Savoie que nous avons en mains, ceci comparé aux dimensions des espèces suisses décrites par V. Fatio dans sa *Faune des vertébrés de la Suisse*. Il est à remarquer que les dimensions données par Fatio ayant été prises sur un très grand nombre d'individus, elles représentent les limites extrêmes entre lesquelles peuvent varier les sujets de la même espèce.

Longueur	Hermine.	Belette.	Suj. de Valteline S. de Savoie	
totale :	0,395 — 0,450	0,220 — 0,270	0,325	0,330
de la tête :	0,053 — 0,055	0,038 — 0,043	0,047	0,048
du pied post :	0,046 — 0,048	0,025 — 0,030	0,035	0,033
de la queue :	0,115 — 0,155	0,052 — 0,075	0,067	0,064

Comme on le voit par ces quelques mesures, ces sujets provenant soit d'Italie, soit de Savoie, viennent prendre place exactement entre notre belette et notre hermine. Il est intéressant de signaler les variétés qui se rencontrent de nos espèces indigènes et l'on est frappé de voir des formes de passage entre des espèces nettement séparées. Il paraît donc prouvé qu'il existe à nos frontières une variété qui n'a pas encore été signalée et qui se rapproche un peu de la 3^e espèce de la subdivision du genre, le *Fætorius Boccamela* (Cetti), originaire de la Sardaigne et de l'Algérie. Cette belette diffère cependant considérablement de la nôtre par les dimensions qui sont beaucoup plus grandes et par la forme du crâne, notablement plus large que chez les espèces précédentes.

Nous donnons ci-dessous la photographie du crâne de la



Hermine.

Belette Valteline.

Belette indigène.

belette de Valteline entre le plus grand crâne de belette et le plus petit d'hermine adulte que nous avons trouvés dans notre collection particulière.

Nous serons reconnaissant à tous ceux entre les mains desquels tomberaient des exemplaires, soit de belette, soit d'hermine, de bien vouloir nous en faire part.

