

Liste des saules (*Salix* L.) du canton de Vaud (Suisse) et synonymie

Autor(en): **Moret, Jean-Louis**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles**

Band (Jahr): **92 (2010-2011)**

Heft 3-4

PDF erstellt am: **12.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-284226>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Liste des saules (*Salix* L.) du canton de Vaud (Suisse) et synonymie

par

Jean-Louis MORET¹

Résumé.—MORET J.-L., 2011. Liste des saules (*Salix* L.) du canton de Vaud (Suisse) et synonymie. *Bulletin de la Société vaudoise des Sciences naturelles* 92.3: 103-119.

Dans le but de faciliter la tâche des botanistes chargés de mesurer l'évolution de la flore vaudoise, une liste la plus complète possible des saules (*Salix* L.) signalés dans le canton de Vaud (Suisse) a été établie. Elle recense tous les noms latins que ces espèces portent ou ont porté dans la littérature actuelle ou ancienne. Elle est complétée de quelques commentaires.

Mots clés: *Salix*, Vaud

Abstract.—MORET J.-L., 2011. Willows' (*Salix* L.) list of the canton de Vaud (Switzerland) and synonymy. *Bulletin de la Société vaudoise des Sciences naturelles* 92.3: 103-119.

A list of the willows (*Salix* L.) of the canton de Vaud (Switzerland) is established to promote the analysis of flora's evolution. All the scientific names of the cited species are also given. Some comments complete this list.

Keywords: *Salix*, Vaud.

INTRODUCTION

La majorité des auteurs (voir, entre autres, SERINGE 1815, CAMUS & CAMUS 1904, BUSER 1940, HESS *et al.* 1976, MEIKLE 1984, MARTINI & PAIERO 1988, LAUTENSCHLAGER 1989, HÖRANDL 1992, LIEUTAGHI 2004) s'accorde à proclamer que les saules sont difficiles à déterminer, que ce soit d'après les fleurs (femelles ou mâles), ou d'après les caractères végétatifs (feuilles, écorce, bois, etc.). Dans le premier cas, les organes, fort petits, mêlés de poils et serrés dans un chaton compact, sont difficiles à discerner. Dans le second, les caractères, souvent très variables, même au sein d'un individu, sont peu discriminants entre les taxons. Ceci est dû à plusieurs facteurs, dont:

¹Musée botanique cantonal, Av. de Cour 14 bis, CH-1007 Lausanne.
E-mail: jean-louis.moret@unil.ch

– la plasticité morphologique des espèces influencée par les conditions d’humidité édaphique, par le microclimat stationnel, par l’abrouissement du bétail ou du gibier, par les attaques d’insectes ou de champignons;

– la fréquence des hybridations entre certaines espèces et la faculté de certains hybrides, la plupart du temps fertiles, de se croiser avec un des parents, avec une autre espèce ou avec un autre hybride !

Cette variabilité morphologique peut être encore accentuée, chez certaines espèces, par la présence de races polyploïdes –diploïdes à dodécaploïdes selon ARGUS (1986). En Europe, *Salix glaucosericea*, par exemple, regroupe des individus diploïdes, tétraploïdes, hexaploïdes, octoploïdes, voire décaploïdes (MARTINI & PAIERO 1988, LAUTENSCHLAGER 1989).

La difficulté de détermination qui en résulte se traduit, du point de vue nomenclatural, par une synonymie touffue, imbriquée, parfois circulaire.

Comme pour le genre *Carex* (MORET 2008), une synonymie exhaustive est proposée dans l’espoir d’aider les botanistes intéressés par la flore du canton et son histoire.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

La liste a été dressée à partir des noms figurant dans l’herbier vaudois de Lausanne (LAU) et des données proposées par les ouvrages traditionnellement utilisés dans le canton de Vaud: RAPIN (1842 & 1862), DURAND & PITTIER (1882), BINZ & THOMMEN (1941, 1976), HESS *et al.* (1976), WELTEN & SUTTER (1982), AESCHIMANN & BURDET (1994), LAUBER & WAGNER (1996, 2007). Elle a été complétée par les données mises à disposition par les sites du Centre du Réseau Suisse de Floristique (www.crsf.ch) et de swiss web flora (www.wsl.ch/land/products/webflora/). Les correspondances nomenclaturales, établies à partir des bases bibliographiques ci-dessus, ont été vérifiées dans WIMMER (1866), SCHINZ & KELLER (1900, 1909, 1923), MEIKLE (1984), MARTINI & PAIERO (1988), TUTIN *et al.* (1993), AESCHIMANN & HEITZ (1996, 2005), MORET (2006), dans l’Index kewensis (HOOKER 1893 et CD 1996), ainsi qu’à partir des sites internet suivants: International Organization for Plant Information (www.bgbm.org/IOPI/GPC/default.asp), The International Plant Name Index (www.ipni.org/ik_blurb.html), Tela-botanica (www.tela-botanica.org).

LES *SALIX* VAUDOIS

Les noms sont classés par ordre alphabétique. Les binômes retenus sont imprimés en gras. Ils sont suivis de la liste de leurs synonymes. Ceux-ci, à leur place dans l’ordre alphabétique, sont imprimés en italique et sont suivis du nom retenu, imprimé en gras, du taxon auquel ils se rapportent.

Les noms retenus sont complétés par une indication du groupe écologique auquel appartient le taxon, une précision concernant la fréquence et la catégorie de menace pesant sur le taxon dans les subdivisions JU1, MP1 et NA1 (figure 1). Groupes écologiques, degré de menace et subdivisions géographiques sont tirés de MOSER *et al.* (2002), (tableau 1). A la




Figure 1.—Le canton de Vaud s'étend sur les extrémités SW des subdivisions géographiques JU1, MP1 et NA1 proposées par MOSER *et al.* (2002).

Tableau 1.—A. Classes de fréquence des *Salix* de la flore vaudoise. B. Catégories de menace.

A	p. fr.	rare à peu fréquent
	a. fr.	assez fréquent
	fr.	fréquent
	t. fr.	très fréquent
B	LC	non menacée
	NT	potentiellement menacée
	VU	vulnérable
	EN	en danger
	CR	au bord de l'extinction
	RE	éteinte régionalement
	DD	données insuffisantes
	—	données manquantes
VD	protégée dans le canton de Vaud par le Règlement concernant la protection de la flore du 2 mars 2005	

fin de la ligne, entre crochets, figurent les mois de floraison, ainsi qu'une indication sur la simultanéité de la floraison et de la foliation:

fl. > f. = chatons apparaissant avant les feuilles;

fl. < f. = chatons apparaissant après les feuilles;

fl. = f. = chatons et feuilles contemporains.

1. Liste des *Salix* du canton de Vaud

Cette liste contient 28 espèces, 4 espèces douteuses, 35 hybrides dont un échantillon au moins figure dans l'herbier du Musée botanique cantonal à Lausanne (LAU) et 10 hybrides potentiellement présents dans le canton.

Les espèces douteuses pour le canton de Vaud sont signalées entre { }.

La nomenclature suit AESCHIMANN & HEITZ (2005).

Les espèces marquées d'un astérisque (*) font l'objet d'un commentaire au chapitre 3, à la page 113.

Chamitea reticulata (L.) Kern. = ***Salix reticulata*** L.

Salix acuminata Mill. = ***Salix cinerea*** L.

Salix acuminata Patze = ***Salix viminalis*** L.

Salix alba L. (forêt, aussi cultivé, a. fr., LC, LC, LC) [4-5, fl. = f.]

Salix aurea Salisb.

Salix cœrulea Sm.

Salix vitellina L.

Salix albicans Bonjean = ***Salix laggeri*** Wimm.

Salix alpina Schleich. = ***Salix hastata*** L.

Salix amaniana Willd. = ***Salix myrsinifolia*** Salisb.

Salix amygdalifolia Gilib. = ***Salix triandra*** L.

Salix amygdalina L. = ***Salix triandra*** L.

Salix andersoniana Sm. = ***Salix myrsinifolia*** Salisb.

Salix appendiculata Vill. (montagne, a. fr., LC, NT, LC) [4-7, fl. = f.]

Salix aurita L. var. *grandifolia* (Ser.) Fiori

Salix cinerascens Willd.

Salix grandifolia Ser.

Salix monandra Host

Salix schleicheriana J. Forbes

Salix aquatica Sm. = ***Salix cinerea*** L.

Salix arbuscula auct. non L. = ***Salix foetida*** DC.

Salix arbuscula auct. p.p. = ***Salix waldsteiniana*** Willd.

Salix arbuscula ssp. *foetida* (Schleich.) Braun-Blanq. = ***Salix foetida*** DC.

Salix arbuscula L. ssp. *waldsteiniana* (Willd.) Braun-Blanq. = ***Salix waldsteiniana*** Willd.

Salix arbuscula L. var. *waldsteiniana* (Willd.) Koch = ***Salix waldsteiniana*** Willd.

Salix arbuscula Pall. = ***Salix myrtilloides*** L.

Salix arbutifolia Willd. non Pall. = ***Salix breviserrata*** Flod.

*{***Salix arenaria*** L.} [fl. > f.]

Salix argentea Sm.

- Salix repens* ssp. *arenaria* (L.) Hiitonen
Salix repens ssp. *argentea* auct.
Salix repens var. *argentea* Sm.
Salix repens var. *nitida* (Ser.) Wendel
Salix argentea Sm. = ***Salix arenaria*** L.
Salix aurea Salisb. = ***Salix alba*** L.
Salix auriculata Mill. = ***Salix triandra*** L.
Salix aurita L. (marais, p. fr., LC, LC, LC) [4-5, fl. > f.]
Salix caprea L. var. *aurita* Huds.
Salix heterophylla Host
Salix paludosa Link
Salix rugosa Ser.
Salix spathulata Willd. p.p.
Salix uliginosa Willd.
Salix aurita var. *cinerea* (L.) Fiori = ***Salix cinerea*** L.
Salix aurita L. var. *grandifolia* (Ser.) Fiori = ***Salix appendiculata*** Vill.
****Salix babylonica*** L. [incl. *Salix x sepulcralis* Simonk.] (cultivé, ?, DD, DD, DD) [fl. ? f.]
Salix elegantissima C. Koch
Salix heteromera Hand.-Mazz.
Salix pendula Moench
Salix propendens Ser.
Salix bicolor Ehrh. = ***Salix phylicifolia*** L.
Salix bicolor ssp. *rhaetica* (Anderss.) Flod. = ***Salix x hegetschweileri*** Heer
*{***Salix bicolor*** Willd.} (montagne, p. fr., DD, DD, -) [5-7, fl. = f.]
Salix cantabrica Rech. f.
Salix phylicifolia auct.
Salix schraderiana Willd.
Salix weigeliana Willd.
Salix bigemmis Hoffm. = ***Salix daphnoides*** Vill.
Salix breviserrata Flod. (montagne, a. fr., -, -, LC) [6-7, fl. = f.]
Salix arbutifolia Willd. non Pall.
Salix dubia Suter
Salix myrsinites L. p.p.
Salix myrsinites auct. alpin. non L.
Salix myrsinites L. ssp. *serrata* (Neilr.) Schinz et Thell.
Salix pilosa Schleich.
Salix caesia Vill. (montagne, p. fr., -, -, VU, VD) [6-7, fl. = f.]
Salix divergens Anderss.
Salix myricaefolia Anderss.
Salix myrtilloides Willd. non L.
Salix subcaesia Brügg.
Salix cantabrica Rech. f. = ***Salix bicolor*** Willd.
Salix caprea L. (forêt, t. fr., LC, LC, LC) [3-5, fl. > f.]
Salix coaetanea (Hartm.) Flod.
Salix hybrida Vill.

- Salix praecox* Salisb.
Salix ulmifolia Thuill. non Vill.
Salix caprea L. var. *aurita* Huds. = ***Salix aurita*** L.
Salix caprea Vill. non L. = ***Salix cinerea*** L.
Salix carpinifolia Schleich. = ***Salix myrsinifolia*** Salisb.
Salix cinerascens Willd. = ***Salix appendiculata*** Vill.
Salix cinerea L. (marais, t. fr., LC, LC, LC) [3-4, fl. > f.]
Salix aquatica Sm.
Salix acuminata Mill.
Salix aurita var. *cinerea* (L.) Fiori
Salix caprea Vill. non L.
Salix dumetorum Suter
Salix spadicea Chaix
Salix coaetanea (Hartm.) Flod. = ***Salix caprea*** L.
Salix caerulea Sm. = ***Salix alba*** L.
Salix daphnoides Vill. (pionnier, a. fr., EN, NT, LC) [3-4, fl. > f.]
Salix bigemmis Hoffm.
Salix praecox Hoppe
Salix pulchra Wimm.
Salix decipiens Hoffm. = ***Salix fragilis*** L.
Salix depressa Hoffm. = ***Salix repens*** L.
Salix divergens Anderss. = ***Salix caesia*** Vill.
Salix dubia Suter = ***Salix breviserrata*** Flod.
Salix dumetorum Suter = ***Salix cinerea*** L.
Salix elaeagnos Scop. (pionnier, fr., LC, LC, LC) [3-5, fl. > f.]
Salix incana Schrank
Salix lavandulaefolia Lapeyr.
Salix patula Ser.
Salix riparia Willd.
Salix rosmarinifolia Host non L.
Salix elegans Besser = ***Salix myrtilloides*** L.
Salix elegans Host = ***Salix hastata*** L.
Salix elegantissima K. Koch = ***Salix babylonica*** L.
Salix fissa Hoffm. = ***Salix purpurea*** L.
Salix foetida DC. (montagne, fr., -, RE, LC) [6-7, fl. = f.]
Salix arbuscula auct. non L.
Salix arbuscula ssp. *foetida* (Schleich.) Braun-Blanq.
Salix venulosa auct. non Sm.
Salix fragilior Host = ***Salix fragilis*** L.
****Salix fragilis*** L. (forêt, aussi cultivé, p. fr., LC, LC, LC) [4-5, fl. = f.]
Salix decipiens Hoffm.
Salix fragilior Host
Salix fragilissima Host
Salix persicifolia Schleich.
Salix russeliana Sm.

- Salix fragilissima* Host = ***Salix fragilis*** L.
Salix glauca auct. non L. = ***Salix glaucosericea*** Flod.
Salix glauca L. var. *sericea* Trautv. et al. = ***Salix glaucosericea*** Flod.
****Salix glaucosericea*** Flod. (montagne, p. fr., –, –, VU) [6-7, fl. = f.]
 Salix glauca auct. non L.
 Salix glauca L. var. *sericea* Trautv. et al.
 Salix sericea Vill. non Marshall
Salix gmelinii auct. = ***Salix viminalis*** L.
Salix grandifolia Ser. = ***Salix appendiculata*** Vill.
Salix hastata L. (montagne, fr., –, –, LC) [6-8, fl. = f.]
 Salix alpina Schleich.
 Salix elegans Host
 Salix pontederæ Vill.
 Salix pontederana Willd.
 Salix tenuifolia Ser.
Salix hastata-weigeliæna Wimm. = ***Salix* x *hegetschweileri*** Heer
Salix helvetica Vill. (montagne, fr., –, –, LC) [6-7, fl. > f.]
 Salix lapponum L. p.p.
 Salix lapponum ssp. *helvetica* (Vill.) Schinz et Keller
 Salix lapponum var. *helvetica* (Vill.) Anderss.
 Salix limosa Wahlenb.
 Salix nivea Ser.
 Salix tomentosa Host
 Salix velutina Schleich.
Salix herbacea L. (montagne, fr., EN, –, LC) [7-8, fl. ≤ f.]
 Salix pumila Salisb.
Salix heteromera Hand.-Mazz. = ***Salix babylonica*** L.
Salix heterophylla Host = ***Salix aurita*** L.
Salix hoppeana Willd. = ***Salix triandra*** L.
Salix hybrida Vill. = ***Salix caprea*** L.
Salix incana Schrank = ***Salix elaeagnos*** Scop.
Salix kitaibeliana Willd. = ***Salix retusa*** L.
****Salix laggeri*** Wimm. (pionnier, p. fr., –, RE, EN, VD) [5-7, fl. = f.]
 Salix albicans Bonjean
 Salix pubescens Schleich.
Salix lapponum L. p.p. = ***Salix helvetica*** Vill.
Salix lapponum ssp. *helvetica* (Vill.) Schinz et Keller = ***Salix helvetica*** Vill.
Salix lapponum var. *helvetica* (Vill.) Anderss. = ***Salix helvetica*** Vill.
Salix laurina Loisel. = ***Salix phylicifolia*** L.
Salix lavandulaefolia Lapeyr. = ***Salix elaeagnos*** Scop.
Salix limosa Wahlenb. = ***Salix helvetica*** Vill.
Salix linearis Turcz. = ***Salix viminalis*** L.
Salix longifolia Lam. = ***Salix viminalis*** L.
Salix lucida A. Gray = ***Salix pentandra*** L.
Salix mollissima Koch = ***Salix viminalis*** L.

- Salix monandra* Ard. = ***Salix purpurea*** L.
Salix monandra Hoffm. = ***Salix purpurea*** L.
Salix monandra Host = ***Salix appendiculata*** Vill.
Salix myricaefolia Anderss. = ***Salix caesia*** Vill.
Salix myrsinifolia Salisb. (forêt, fr., LC, LC, LC) [4-6, fl. = f.]
Salix amaniana Willd.
Salix andersoniana Sm.
Salix carpinifolia Schleich.
Salix nigricans Sm.
Salix myrsinites L. p.p. = ***Salix breviserrata*** Flod.
Salix myrsinites auct. alpin. non L. = ***Salix breviserrata*** Flod.
Salix myrsinites L. ssp. *serrata* (Neilr.) Schinz et Keller = ***Salix breviserrata*** Flod.
* {***Salix myrtilloides*** L.} (marais, p. fr., -, -, CR) [5-7, fl. ≥ f.]
Salix arbuscula Pall.
Salix elegans Besser
Salix versifolia Wahlenb.
Salix weinmanniana Spreng.
Salix myrtilloides Willd. non L. = ***Salix caesia*** Vill.
Salix nigricans Sm. = ***Salix myrsinifolia*** Salisb.
Salix nivea Ser. = ***Salix helvetica*** Vill.
Salix obtusa Schleich. = ***Salix phylicifolia*** L.
Salix obtusa Thomas = ***Salix phylicifolia*** L.
Salix paludosa Link = ***Salix aurita*** L.
Salix patula Ser. = ***Salix elaeagnos*** Scop.
Salix pendula Moench = ***Salix babylonica*** L.
* ***Salix pentandra*** L. (montagne, aussi cultivé, p. fr., VU, VU, NT) [5-7, fl. = f.]
Salix lucida A. Gray
Salix persicifolia Schleich. = ***Salix fragilis*** L.
* ***Salix phylicifolia*** L. (montagne, p. fr., -, -, CR) [6, fl. = f.]
Salix bicolor Ehrh.
Salix laurina Loisel.
Salix obtusa Schleich.
Salix obtusa Thomas
Salix phylicifolia auct. = ***Salix bicolor*** Willd.
Salix phylicifolia auct. = ***Salix* × *hegetschweileri*** Heer
Salix phylicifolia (L.) Sm. = ***Salix* × *hegetschweileri*** Heer
Salix phylicifolia (L.) Sm. ssp. *rhaetica* (Flod.) A. Skvortsov = ***Salix* × *hegetschweileri*** Heer
Salix phylicifolia (L.) Sm. var. *puberula* Buser = ***Salix* × *hegetschweileri*** Heer
Salix phylicifolia (L.) Sm. var. *rhaetica* Kerner = ***Salix* × *hegetschweileri*** Heer
Salix phylicifolia-hastata Wimm. = ***Salix* × *hegetschweileri*** Heer
Salix pilosa Schleich. = ***Salix breviserrata*** Flod.
Salix polymorpha Ehrh. = ***Salix repens*** L.
Salix pontederæ Vill. = ***Salix hastata*** L.
Salix pontederana Willd. = ***Salix hastata*** L.
Salix praecox Hoppe = ***Salix daphnoides*** Vill.

- Salix praecox* Salisb. = *Salix caprea* L.
Salix pratensis Scop. = *Salix purpurea* L.
Salix propondens Ser. = *Salix babylonica* L.
Salix prostrata Sm. = *Salix repens* L.
Salix prunifolia auct. non Sm. = *Salix waldsteiniana* Willd.
Salix pubescens Schleich. = *Salix laggeri* Wimm.
Salix pulchra Wimm. = *Salix daphnoides* Vill.
Salix pumila Salisb. = *Salix herbacea* L.
Salix purpurea L. [incl. *Salix purpurea* ssp. *gracilis*] (pionnier, fr., LC, LC, LC) [3-6, fl. > f.]
 Salix fissa Hoffm.
 Salix monandra Ard.
 Salix monandra Hoffm.
 Salix pratensis Scop.
 Salix rubra Huds.
 ****Salix repens*** L. (marais, p. fr., NT, VU, NT) [4-6, fl. ≥ f.]
 Salix depressa Hoffm.
 Salix polymorpha Ehrh.
 Salix prostrata Sm.
 Salix rosmarinifolia L.
 Salix versifolia Ser.
Salix repens ssp. *arenaria* (L.) Hiitonen = *Salix arenaria* L.
Salix repens ssp. *argentea* auct. = *Salix arenaria* L.
Salix repens var. *argentea* Sm. = *Salix arenaria* L.
Salix repens var. *nitida* (Ser.) Wendel = *Salix arenaria* L.
Salix reticulata L. (montagne, fr., NT, – LC) [7-8, fl. = f.]
 Chamitea reticulata (L.) Kern
Salix retusa L. (montagne, fr., NT, – LC) [6-7, fl. = f.]
 Salix kitaibeliana Willd.
 Salix retusa ssp. *retusa* (L.) Schinz et Keller
Salix retusa ssp. *retusa* (L.) Schinz et Keller = *Salix retusa* L.
Salix retusa ssp. *serpillifolia* (Scop.) Arcang. = *Salix serpillifolia* Scop.
Salix rhaetica Kerner = *Salix* × *hegetschweileri* Heer
Salix riparia Willd. = *Salix elaeagnos* Scop.
Salix rosmarinifolia Host non L. = *Salix elaeagnos* Scop.
Salix rosmarinifolia L. = *Salix repens* L.
Salix rossica Nasarov = *Salix viminalis* L.
Salix rubra Huds. = *Salix purpurea* L.
Salix rugosa Ser. = *Salix aurita* L.
Salix russeliana Sm. = *Salix fragilis* L.
Salix schleicheriana Forb. = *Salix appendiculata* Vill.
Salix schraderiana Willd. = *Salix bicolor* Willd.
Salix sericea Vill. = *Salix glaucosericea* Flod.
 ****Salix serpillifolia*** Scop. (montagne, fr., –, –, LC) [7, fl. < f.]
 Salix retusa ssp. *serpillifolia* (Scop.) Arcang.

- Salix spadicea* Chaix = ***Salix cinerea*** L.
Salix spathulata Willd. p.p. = ***Salix aurita*** L.
Salix subcaesia Brügg. = ***Salix caesia*** Vill.
Salix tenuifolia Ser. = ***Salix hastata*** L.
Salix triandra L. (forêt, aussi cultivé, fr., LC, LC, LC) [4-5, fl. ≥ f.]
 Salix amygdalifolia Gilib.
 Salix amygdalina L.
 Salix auriculata Mill.
 Salix hoppeana Willd.
 Salix villarsiana Flüggé
Salix tomentosa Host = ***Salix helvetica*** Vill.
Salix uliginosa Willd. = ***Salix aurita*** L.
Salix ulmifolia Thuill. non Vill. = ***Salix caprea*** L.
Salix velutina Schleich. = ***Salix helvetica*** Vill.
Salix venulosa auct. non Sm. = ***Salix foetida*** DC.
Salix veriviminalis Nasarov = ***Salix viminalis*** L.
Salix versifolia Ser. = ***Salix repens*** L.
Salix versifolia Wahlenb. = ***Salix myrtilloides*** L.
Salix villarsiana Flüggé = ***Salix triandra*** L.
Salix viminalis L. (forêt, p. fr., souvent cultivé, LC, LC, LC) [3-4, fl. > f.]
 Salix acuminata Patze
 Salix gmelinii auct.
 Salix linearis Turcz.
 Salix longifolia Lam.
 Salix mollissima Koch
 Salix rossica Nasarov
 Salix veriviminalis Nasarov
 Salix virescens Vill.
Salix virescens Vill. = ***Salix viminalis*** L.
Salix vitellina L. = ***Salix alba*** L.
Salix waldsteiniana Willd. (montagne, fr., -, -, EN) [6, fl. = f.]
 Salix arbuscula auct. p.p.
 Salix arbuscula L. ssp. *waldsteiniana* (Willd.) Braun-Blanq.
 Salix arbuscula L. var. *waldsteiniana* (Willd.) K. Koch
 Salix prunifolia auct. non Sm.
Salix weigeliana Willd. = ***Salix bicolor*** Willd.
Salix weinmanniana Spreng. = ***Salix myrtilloides*** L.
 * {***Salix x hegetschweileri*** Heer} (montagne, ?, -, -, EN) [fl. > f.]
 Salix bicolor ssp. *rhaetica* (Anderss.) Flod.
 Salix hastata-weigeliana Wimm.
 Salix phylicifolia auct.
 Salix phylicifolia (L.) Sm.
 Salix phylicifolia (L.) Sm. ssp. *rhaetica* (Flod.) A. Skvortsov
 Salix phylicifolia (L.) Sm. var. *puberula* Buser
 Salix phylicifolia (L.) Sm. var. *rhaetica* Kerner

Salix phylicifolia-hastata Wimm.

Salix rhaetica Kerner

Salix × *sepulcralis* Simonk. incl. in *Salix babylonica* L.

2. Les hybrides

Les hybrides sont nombreux. Ils peuvent être le résultat de croisement entre deux espèces, voire trois ou plus. Les hybrides, parfois fertiles, peuvent se recombinaison avec un des parents. La variabilité des caractères morphologiques des espèces parentes est ainsi combinée, ce qui rend les hybrides difficiles à déterminer. Le tableau 2 présente la liste des hybrides dont un échantillon au moins figure dans l'herbier vaudois du Musée botanique cantonal. Le tableau 3 recense quelques taxons relevés dans la littérature suisse et qui pourraient se trouver dans le canton.

3. Commentaires sur quelques espèces de la liste

Salix arenaria L.

Selon AESCHIMANN & BURDET (1994), cette espèce, atlantique, n'aurait été vue en Suisse que près de Liestal, probablement plantée ou subspontanée. HESS *et al.* (1976), ainsi que MORET (1982) rapportent une observation de G. Kummer («prairie marécageuse, à 2 km à l'W de Villeneuve, dans le delta du Rhône.»), reprise des notes du prof. Arthur MAILLEFER (1951), mais dont aucun échantillon ne figure dans l'herbier vaudois du Musée botanique cantonal (LAU). Cette mention est plus que douteuse. (Voir aussi le commentaire sur *Salix repens*).

Salix babylonica L.

AESCHIMANN & BURDET (1994) relèvent que les saules pleureurs sont plantés comme arbres d'ornement et sont parfois subspontanés. Il s'agit de *Salix babylonica* (dont les feuilles des extrémités des rameaux, comme leurs pétioles, sont pubescentes et dont les fleurs femelles n'ont qu'une glande et les ovaires glabres), *Salix elegantissima* K. Koch (dont les feuilles, ainsi que leur pétiole, sont toutes glabres, et dont les fleurs femelles ont deux glandes et un ovaire faiblement pubescent à la base) et deux hybrides de *S. babylonica*: × *alba* (= *S. × sepulcralis* Simonkai) et × *fragilis*.

Relevons que pour certains (ESFEDS Edimburgh in IOPI), le binôme *S. elegantissima* est synonyme de *S. babylonica*, que pour IPNI c'est le basionyme de *S. pendulina* Wender var. *elegantissima* (K. Koch) Meikle et que pour Tela Botanica c'est un hybride (*S. × elegantissima* = *S. × pendulina* Wender), sans que soient précisés quels sont les parents.

Salix bicolor Willd.

WELTEN & SUTTER (1982) indiquent l'espèce L (information tirée de la littérature) dans le secteur 531 (Intyamon, FR).

Il n'y a pas d'échantillon de l'espèce dans l'herbier vaudois du Musée botanique cantonal (LAU).

A rechercher sur les sols décalcifiés du Pays d'Enhaut pour en confirmer la présence éventuelle sur territoire vaudois.

Tableau 2.—Liste des hybrides selon l'herbier vaudois (LAU). Sauf précision contraire, la nomenclature suit JANCHEN (1956) et POLATSCHKEK (2000).

- S. alba* × *fragilis* = *S. x rubens* Schrank [= *S. x russeliana* W.D.J. Koch, selon AUBERT (1901)]
S. alba × *purpurea*
S. alba × *triandra* = *S. x undulata* Ehrh.
S. appendiculata × *elaeagnos* = *S. x intermedia* Host [= *S. x subalpina* Schleich., selon AUBERT (1901)]
S. appendiculata × *foetida*
S. appendiculata × *myrsinifolia* = *S. x milzii* J. Murr
S. appendiculata × *purpurea* = *S. x austriaca* Host [= *S. x neriifolia* Schleich., selon AUBERT (1901)]
S. appendiculata × *repens* = *S. x proteifolia* Forbes
S. aurita × *appendiculata* = *S. x limnogenae* A. Kerner
S. aurita × *caprea* = *S. x capreola* Kerner
S. aurita × *myrsinifolia* = *S. x coriacea* Schleich.
S. aurita × *purpurea* = *S. x dichroa* Döll
S. aurita × *repens* = *S. x ambigua* Ehrh.
S. caprea × *elaeagnos* = *S. x flueggeana* Willd. [= *S. x lanceolata* Seringe, selon JANCHEN (1956); = *S. x seringeana* Gaudin, selon AUBERT (1901)—D'après GREMLI (1867), *Salix seringiana* Gaudin serait l'hybride *S. cinerea* × *elaeagnos* (tableau 3). Or, GAUDIN (1830), dans les observations concernant ce taxon précise que la pilosité des feuilles rappelle celle de *Salix caprea* [«*Foliorum tomento magis ad capream accedit [...]*»] ce qui militerait en faveur d'une hybridation avec *S. caprea* et non *S. cinerea*]
S. caprea × *myrsinifolia* = *S. x latifolia* Forbes
S. caprea × *purpurea* = *S. x wimmeriana* Gren. & Godr.
S. caprea × *viminalis* = *S. x mollissima* Sm. [voir *S. triandra* × *viminalis* = *S. x mollissima* Ehrh. (JANCHEN 1956)]
S. cinerea × *appendiculata* = *S. x scrobigerae* Wołoszczak
S. cinerea × *aurita* = *S. x multinervis* Döll
S. cinerea × *caprea* = *S. x reichardti* Kern.
S. cinerea × *myrsinifolia* = *S. x vaudensis* Schleich. [= *S. x vaudensis* Forbes, selon DURAND & PITTIER (1882), HÖRANDL (1992)]
S. cinerea × *viminalis* = *S. x holosericea* Willd.
S. elaeagnos × *purpurea* = *S. x wichurae* Pokorny
S. elaeagnos × *repens* = *S. x subalpina* Forbes
S. foetida × *helvetica* = *S. x spuria* Buser
S. hastata × *appendiculata* = *S. x pustariae* Rouy
S. hastata × *helvetica* = *S. x huteri* Kerner
S. helvetica × *appendiculata* = *S. x khekii* Wołoszczak
S. helvetica × *glaucosericea*
S. myrsinifolia × *helvetica*
S. myrsinifolia × *purpurea* = *S. x beckeana* Beck
S. myrsinifolia × *retusa* = *S. x cotteti* Lagger
S. purpurea × *cinerea* = *S. x sordida* Kerner
S. purpurea × *repens* = *S. x doniana* Sm.
S. purpurea × *viminalis* = *S. x rubra* Huds. = *S. x helix* L.
S. triandra × *viminalis* = *S. x mollissima* Ehrh. (JANCHEN 1956) [voir *S. caprea* × *viminalis* = *S. x mollissima* Sm.]

Tableau 3.–Liste des hybrides dont aucun échantillon ne figure dans l'herbier vaudois (LAU), mais qui pourraient se trouver dans le canton de Vaud selon GREMLI (1867) et HESS *et al.* (1976).

GREMLI (1867)

- S. daphnoides* × *elaeagnos* = *S. x reuteri* Moritzi
S. elaeagnos × *cinerea* = *S. x seringeana* Gaudin
S. pentandra × *fragilis* = *S. x cuspidata* Schultz

HESS *et al.* (1976)

- S. aurita* × *hastata*
S. aurita × *daphnoides*
S. aurita × *viminalis*
S. daphnoides × *purpurea*
S. daphnoides × *viminalis*
S. hastata × *purpurea*
S. viminalis × *repens*

Remarque: LAUBER & WAGNER (2007) mettent en synonymie *S. bicolor* Willd. et *S. phylicifolia* L. dans l'agrégat *S. phylicifolia* auct., alors qu'AESCHIMANN & HEITZ (2005) en font deux espèces distinctes –point de vue que j'ai adopté. Il est probable qu'il y ait confusion entre *Salix bicolor* L. (espèce à part entière) et *S. bicolor* Ehrh. (= *S. phylicifolia* L.).

Salix fragilis L.

Selon HESS *et al.* (1976) et AESCHIMANN & BURDET (1994), l'espèce est très rare sur le plateau et seulement plantée. On trouve plus fréquemment l'hybride *S. alba* × *fragilis* (= *S. x rubens* Schrank), souvent confondu avec l'espèce type.

Salix glaucosericea Flod.

Le catalogue de DURAND & PITTIER (1882) signale l'espèce aux Martinets, à Nant, Bouélaire, La Varaz et Paneyrossaz, ainsi qu'un hybride avec *S. helvetica* sous les Martinets. Indication L (WELTEN & SUTER 1982) pour les secteurs 511 (Tours d'Aï), 516 (VD/VS) et 526 (Diablerets-Anzeindaz).

Il n'y a pas d'échantillon de l'espèce dans l'herbier vaudois du Musée botanique cantonal (LAU).

Malgré de nombreuses recherches effectuées dans le secteur Martinets-Nant, l'espèce n'a pas été observée ces dernières années, mais le site est riche en *S. helvetica*, ce qui rend difficile le repérage d'éventuels individus de *S. glaucosericea* (P. Vittoz, comm. pers.)

A rechercher pour en confirmer la présence sur territoire vaudois.

Salix laggeri Wimmer

Signalé par WELTEN & SUTTER (1982) dans le secteur 526: Diablerets-Anzeindaz.

Il n'y a pas d'échantillon de l'espèce dans l'herbier vaudois du Musée botanique cantonal (LAU), mais elle a été observée au Vallon de Nant lors des premières journées de la biodiversité en Suisse romande – 5 et 6 juillet 2008 (VITTOZ & DESSIMOZ 2009).

Salix myrtilloides L.

Peu de temps après l'avoir vu dans la tourbière de Gamperfin sur le Grabserberg (SG) (MORET 1994), j'ai repéré, dans un bouquet ornant une table de l'Auberge de la Vraconnaz, un rameau ressemblant fortement à *S. myrtilloides*. Malheureusement, les tenanciers de l'auberge n'ont, malgré mon insistance, jamais accepté de me dire où ils l'avaient cueilli. *S. myrtilloides* serait-il présent dans la tourbière de la Vraconnaz ?

A rechercher pour en confirmer la présence sur territoire vaudois.

Salix pentandra L.

DURAND & PITTIER (1882) disent l'espèce fréquemment cultivée. Dans son récit d'excursion à la Vallée de Joux et dans le Jura neuchâtelois en 1813, Jean Gaudin note que du Sentier aux Charbonnières: «on voit quantité de Saules odorants [= *S. pentandra*] dont les habitans font des haies vives [...]» (MORET 1990).

Selon BINZ & THOMMEN (1976), il existe une var. *angustifolia* G. Mey. dont les feuilles sont lancéolées plutôt qu'elliptiques.

Salix phylicifolia L.

THOMAS & CHARPENTIER (1832) mentionnent l'espèce à Gryon. Actuellement, elle n'est pas signalée dans le canton par WELTEN & SUTTER (1982) ou par le Centre du Réseau Suisse de Floristique. Dans l'herbier vaudois du Musée botanique cantonal (LAU), il existe trois échantillons récoltés dans les environs de Gryon et classés sous ce nom:

1.-N° classement: 553, n° enregistrement: SAL 2466. *Salix phylicifolia* L. Herbier Jean Muret. Gryon. 3 juin [18]60. masc.

2.-N° classement: 553, n° enregistrement: SAL 2467. *Salix phylicifolia* L. I. *stylosa* (*S. stylosa* DC.). Herbier Jean Muret. Gryon. 15 May [18]41. fém. [Ovaire glabre, stigmaté env. 1/4 ovaire].

3.-N° classement: 553, n° enregistrement: SAL 2468. *Salix obtusa* Thomas. Herbier Louis Leresche. Jorogne au-dessus de Gryon, Alpes de Bex. Donné par Mr Eml Thomas.

L'échantillon SAL 2466 n'est pas déterminable. L'échantillon SAL 2467 présente beaucoup de caractères de *S. phylicifolia*, mais les ovaires sont glabres. L'échantillon SAL 2468 montre aussi beaucoup de caractères de *S. phylicifolia*, mais les styles sont courts, voire nuls. Il est probable que ces échantillons sont des hybrides dont l'un des parents est *S. phylicifolia*, l'autre parent n'étant pas connu.

Voir la remarque sous *Salix bicolor* L.

Salix repens L.

Salix repens L. ne serait présent qu'à la Vallée de Joux. Ailleurs en Suisse, ce serait un hybride, *S. repens* x *S. rosmarinifolia* (HESS *et al.* 1976), *S. arenaria* L. (dont la présence en Suisse n'est pas prouvée) ou *S. rosmarinifolia* L. (qui, selon HESS *et al.* (1976), ne serait présent que dans la région de Fribourg-en-Brigau et pas en Suisse). Ces différents taxons forment le complexe *S. repens* s.l., dont HÖRANDL (1992) dit qu'il est un des plus compliqué du genre *Salix*. Il suffit de tenter de dresser la liste des synonymes qu'ils ont portés depuis Linné (1753) pour s'en convaincre.

Salix serpillifolia Scop.

Le catalogue de DURAND & PITTIER (1882) signale l'espèce à la Grandvire, Javerne, Nant, à Mayen, à la Gummfluh et à Tzaofauthy. Dans son exemplaire annoté, Henri Jaccard a ajouté: Le Coin, Ai, Mont d'Or !, Isenau verst. N !; dans le sien, Jonathan Moehrlen a quant à lui ajouté: Morcles.

Remarque: sur un «Panorama des Rochers de Naye» publié en 1892, *Tzaofauthy*, sous le nom de *Tsaufoauthy* ou *Vanil de Tsavaz*, 2347 m, apparaît à l'est du Vanil Noir et du Vanil de l'Ecri. C'est l'actuelle *Pointe de Paray*, située au sud-sud-ouest de ces deux sommet, que l'angle de vue pris des Rochers de Naye fait apparaître à leur orient. Elle domine le pâturage de *Tsavas*, situé sur territoire fribourgeois.

Il n'y a pas d'échantillon de l'espèce dans l'herbier vaudois du Musée botanique cantonal (LAU), mais elle a été observée à plusieurs reprises et à plusieurs endroits dans le Vallon de Nant (VITTOZ & DESSIMOZ 2009).

Salix x *hegetschweileri*

WELTEN & SUTTER (1982) indiquent le taxon L dans le secteur 531 (Intyamou –FR).

Il n'y a pas d'échantillon dans l'herbier vaudois du Musée botanique cantonal (LAU).

A rechercher au Pays d'Enhaut pour en confirmer la présence éventuelle sur territoire vaudois.

REMERCIEMENTS

Joëlle Magnin-Gonze et Pascal Vittoz ont très attentivement relu le manuscrit et y ont apporté de nombreuses améliorations. Qu'ils soient ici très chaleureusement remerciés.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages publiés

- ***, 1996. Index kewensis on compact disc. Oxford, Oxford University Press. 1 CD.
- AESCHIMANN D. & BURDET H.M., 1994. Flore de la Suisse et des territoires limitrophes. Le nouveau Binz. Neuchâtel, Ed. du Griffon. 603 p.
- AESCHIMANN D. & HEITZ Ch., 1996. Index synonymique de la Flore de Suisse et territoires limitrophes. *Documenta Floristicae Helvetiae* 1. 317 p.
- AESCHIMANN D. & HEITZ Ch., 2005. Index synonymique de la Flore de Suisse et territoires limitrophes. *Documenta Floristicae Helvetiae* N° 2. 2^e édition. 323 p.
- ARGUS G.W., 1986. The Genus *Salix* (Salicaceae) in the Southeastern United States. *Systematic Botany Monographs* 9: 170 p.
- AUBERT S., 1901. La flore de la Vallée de Joux. Etude monographique. Lausanne, Corbaz. 741 p.
- BINZ A. & THOMMEN E., 1941. Flore de la Suisse y compris les parties limitrophes de l'Ain et de la Savoie. Lausanne, Rouge. 423 p.
- BINZ A. & THOMMEN E., 1976. Flore de la Suisse y compris les parties limitrophes de l'Ain et de la Savoie. 4^e édition par P. Villaret, Neuchâtel, Ed. du Griffon. 398 p.
- BUSER R., 1940. Kritische Beiträge zur Kenntnis der schweizerischen Weiden. Herausgegeben von Walo Koch. *Ber. Schweiz. Bot. Ges.* 50: 567-788.
- CAMUS A. & CAMUS E.-G., 1904. Classification des saules d'Europe et monographie des saules de France. Paris, Mersch. 386 p.

- DURAND Th. & PITTIER H., 1882. Catalogue de la flore vaudoise. Lausanne, Rouge. 549 p.
- GAUDIN J.F., 1830. Flora helvetica sive historia stirpium hucusque cognitarum in Helvetia. Zurich, Orell & Fussli. Vol. VI, 400 p.
- GREMLI A., 1867. Excursionsflora für die Schweiz. Aarau, Christen. 1^{re} édition, 392 p.
- HESS H.E., LANDOLT E. & HIRZEL R., 1976. Flora der Schweiz und angrenzender Gebiete. Basel, Stuttgart, Birkhäuser. Vol. 1, 858 p.
- HOOKE J.D. (Eds.), 1893. Index kewensis plantarum phanerogamarum. Oxford, Clarendon. Vol.1, 728 p.
- HÖRANDL E., 1992. Die Gattung Salix in Österreich mit Berücksichtigung angrenzender Gebiete. *Abhandl. Zool.-Bot. Gesell. in Österreich* 27. 170 p.
- JANCHEN E., 1956. Catalogus Florae Austriae. Heft 1. Wien, Springer: 99-114.
- LAUBER K. & WAGNER G., 1996. Flora helvetica. 1^{re} édition allemande, Berne, Haupt. 1613 p.
- LAUBER K. & WAGNER G., 2007. Flora helvetica. 3^e édition française, Berne, Haupt. 1631 p.
- LAUTENSCHLAGER E., 1989. Die Weiden der Schweiz und angrenzender Gebiete. Birkhäuser, Bâle. 136 p.
- LIEUTAGHI P., 2004. Le livre des arbres, arbustes et arbrisseaux. Arles, Actes Sud. 2^e éd., 1322 p.
- LINNÉ C., 1753. Species Plantarum. Stockholm. Salvi. 2 vol.
- MARTINI F. & PAIERO P., 1988. I salici d'Italia. Trieste, LINT. 2^e édition, 160 p.
- MEIKLE R.D., 1984. Willows and Poplars of Great Britain and Ireland. BSBI Handbook n° 4. London, Botanical Society of the British Isles. 198 p.
- MORET J.-L., 1982. Flore aquatique et paludéenne de la région des Grangettes. Esquisse d'un catalogue dynamique. *Mémoires de la Société vaudoise des Sciences naturelles* 17.3: 117-159.
- MORET J.-L., 1990. Journal d'une excursion à la Vallée de Joux et dans les montagnes neuchâteloises, en 1813. Un manuscrit inédit du botaniste vaudois Jean Gaudin. *Bulletin de la Société vaudoise des Sciences naturelles* 80.1: 1-47.
- MORET J.-L., 1994. Excursion ptéridologique et paludologique en Suisse orientale du 25 au 28 août 1993 (AG, ZG, SG, AI, AR, SZ). *Bull. Cercle vaud. bot.* 23: 43-51.
- MORET J.-L., 2006. Les noms des espèces ligneuses d'Europe moyenne. (Arbre, arbustes, arbrisseaux et sous-arbrisseaux indigènes ou fréquemment plantés pour le rapport ou l'ornement). Bussigny, Rossolis. 256 p.
- MORET J.-L., 2008. Liste des *Carex* du canton de Vaud (Suisse). *Bulletin de la Société vaudoise des Sciences naturelles* 91.2: 129-155.
- MOSER D.M., GYGAX A., BÄUMLER B., WYLER N. & PALESE R., 2002. Liste rouge des fougères et plantes à fleurs menacées de Suisse. Berne, OFEFP, Genève, CRSF, Série OFEFP «L'environnement pratique». 118 p.
- POLATSCHKE A., 2000. Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg. Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum. Vol. 4, 1083 p.
- RAPIN D., 1842. Le guide du botaniste dans le canton de Vaud. Lausanne, Delisle. 488 p.
- RAPIN D., 1862. Guide du botaniste dans le canton de Vaud. 2^e édition, Genève et Paris, Cherbuliez. 772 p.
- SCHINZ H. & KELLER R., 1900. Flora der Schweiz. Zum Gebrauche auf Exkursionen und beim Selbstunterricht. Zürich, Raustein. 628 p.
- SCHINZ H. & KELLER R., 1909. Flora der Schweiz. Zum Gebrauche auf Exkursionen und beim Selbstunterricht. I. Teil: Exkursionsflora. 3^e édition, Zürich, Raustein. 648 p.
- SCHINZ H. & KELLER R., 1923. Flora der Schweiz. Zum Gebrauche auf Exkursionen und beim Selbstunterricht. Zürich, Raustein. 4^e édition, 792 p.
- SERINGE N.C., 1815. Essai d'une monographie des saules de la Suisse. Berne, chez la Société Typographique. 100 p.
- TUTIN T.G., BURGESS N.A., CHATER A.O., EDMONDSON J.R., HEYWOOD V.H., MOORE D.M., VALENTINE D.H., WALTERS S.M. & WEBB D.A., 1993. Flora europaea. Cambridge, Cambridge University Press. Vol. 1, 2^e édition, 581 p.
- VITTOZ P. & DESSIMOZ F., 2009. Flore vasculaire du Vallon de Nant (Bex, Alpes vaudoises). In: PLUMETTAZ CLOT A.-C., CHERIX D., DESSIMOZ F., GATTOLLIAT J.-L., GMÜR P., VITTOZ P. & VUST M. (Eds) Biodiversité du Vallon de Nant. *Mémoires de la Société vaudoise des Sciences naturelles* 23: 85-114.

- WELTEN M. & SUTTER R., 1982. Atlas de distribution des ptéridophytes et des phanérogames de la Suisse. Bâle, Birkhäuser. Vol 1, 716 p.
WIMMER R., 1866. Salices europaeae. Vratislava, Hirt. 286 p.

Manuscrits

- MAILLEFER A., 1951. Florule de la plaine du Rhône, de Villeneuve à Aigle. Tapuscrit inédit. Lausanne, Musée botanique cantonal. 148 p.
THOMAS E. & CHARPENTIER J., 1832. Catalogue des plantes qui croissent spontanément dans les districts d'Aigle et du Pays d'Enhaut romand. Manuscrit. Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, Cabinet des manuscrits, Archives SVSN, IS 3693.

Matériel cartographique

Vue panoramique prise du sommet des Rochers de Naye (2044 m), publié par la Sous-Section de Jaman du C.A.S., sous les auspices de la Section des Diablerets, dessinée et gravée par X. Imfeld, Ingénieur, 1883. Aug. Jacot Guillarmod Libraire & J.H. Barrelet Editeurs, Vevey, 1892.

Sites internet

CRSF. Centre du réseau suisse de floristique (www.crsf.ch)
IOPI. International Organization for Plant Information (www.bgbm.org/IOPI/GPC/default.asp)
IPNI. The International Plant Name Index (www.ipni.org/ik_blurb.html)
Swiss Web Flora (www.wsl.ch/land/products/webflora/)
Tela Botanica (www.tela-botanica.org)

Manuscrit reçu le 23 mars 2011

