

Un nouveau *Knautia* helvétique

Autor(en): **Wilczek, E.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany**

Band (Jahr): **3 (1926-1929)**

PDF erstellt am: **23.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-879114>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

UN NOUVEAU KNAUTIA HELVÉTIQUE

par

E. WILCZEK

Knautia silvatica Dub. var. *Briquetiana* Wilcz., var. nov. — Caulis ad 50 cm. altus, superne (vel nonnunquam jam inferne) divaricatum ramosus, internodiis inferioribus brevibus pilis setaceis retrorsis longis dense obsitis, caeteris elongatis pilis brevibus densis cinerascentibus et practerea pilis setaceis rarioribus praeditis. Folia evoluta in caulis parte inferiore subsessilia vel breviter lateque petiolata, congesta, elliptico-lanceolata, serrata vel inciso-serrata, apice integre acuminata, duriuscula, supra pilis setaceis sparsis praedita, subtus pilis setaceis in nervis crebris aliorsum sparsis praeter pilos minimos in parenchymate densiusculos praedita; folia superiora brevia, angustiora, sessilia, integra vel subintegra. Pedunculi elongati, crassiusculi, praeter pilos setaceos et pilos breves glandulis stipitatis crebris ornati. Capitula mediocria, sub anthesi diam. circ. 2,5 cm. lata. Bractee involucales exteriores late lanceolatae, interiores angustiores, omnes indumento eodem ac pedunculi praeditae, quam flores exteriores breviores. Calix limbo distincte pedicellato, demum patelliformi, dentibus basi triangulari-lanceolatis, subito ac longe aristatis, parte inferiore barbato-villosis, 2,5-3 mm. altis. Corolla intense violacea, parce puberula. Fructus ellipsoideus, sect. long. circ. 4,5×1,5 mm., pilis mollibus mediocribus adscendentibus obtectus.

Suisse. Vaud : alpes de Morcles, pelouses alpines sur Riondaz, alt. 2200 m., leg. E. Wilczek.

Race remarquable par la présence du court indument mou et cendré des entrenœuds caulinaires allongés et de la page inférieure des feuilles, indument qui rappelle celui des *Knautia* du groupe *Subcanescentes*, mais inséparable du *K. silvatica* par l'ensemble de ses caractères — opinion qui est partagée par notre ami M. Briquet.