

Nomina Honckenyanana neglecta

Autor(en): **Becherer, A.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany**

Band (Jahr): **4 (1929-1931)**

PDF erstellt am: **02.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-879073>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

NOMINA HONCKENYANA NEGLECTA

PAR

A. BECHERER

I

Dans le *Vollständiges Systematisches Verzeichniss aller Gewächse Teutschlandes* de G. A. Honckeny, vol. I et unique, paru en 1782 à Leipzig, on trouve, à la page 653, un *Phyteuma ovata*. Présument que cette espèce pourrait être identique au *Ph. Halleri* All., espèce bien connue orophile européenne (Pyrénées, Alpes jusqu'à la Serbie, Apennins), nous avons, après quelques recherches, trouvé que cette identité existe en réalité. Malheureusement, ce fait entraîne un changement de nomenclature.

Le *Phyteuma ovata* est publié dans l'ouvrage cité de Honckeny comme suit :

[*Phyteuma*] *ovata*¹. 535. A[rt] *Eyrunde Rap[unzel]*. Blühet auf den Alpen.

Haller. Enum. 499. n. 6. Rapunc. foliis plerisque cordatis spica *ovata*² obesa, Murray. 47. Phyt. spicata var. β spica ovata obesa scheint zu dieser Art zu gehören.

— Hist. n. 683 Rapunc. foliis radicalibus cordiformibus acute incisis, tubis hirsutis, longissimis emarginatis.

Scheuchz. It. Alp. VII, p. 518. Rapunc. spicatus florepur pureo violaceo.

En vue de la comparaison, nous faisons suivre les données fournies par Allioni (*Fl. Pedemont.* I, p. 116 [1785]) pour le *Phyteuma Halleri* de cet auteur.

¹ Dans ce livre de Honckeny, les épithètes spécifiques figurent en marge du texte, comme dans les ouvrages de Linné et d'autres auteurs anciens.

² C'est nous qui soulignons.

N. 430. *Phyteuma Hallerii*.

Rapunculus foliis radicalibus cordiformibus, acute incis, tubis longissimis hirsutis emarginatis. Hall. hist. tom. I. n. 683.

Rapunculus foliis plerisque cordatis, spica ovata obaesa. Hall. Hel. 499.

Rapunculus spicatus flore purpureo-coeruleo¹. Scheuchz. it. p. 518.

Loc. Felix Valle observavit in fertilissimis pratis l'Echallier supra montem Fraisen. Legi uberrime circa thermas Vinadii, et Valderii in pratis umbrosis ; similibusque locis in alpiibus Monregalensis, et Valdensibus adinvenitur ; uti etiam in monte Cenisio. Perenne.

Il est évident que Honckeny et Allioni citent les mêmes synonymes tirés de Haller et de Scheuchzer. L'examen du texte de ces auteurs montre à l'évidence (Haller, *Enum. meth. Stirp. Helv. indig.* I, p. 499 [1742] ; *Hist. Stirp. indig. Helv. inch.* I, p. 304 [1768] ; Scheuchzer, *It. Alp.* VII, p. 518, 1709 [1723]), que tous deux décrivent la plante dénommée *Ph. Hallerii* par Allioni.

En conséquence, le nom de *Phyteuma ovatum* Honckeny (1782), synonyme du *Ph. Halleri* All. (1785), mais publié avant ce dernier nom, doit être restitué comme nom valable. Nous regrettons vivement l'abandon d'un nom très usité, mais les *Règles de la Nomenclature botanique* actuelles ne permettent pas d'exceptions dans ces cas, puisqu'aussi bien il n'existe pas de liste de *Nomina specifica conservanda*². Au reste, le nom de *Ph. ovatum* a été employé, comme nous le montrerons ci-dessous, après Honckeny et indépendamment de ce dernier, par plusieurs auteurs.

Ajoutons que le nom de *Phyteuma ovatum (ovata)* Honckeny ne figure pas dans l'*Index Kewensis* (le *Verzeichniss* de Honckeny manque à Kew), ni dans le *Monographische Bearbeitung der Gattung Phyteuma* de Rich. Schulz (1904).

Les synonymes principaux du *Phyteuma ovatum* Honckeny sont les suivants :

¹ Erreur d'Allioni ; Scheuchzer écrit purpureo-violaceo.

² L'élaboration d'une telle liste proposée par Suringar (*Mededeel. van's Rijks Herb.* 56, p. 67, 1928 ; *Mitteil. Deutsch. Dendrol. Ges.* 40, p. 306, 1928) et Rehder (*Journ. of the Arnold Arbor.* vol. X, no 1, p. 47, 54, 1929), serait, à notre avis, une chose impossible.

Phyteuma ovatum [*ovata*] Honckeny *Verz. aller Gewächse Teutschl.* I, p. 653 (1782) ; [*ovatum*] F. W. Schmidt *Fl. Boëm. Cent.* II, p. 87 (1793) ; [*ovata*] Willd. *Spec. pl.* I 2, p. 923 (1798) ; [*ovatum*] Hoffm. *Deutschl. Fl.* ed. 2 I, p. 105 (1800) (color coerulescens et lutescens, ergo pro parte tantum ad speciem nostram pertinens) ; [*ovata*] Suter *Fl. Helv.* I, p. 131 (1802) et ed. 2 (ed. Hegetschw.) I, p. 157 (1822) ; ? [*ovatum*] Röhling *Deutschl. Fl.* ed. 2 II, p. 71 (1812) ; [*ovata*] Wahlenb. *De Veget. et clim. in Helv. septentr.*, p. 43 (1813) ; [*ovata*] Schleicher *Cat. pl. Helv.* ed. 3, p. 22 (1815) (nomen) ; ? [*ovatum*] Dulac *Fl. Dép. Ht.-Pyrén.*, p. 455 (1867) ; [*ovatum*] Hoppe exsicc. p. parte = *Ph. Halleri* [*Hallerii*] All. *Fl. Pedem.* I, p. 116 (1785) ; Honckeny *Syn. Pl. Germ.* (ed. Willdenow) II, p. 250 (1793)¹ ; A. DC. *Monogr. Camp.*, p. 198 (1830) et in DC. *Prodr.* VII 2, p. 453 (1839) ; R. Schulz *Monogr. Bearb. Gatt. Phyteuma*, p. 71 (1904) ; et auct. omn. recent. = *Ph. urticaefolium* Clairv. *Man. herb.* p. 63 (1811) ; [*urticifolium*] St. Lager *Cat. Fl. Bass. Rhône* 6, p. 500 (1881) = *Ph. spicatum* var. *coeruleum* Hegetschw. *Reisen i. d. Gebirgsstock zw. Glarus u. Graubünden*, p. 149 (1825).

Parmi les homonymes non valables citons :

Phyteuma ovata Lam. *Ill.* II, p. 68 (1793) (= *Ph. Scheuchzeri* All. [1774]). — *Ph. ovatum* Hoppe *Bot. Taschenb.*, p. 82 (1794) et exsicc. p. parte (= *Ph. nigrum* F. W. Schmidt [1793]). — *Ph. ovata* Baumg. *Enum. stirp. Transsilv.* I, p. 158 (1816) et exsicc. (= *Ph. Vagneri* A. Kerner [1875]).

II

Un autre cas tout à fait analogue au précédent est celui du *Phleum hirsutum* Honckeny (p. 183), nom qui manque également dans l'*Index Kewensis*. Ce nom se trouve lui aussi en concurrence avec un nom publié par Allioni dans le *Flora Pedemontana* et doit, en tant que plus ancien, être conservé.

¹ Il est singulier que dans cette édition posthume, publiée par Willdenow (vol. I, 1792 ; II, 1793), tous les noms nouveaux introduits par Honckeny dans le *Verzeichniss* (1782) soient passés sous silence ; le *Verzeichniss* n'est pas cité dans la bibliographie donnée à la page IX et seq. du *Synopsis* (vol. I).

Nous reproduisons ci-dessous *in extenso* les données des deux auteurs. Honckeny *op. cit.*, p. 183 (1782):

[*Phleum*] *hirsutum*. 146. A[rt] *Rauhes L[ieschgras]*. Blühet in den Wiesen hoher Gebirge im Brachm[onat].

B. Haller. Enum. 231. n. 1. Syn. Schz.

— Hist. n. 1532. *Phleum* spic. panicul. *hirsutis*¹, calycibus lanceolatis.

Schz. agr. p. 65. Gr. typhoides alpinum, spica graciliori (sic), delicata et villosa.

J. Bauh. II. p. 473. Gramini caudae muris purpurascenti aliquatenus simile.

C. β Barrel. Ic. 21. n. 11. Gramen junceum typhinum perenne.

Allioni *Fl. Pedem.* II, p. 253 (1785) :

N. 2138. *Phleum Michellii* N.

Phleum spicis paniculatis *hirsutis*, calycibus lanceolatis. Hall. hist. n. 1532.

Gramen typhinum junceum perenne. Barr. ic. 21. n. 2.

Gramen spicatum saxatile glabrum perenne, spica cylindracea flavescente longa, locustis acutis cillii instar pilosis. Hort. Pisan.

Loc. Cl. Bellardi in pascuis montanis di Borgomasino, locis siccis di Borgo d'Ale. Perenne.

L'accord des citations (Haller, Barrelier) existe donc de nouveau.

La synonymie devient donc :

*Phalaris alpina*² Turra in *Giorn. d'Italia del Grisellini (Venezia)* I, p. 119 (1765) (sec. Grande in *Bull. Orto Bot. Univ. Napoli* IV, p. 183 [1914] ; non vidi) et *Fl. Ital. Prodr.*, p. 62 (1780) ; Hänke ap. Jacq. *Coll. bot.* II, p. 91 (1788) = ***Phleum hirsutum*** Honckeny *Verzeichn. aller Gewächse Teutschl.* I, p. 183 (1782) ; Suter *Fl. Helv.* I, p. 34 (1802) et ed. 2 (ed. Hegetschw.) I, p. 39 (1822) ; Gaudin *Agrostol. Helv.* I, p. 45 (1811) ; St. Lager *Cat. Fl. Bass. Rhône*, éd. 7, p. 786 (1882) («*Phleos hirsutus*») = *Phl. Michellii* All. *Fl. Pedem.* II, p. 233 (1785) ; Gaudin *Fl. Helv.* I, p. 169 (1828) ; Husnot *Gram. de France, etc.*, 1re livr., p. 7 (1896) ; Aschers. et Graebn. *Syn. d. mitteleur. Fl.* II, 1, p. 150 (1899) ;

¹ C'est nous qui soulignons.

² Cette épithète spécifique, quoique la plus ancienne, n'a aucune influence sur la nomenclature de notre espèce, eu égard au *Phleum alpinum* L. (1753).

et auct. plur. = *Phl. phalarideum* Vill. *Hist. Pl. Dauph.* II, p. 60 (1787) (pro parte tantum huc pertinens) = *Phal. phleoides* Savi *Fl. Pis.* I, p. 58 (1798) (non L. 1753) = *Phal. Michellii* Savi in *N. Giorn. Pisa* IV, p. 230 (1806) (non vidi) = *Phal. ciliata* Lag. *Gen. et Spec. nov.*, p. 3 (1816) = *Chilochloa Michellii* Trin. *De Gram. unijl., etc.*, p. 167 (1824).

Il ressort de la synonymie que, indépendamment de Honckeny, le nom de *Phleum hirsutum* a déjà été utilisé par des auteurs suisses. et français.

III

Heureusement, les deux cas cités sont, à notre avis, les seuls où des noms d'espèce créés en 1782 par Honckeny doivent être conservés, au détriment de noms postérieurs en date. Tous les autres noms (c'est-à-dire une quarantaine) du *Verzeichniss* de cet auteur semblent, pour diverses raisons, être non valables.

Dans les cas suivants, la priorité doit être attribuée à Honckeny sans qu'on soit obligé de changer l'épithète spécifique.

Eriophorum angustifolium Honckeny *Verzeichn. aller Gewächse Teutschl.* I, p. 153 (1782) ; Roth *Tent. Fl. Germ.* I, p. 24 (1788). (Cf. aussi Grande in *Bull. Orto Bot. Univ. Napoli* VIII, p. 58 [1926].)

Koeleria vallesiana (Honckeny) Bertol. = *Poa vallesiana* Honckeny *op. cit.*, p. 224 (1782) = *Festuca splendens* Pourret in *Mém. Acad. Toul.* III, p. 319 (1788) = *Aira valesiana* All. *Auct. Fl. Pedem.*, p. 40 (1789) = *Aira Valesiaca* Suter *Fl. Helv.* I, p. 42 (1802) = *Koeleria valesiaca* Gaudin *Agrostol. Helv.* I, p. 149 (1811) = *Sesleria variegata* Clairv. *Man. herb.*, p. 23 (1811) = *Koel. valesiana* Bertol. ap. Roemer et Schultes *Mant.* II, p. 346 (1824) ; [*Valesiana*] Aschers. et Graebn. *Syn. d. mitteleurop. Fl.* II 1, p. 354 (1900) = *Airochloa vallesiaca* Link *Hort. ber.* I, p. 127 (1827) = *Koel. splendens*¹ Druce in *Journ. of Bot.*

¹ Voir sur la validité de ce nom les développements de Schinz et Thellung in *Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich* LXVI, p. 263 (1921). Par suite de nos recherches qui ont montré la synonymie des noms de Honckeny et d'Allioni, la discussion instituée par ces auteurs devient inutile.

XLIII, p. 313 (1905) (non Presl 1820). — Comme dans les cas de *Phyteuma* et *Phleum*, Honckeny et Allioni citent aussi ici les mêmes synonymes (Scheuchzer, Haller) d'où résulte l'identité du *Poa vallesiana* Honck. avec l'*Aira valesiana* All. Dans l'*Index Kewensis* le nom de Honckeny figure comme *nomen dubiosum*, dans le *Synopsis* d'Ascherson et Graebner, il manque complètement.
