

# Hypericum tauricum

Autor(en): **Keller, Robert**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany**

Band (Jahr): **4 (1929-1931)**

PDF erstellt am: **02.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-879083>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

# HYPERICUM TAURICUM

describit

**Robert KELLER**

---

**Hypericum tauricum** R. Kell. — Caulis arcuato-erectus,  $\pm$  10-16 cm. altus, glaber, teres vel tantum infra folia breviter bilineatus; folia usque 15 mm. longa et 2 mm. lata, ( $\pm$  7-plo longiora quam lata), margine revoluta, carinata, versus apicem crebro, ceterum sparse glandulis pellucidis obsita, costa sicut nervi secundarii pauci, erecto-patentes pellucida, interdum  $\pm$  decurrens; in foliorum angulis folia fasciculata,  $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$  foliorum longitudine. Inflorescentia racemosa; sepala  $\pm$  3 mm. longa,  $\pm$  3-plo longiora quam edunculi, oblongo-ovata, obtusa, in parte superiori, certe ad apicem ciliis glanduliferis brevibus (usque  $\pm$  12) obsita, pellucido-striata et punctata; petala  $\pm$  3-plo longiora quam sepala, flava, interdum versus apicem et secundum marginem abunde ciliis glanduliferis obsita  $\pm$  violaceo-rufescentia; ovarium ovatum, sepalis paulo longius; styli ovario subduplo longiores, staminibus breviores, capsula matura subglobosa.

Candollea IV, Février 1931.

Tauria : in lapidosis montium Karabi-Jaila supra pagum Molbai (A. Callier. Iter tauricum tertium anni 1900 cur. I. Dörfler n. 565 in herb. Delessert).

Species sect. *Euhypericum* subsect. *Homotaenii* R. Kell. ser. a *Seminibus papillois*, *H. hyssopifolio* Vill. valde approximata, olim l. c. absque diagn. nominata et distributa, nunc descriptione suppleta.

