

Résultats des expéditions scientifiques genevoises au Népal en 1952 et 1954 (partie botanique) : 2. Cruciferae

Autor(en): **Baehni, Charles**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany**

Band (Jahr): **15 (1954-1956)**

PDF erstellt am: **03.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-880485>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

RÉSULTATS DES EXPÉDITIONS SCIENTIFIQUES GENEVOISES AU NÉPAL
EN 1952 ET 1954 (PARTIE BOTANIQUE)

2. - Cruciferae ¹

par

Charles BAEHNI

Arabis pterosperma Edgw. in *Trans. linn. Soc.* **20** : 33. 1846 = *A. alpina* Hook. f. & Thoms. in *Journ. Proceed. linn. Soc., Bot.* **5** : 141. 1861, non L.

DISTR. : Kumaon, Tihri-Garwal, Cachemire.

NÉPAL : De Kharikhola (27°37', 86°43') au col de Puiyan (27°39', 86°43') sur les rochers exposés au N.-W., alt. 2850 m., fl. blanc rosé, 11 avril 1952, *Zimmermann* 252 (G !).

Braya oxycarpa Hook. f. & Thoms. in *Journ. Proceed. linn. Soc., Bot.* **5** : 169. 1861 = *B. alpina* Hook. f. & Anders. ex Hook. *Fl. brit. Ind.* **1** : 155. 1872, *p.p.* = *B. rubicunda* Franchet in *Bull. Soc. bot. Fr.* **33** : 403. 1886 = *Eutrema? Przewalskii* Maxim. *Fl. tangut.* **1** : 68. 1889.

DISTR. : Chine (Yunnan), Pamir, Tibet W. et N.-E., Sikkim, Tihri-Garwal, Cachemire.

NÉPAL : Alpages de Pheriche (27°54', 86°49') alt. 4330 m., 2 juin 1952, *Zimmermann* 597 (G !), fl. blanches, capsules très jeunes, glandes latérales prolongées en bourrelets ; entre le Camp de base (27°59', 86°49') et Lobuje (27°57', 86°49'), dans sable siliceux, alt. 4890 m., 31 mai 1952, *Zimmermann* 564 (G !), pl. plus petite que la précédente (2-3 cm.), en fl., pas de fruits.

Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. *Pflanzengatt.* **1** : 85. 1792.

NÉPAL : Rive gauche de la Bhote Kosi, près du village de Thammu (27°49', 86°41'), alt. 3410 m., 5 mai 1952, *Zimmermann* 418 (G !) ;

¹ Cf., pour l'itinéraire suivi, l'article de A. ZIMMERMANN, *Candollea* **15** : 127. 1956.

rive gauche de l'Imja Khola, au-dessous de Thyāngboche ($27^{\circ}51'$, $86^{\circ}46'$), alt. 3200 m., 20 oct. 1954, *Zimmermann 1764* (G!).

Cardamine flexuosa With. subsp. **debilis** (Don) O. E. Schulz in *Engl. bot. Jahrb.* **32** : 478. 1903 = *C. debilis* Don, *Prodr. Fl. nepal.* : 201. 1825.

DISTR. : Hawaï, Java, Japon, Chine, Tonkin, Tibet, Bhutan, Sikkim, Kumaon, Tihri-Garwal, Cachemire, Inde.

NÉPAL : En montant au col, au-dessus de la Lumding Khola, le long du sentier, entre les pierres humides, alt. 2885 m., 12 juin 1952, *Zimmermann 788* (G!).

Cochlearia himalaica Hook. f. & Thoms. in *Journ. Proceed. linn. Soc.* **5** : 154. 1861.

DISTR. : Sikkim.

NÉPAL : Col, entre les pâturages de Tanga ($27^{\circ}39'$, $86^{\circ}37'$) et ceux de Luzebou, en direction de Ringmo ($27^{\circ}35'$, $86^{\circ}36'$), alt. 4120 m., petites fleurs blanc bleuâtre dans les éboulis terreux, 14 juin 1952, *Zimmermann 815 D* (G!).

Draba gracillima Hook. f. & Thoms. in *Journ. Proceed. linn. Soc., Bot.* **5** : 153. 1861 = *D. lanceolata* Klotzsch & Garcke, *Bot. Ergebn. Reise Waldem.* : 128, t. 34, 1862.

DISTR. : Bhutan, Sikkim, Kumaon.

NÉPAL : Au-dessus des chalets de Tanga ($27^{\circ}39'$, $86^{\circ}37'$), alt. 3780 m., petites plantes à fl. jaunes dans le gazon, 13 juin 1952, *Zimmermann 807* (G!).

Draba oreades Schrenk var. **commutata** (Regel) O. E. Schulz in *Engl. Pflanzenreich* **4. 105. Cruciferae-Draba et Erophila** : 109. 1927 = *D. pilosa* Adams γ *commutata* E. Regel in *Bull. Soc. nat. Mosc.* **34. 3** : 185. 1861. p.p.

DISTR. : Turkestan, Mongolie occid., Tibet, Cachemire.

NÉPAL : Sommet à l'W. de Lobuje ($27^{\circ}57'$, $86^{\circ}49'$), alt. 5170, dans les fissures de rochers exposés au S., 31 mai 1952, *Zimmermann 569* (G!) ; infl. à peine exserte, de 4-7 fl., ov. glabre, 2 ovules par loge, stigmatte distinctement élargi et bilobé sur le fruit (cloison seulement).

Draba polyphylla O. E. Schulz in *Engl. Pflanzenreich* **4. 105. Cruciferae-Draba et Erophila** : 180. 1927.

DISTR. : Sikkim, Tibet.

NÉPAL : Pâturages de Pheriche ($27^{\circ}54'$, $86^{\circ}49'$), alt. 4310 m., bord d'un ruisseau, fl. jaunes, 16 mai 1952, *Zimmermann 521* (G!) ;

entre Lobuje ($27^{\circ}57'$, $86^{\circ}49'$) et Pheriche, alt. 4500 m., bord d'un ruisseau, 1^{er} juin 1952, *Zimmermann* 581 (G!).

Erysimum hieraciifolium L. *Fl. suec.* ed. 2 : 234. 1755 ; *Jusl. Cent. Pl. I* in L. *Amoen. acad.* 4 : 299 [1755] 1759.

DISTR. : Asie centr., Europe.

NÉPAL : Au-dessus de Setha ($27^{\circ}35'$, $86^{\circ}29'$), alt. 2440 m., dans les bois et parmi les céréales, 8 avril 1952, *Zimmermann* 202 (G!) ; Phākding ($27^{\circ}44'$, $86^{\circ}43'$), alt. 2640 m., lieux incultes, 8 mai 1952, *Zimmermann* 450 (G!).

Lignariella hobsoni (Pearson) Baehni in *Candollea* 15 : 57. 1955 = *Cochlearia hobsoni* Pearson in *Hook. Ic.* t. 2643. 1900 = *Cochlearia? serpens* W. W. Smith in *Rec. bot. Surv. India* 4 : 175. 1911.

DISTR. : Tibet, Bhutan, East Himalaya, Sikkim, Népal.

NÉPAL : Alpaves de Luzebou, en direction de Ringmo ($27^{\circ}35'$, $86^{\circ}36'$), alt. 4200 m., parmi les éboulis et les gazons, situation W., fl. bleues, 14 juin 1952, *Zimmermann* 817 (G!).

Microsisymbrium axillare (Hook. f. & Thoms.) O. E. Schulz in *Engl. Pflanzenreich* 4.105. *Cruciferae-Sisymbrieae* : 160. 1925 = *Sisymbrium axillare* Hook. f. & Thoms. in *Journ. Proceed. linn. Soc., Bot.* 5 : 162. 1861.

DISTR. : Bhutan (var. *dasycarpum*), Sikkim.

NÉPAL : Puiyan ($27^{\circ}39'$, $86^{\circ}43'$), alt. 2820 m., dans les gazons exposés au S., fl. d'un blanc rosé, 11 avril 1952, *Zimmermann* 258 (G!) ; torus présent ou absent derrière les ét. médianes, 68-70 ovules dans l'ovaire.

