

A new species of *Ecdysanthera* Hook. & Arn. (Apocynaceae) from Assam

Autor(en): **Srivastava, S.K. / Mehrotra, B.N.**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Candollea : journal international de botanique systématique =
international journal of systematic botany**

Band (Jahr): **41 (1986)**

Heft 2

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-880005>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

A new species of *Ecdysanthera* Hook. & Arn. (Apocynaceae) from Assam

S. K. SRIVASTAVA
&
B. N. MEHROTRA

RÉSUMÉ

SRIVASTAVA, S. K. & B. N. MEHROTRA (1986). *Ecdysanthera* Hook. & Arn. (Apocynaceae), espèce nouvelle d'Assam. *Candollea* 41: 381-383. En anglais, résumé français.

Une nouvelle espèce d'Assam (Indes), est décrite et illustrée: *Ecdysanthera lakhimpurensis* Srivastava & Mehrotra spec. nov. (Apocynaceae).

ABSTRACT

SRIVASTAVA, S. K. & B. N. MEHROTRA (1986). A new species of *Ecdysanthera* Hook. & Arn. (Apocynaceae) from Assam. *Candollea* 41: 381-383. In English, French abstract.

A new species *Ecdysanthera lakhimpurensis* Srivastava & Mehrotra spec. nov. (Apocynaceae) from Assam, India, is described with illustrations.

During the botanical exploration of the forest areas of North Lakhimpur district in Assam, one of the authors (SKS) collected a few specimens later identified as *Ecdysanthera* Hook. & Arn. This genus is represented by 8-10 species distributed in Malayan region and China; only one species viz. *E. micrantha* A. DC. is known so far from Assam, Khasia and Cachar hills in India. Thorough study of the literature and herbaria of Botanical Survey of India, Shillong (Assam), National Botanical Research Institute, Lucknow (LWG) and also of CDRI, reveals that this taxon represents a hitherto unrecognized species.

***Ecdysanthera lakhimpurensis* Srivastava & Mehrotra spec. nov. (Fig. 1).**

Typus: India: Assam, North Lakhimpur, Dulung R. F., ± 350 m, 24.4.1986, S. K. Srivastava 16105 (holo: CDRI; iso: CDRI).

Ecdysanthera lakhimpurensis Srivastava & Mehrotra *E. micranthae* affinis. Sed differt foliis parvioribus, ovatis vel ovato-ellipticis, cum glandibus in axillis nervorum lateralium, floribus corollisque permajoribus, pistillisque bis longioribus.

Ecdysanthera lakhimpurensis Srivastava & Mehrotra is allied to *E. micrantha* A. DC. but differs in having smaller leaves, ovate or ovate-elliptic, glands on the axil of the lateral nerves, flowers and corolla much larger, stamens sagittate, flattened, much longer, pistil twice long.

Large shrub, branches terete, young one flattened, channelled, glabrous. Leaves simple, opposite, estipulate, (sheathing cover on each node) 4.5-6.5 × 1.6-2.3 cm, ovate or ovate-elliptic, acute or acuminate, base cuneate, entire, glabrous, membranous or somewhat chartaceous, midrib distinct on both the surfaces, lateral nerves 3-5 pairs, nearly inconspicuous; petioles 1-1.2 cm long, glabrous.

Cymes axillary or terminal, minutely pubescent, trichotomous, 4-7 × 3-4 cm, bracts 1 mm long, ovate, acute, glabrous. Flowers 5 × 2 mm, pedunculate, hermaphrodite, peduncle 1.5-2.8 cm long, pedicels 2 mm long, minutely pubescent, bracteoles tringular, 1-1.5 mm long. Calyx




Fig. 1. — *Ecdysanthera lakhimpurensis* Srivastava & Mehrotra.
1, habit; 2, flower; 3, bract; 4, corolla (cut open); 5, stamen; 6, pistil.

5-lobed, sepals 1.5 mm long, ovate, acute, glabrous, jointed each other at half of the length. Corolla membranous 5-lobed, jointed each other at $1/3$ of the length from the apex somewhat rounded. Stamens 5, epipetalous, nearly 2 mm long, attached nearly at the base of the petal lobe, filament short, anther sagittate, spur long. Pistil 2-2.5 mm long, ovary superior, rounded, nearly 1.5 mm in diam., minutely pubescent at the top, style nearly 1 mm long, stigma simple conical. Fruit not seen.

Flowering. — March-April.

Ecology. — Plant is found growing on the slopes along the dry rocky rivers in moist climatic condition.

ACKNOWLEDGEMENTS

Authors are thankful to the Director, Central Drug Research Institute, Lucknow for providing facilities. Thanks are also due to Dr. N. C. Majumdar, Regional Botanist, Botanical Survey of India, Howrah, for latin translation.

Central Drug Research Institute Communication No. 3931.

