

Frullania cuencensis (Jungermanniales) : una nueva cita para Argentina

Autor(en): **Reiner, María Elena**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany**

Band (Jahr): **47 (1992)**

Heft 2

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-879584>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Frullania cuencensis (Jungermanniales) una nueva cita para Argentina

MARÍA ELENA REINER¹

RESUMEN

REINER, M. E. (1992). *Frullania cuencensis* (Jungermanniales) una nueva cita para Argentina. *Candollea* 47: 533-537. En español, resúmenes en español y en inglés.

Frullania cuencensis Tayl. es citada por primera vez para Argentina (prov. Salta y Buenos Aires). Se describe e ilustra esta especie.

ABSTRACT

REINER, M. E. (1992). *Frullania cuencensis* (Jungermanniales) new citation for Argentina. *Candollea* 47: 533-537. In Spanish, Spanish and English abstracts.

Frullania cuencensis Tayl. is registered for the first time for Argentina (prov. Salta and Buenos Aires). The species is described and illustrated.

Introducción

En el NE de Buenos Aires fueron registradas seis especies de *Frullania* (REINER, 1988).

Para el S de la provincia fue citada *F. pluricarinata* Gott., por MASSALONGO (1906: 7 y 1928: 218). Estas citas se basan en la determinación realizada por Stephani de material coleccionado por Spegazzini en la Sierra de Cura Malal, en el SO de Buenos Aires. Este material se encuentra repartido en tres sobres, actualmente depositados en VER. Parte de este material corresponde a *F. cuencensis*. La misma especie fue hallada en Sierra de la Ventana (Buenos Aires) y en Salta.

Frullania cuencensis Tayl. (Fig. 1 y 2) — Taylor, London J. Bot. 5: 406. 1846. **Typus:** Ecuador, Cuenca, W. Jameson, Hooker Herbarium. (FH).

= *Frullania pohlkeana* Steph., Spec. Hep. 4: 340. 1910. **Typus:** Colombia, Bogotá, 8800 ft., I 1898, Pehlke 2, ex hb Winkelmann. (G 20974).

= *Frullania parva* Steph., Spec. Hep. 6: 534. 1924. **Typus:** México, 1913, Arsén 7789. (G 20973).

= *Frullania subcordistipula* Steph., Spec. Hep. 6: 534. 1924. **Lectotypus:** México, Arsén 7802. (G 20977).

Plantas secas castaño rojizas a negruzcas; crecen formando tapices densos; hasta 4.5 cm longitud \times 1-1.5 mm latitud; regularmente pinnadas a bipinnadas, ramas de tipo *Frullania* a 45-90° con el eje principal, el primer anfigastrio de la rama puede ser una lámina triangular entera o estar

¹Parte de este trabajo fue realizado como becaria de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, en la División Criptogamia del Museo Argentino de Cs. Naturales "B. Rivadavia".




Fig. 1. — *Frullania cuencensis* Tayl.

A, estilo; B, planta estéril en vista ventral; C, detalle de lobo y lóbulo; D, vista lateral de células del lobo; E, lobo en vista dorsal; F, primer anfigastrio de una rama; G, corte transversal de tallo; H-J, células del lobo con oleocuerpos, H: basales, I: centrales, J: marginales. (todos los dibujos de Reiner 404).




Fig. 2. — *Frullania cuencensis* Tayl.

A, ginoecio joven en v.v.; B, corte transversal de periantio; C y D, esquemas de plantas femeninas, las elipses indican los ginoecios (elipses abiertas: sin periantio); E, esquema de planta masculina, los círculos oscuros indican androecios; F, periantio con brácteas en v.d.; G, periantio con brácteas y bractéola en v.v.; H, planta masculina en v.v. (C de Drehwald S 221, el resto de los dibujos de Reiner 404). v.v. = vista ventral, v.d. = vista dorsal.

dividido en 2 ó 3 lóbulos en la mitad o tercio superior, el primer lobo de la rama está reducido y el lóbulo es galeado. Tallo de 130-190(-230) μm latitud, el corte transversal del mismo presenta células irregulares de 13-22 \times 13-24 μm , pared celular \pm gruesa, sin diferenciación en corteza y médula. Hojas imbricadas, cóncavas, oblicuamente extendidas. Lobo aovado a redondeado, de 650-810 μm longitud \times 700-900 μm latitud, margen entero, base dorsal levemente auriculada que sobrepasa el tallo, ápice obtuso generalmente incurvado. Células basales del lobo irregulares, de 22-32 \times 29-44 μm , pared celular con trígonos muy pronunciados y ocasionalmente pequeños espesamientos intercelulares; células centrales poligonales, de 16-20 \times 18-27 μm , pared celular con trígonos notorios; células marginales \pm cuadradas, de 15-17 \times 15-18 μm ; la superficie abaxial de las células del lobo es levemente convexa; oleocuerpos rugosos, alargados a esféricos de 5 \times 5-10 μm , en las células basales hay 5-7, en las centrales 3-5 y 2-3 en las marginales. Lóbulo galeado; la parte superior inflada; la parte inferior plana es pequeña y nunca se extiende por debajo del margen ventral del lobo, está conectada al lobo por un pliegue corto paralelo al tallo. En ocasiones, el lóbulo puede ser laminar. Estilo triangular, de 3-4 células de ancho en la base \times 5-8 células de alto, las últimas 2-4 células en una hilera, papila hialina apical. Anfigastrios distantes a subimbrica-

dos, obpiriformes a redondeados, 270-460(-600) μm ancho \times (320-)400-520(-600) μm alto, margen entero plano a incurvado, a veces con un pequeño diente lateral, zona inicial de los rizoides fuertemente inflada, inserción recta a levemente curvada, ocasionalmente las bases son algo auriculadas, bífidos en un 20-34% de su longitud, seno agudo: segmentos triangulares rectos a conniventes o levemente divergentes y con el ápice obtuso curvado hacia el tallo, 2-2.9(-3.3) \times el ancho del tallo. Rizoides hialinos cortos que en general no sobrepasan el anfigastrio; más largos en las ramas. Dioica. Ginoecio terminal en el eje principal o ramas, 3 pares de brácteas periqueciales por debajo de las cuales nace una rama de tipo *Frullania*, margen de las brácteas entero, lobo aovado, ápice obtuso, lóbulo menor que el lobo, bractéola bífida en el ápice. Periantio elipsoidal de 0.9-1.1 mm ancho \times 1.9-2.1 mm alto, en corte transversal es trapezoidal: 2 quillas ventrales y 2 laterales, no presenta quilla dorsal, superficie lisa, rostro de 120 μm alto. Androecio lateral sobre el eje principal o ramas, globoso, 3-5 pares de brácteas perigonales densamente imbricadas, 1-2 bractéolas en la base.

Habitat. — Crece sobre roca, a 1000-3300 m s.n.m. De acuerdo a YUZAWA (1991) crece sobre el tronco de árboles.

Observaciones. — Los anfigastrios varían mucho en tamaño y el margen puede ser completamente plano o incurvado. En una sola muestra de Argentina (Reiner 404) encontré unos pocos periantios maduros. El ginoecio es terminal, posee 2-3 pares de brácteas periqueciales y por debajo de éstas nace una rama que continúa creciendo y coloca la inflorescencia femenina en posiciónseudolateral. Las plantas masculinas suelen ser más pequeñas que las femeninas.

F. cuencensis pertenece al subgénero *Chonanthelia*, cuyas especies se caracterizan por poseer lóbulos galeados, periantio trapezoidal y la superficie del mismo lisa.

El material original de *F. cuencensis* y el coleccionado en Quito consta de plantas masculinas. En la hoja sobre la cual se halla pegado el material original figura "Frullania cuencis, Tayl."; sin embargo, en la descripción original aparece "Frullania cuencensis", el nombre correcto.

En la descripción original de *F. pehlkeana*, Stephani escribe "Sterilis ...", sin embargo en el material original se encuentran abundantes plantas masculinas.

YUZAWA (1991: 209) realiza la sinonimia de esta especie y amplía su distribución geográfica.

En base al material estudiado de la provincia de Buenos Aires se extiende el límite sur de distribución de *F. cuencensis* hasta $\pm 38^\circ\text{S}$.

Distribución geográfica. — México, Dominica, Colombia (HERZOG, 1955), Venezuela, Ecuador, Bolivia (STEPHANI, 1916), Argentina (Salta, Buenos Aires).

Material estudiado. — **ECUADOR.** Quito, *Jameson s.n.* (G 20959). **ARGENTINA.** Prov. Salta: Dpto. Chicoana. Cuesta del Obispo, Escoipe, *M. Adler s.n.*, II.1986 (BA). Cuesta del Obispo, aprox. 2100 m s.n.m., sobre roca, *U. Drehwald S. 220, S. 221, 25.XI.1986* (Herb. Drehwald). Prov. Buenos Aires: Pdo. Tornquist. Cerro de la Ventana, aprox. 1000 m s.n.m., sobre roca, *M. E. Reiner 404, 28.III.1986* (BA). Cerro de la Ventana, *A. Bonavía s.n.*, 17.VII.1984 (BA). Abra Ventana, *Kühnemann 107, 23.II.1940* (BA 4136), *Kühnemann 98, 23.II.1940* (BA 4137), *Kühnemann 347, 5.III.1940* (BA 4139), *C. A. y G. Hässel de Menéndez 411, 20.IV.1962* (BA 10897). El Carol, *Kühnemann 294, 4.III.1940* (BA 4143). Pdo. Saavedra. Sierra de Cura Malal, ad rupes stillicidiosas, *C. Spegazzini 25 y 27 (p.p.), XI.1895* (VER, como *Frullania pluricarinata* Gott.).

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a los Directores y Curadores de los siguientes herbarios el haberme facilitado los ejemplares mencionados en el trabajo, incluyendo el material original de numerosas especies: Conservatoire et Jardin botaniques Genève (G), Museo Civico di Storia Naturale Verona (VER), Farlow Herbarium (FH) y Herbario Criptogámico del Museo Argentino de Cs. Naturales B. Rivadavia (BA).

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- HERZOG, T. (1955). Hepaticae aus Columbia und Peru. *Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 57: 156-203.
 MASSALONGO, C. (1906). Epatiche della Republica Argentina raccolte dal Prof. C. Spegazzini. *Atti Accad. Sci. Med. Nat. Ferrara* 1-14.

- MASSALONGO, C. (1928). Revisio critica hepaticarum quas in Republica Argentina prof. C. Spegazzinius legebat, additis speciebus novis. *Atti Reale Ist. Veneto* 87(2): 215-251.
- REINER, M. E. (1988). Contribución al conocimiento de las hepáticas del Noreste de la provincia de Buenos Aires (Argentina). Frullaniaceae (Jungermanniales). *Bol. Soc. Argent. Bot.* 25(3-4): 301-325.
- STEPHANI, F. (1916). Hepaticae. In: HERZOG, T., Die Bryophyten meiner zweiten Reise durch Bolivia. *Biblioth. Bot.* 87: 173-268.
- YUZAWA, Y. (1991). A monograph of subgen. Chonanthelia of gen. Frullania (Hepaticae) of the world. *J. Hattori Bot. Lab.* 70: 181-291.

