

# Erratum to 'Rational Lie Algebras and $p$ -Isomorphisms of Nilpotent Groups and Homotopy Types'

Autor(en): **Roitberg, Joseph**

Objektyp: **Corrections**

Zeitschrift: **Commentarii Mathematici Helvetici**

Band (Jahr): **51 (1976)**

PDF erstellt am: **01.07.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## Erratum to ‘Rational Lie Algebras and $p$ -Isomorphisms of Nilpotent Groups and Homotopy Types’

JOSEPH ROITBERG

The author has noticed that the proof of Th. 3.2 of [R] contains a flaw. We shall indicate how to modify the argument in [R] so as to set things right.

The trouble occurs on p. 5, 1. 12–13 where it is asserted that the homotopy equivalence  $h_0: W \rightarrow W$  gives rise to a weak automorphism  $\omega: L \rightarrow L$  of its associated Lie algebra. However, it may only be asserted that  $\omega$  is an equivalence in the category in which it lies; it need not be an actual DGL map. To remedy this, we employ a theorem of Quillen ([Q1], [Q2; esp. pp. 263–264] which provides an equivalence between the category of DGL algebras used in [R] and the category whose objects are reduced, rational DGL algebras *which are free as graded Lie algebras* and whose morphisms are homotopy classes (in an appropriate sense) of DGL maps. It is certainly the case that in this latter category, an equivalence always contains a representative  $\omega$  which is a weak automorphism. To complete the proof of Th. 3.2 of [R], it is only necessary to replace Th. 3.1 of [R] (whose statement and proof are correct, except for a harmless misprint; in formula (3.5), one should have a plus sign rather than a minus sign since  $(aa)ab = 2aaaab$ , not  $-2aaaab$ ) by the following variant.

**THEOREM 3.1'.** *There exists a rational, reduced DGL algebra  $L$  of finite type, free as a graded Lie algebra, such that any weak automorphism  $\omega: L \rightarrow L$  is congruent, modulo  $L^2$ , to the identity.*

*$L$  may be chosen so that  $H(L)$  has totally finite dimension, but at the price of possibly foregoing the relation  $\omega(x) \equiv x \pmod{L^2}$  for  $x$  of high degree.*

*Proof.* Let  $L$  be the free, graded Lie algebra over  $\mathbf{Q}$  generated by elements  $a, b, c, e$  having degrees 1, 3, 2, 11 respectively and define a differential  $d: L \rightarrow L$  by setting

$$da = 0, \quad db = aa, \quad dc = 0, \quad de = (ac)ccac + (ac)(ac)ab + (ab)cab.$$

Denote by  $F$  the (free) sub-Lie algebra generated by  $a, b, c$ . Writing for any weak

automorphism  $\omega: L \rightarrow L$ ,

$$\omega(a) = ra, \quad \omega(b) = sb + u(ac), \quad \omega(c) = tc + v(aa), \quad \omega(e) = x \cdot e + f,$$

where  $r, s, t, u, v, x \in \mathbf{Q}$ ,  $f \in F$ , we easily conclude, as in the proof of Th. 3.1 of [R], that  $r \neq 0$ ,  $t \neq 0$ ,  $s = r^2$ . Further, we obtain  $\omega(de) = r^2 t^4((ac)ccac) + r^5 t^2((ac)(ac)ab) + r^6 t((ab)cab) + g \pmod{L^7}$ , where  $g$  lies in the ideal  $I \subset F$  generated by  $aa$ . By a straightforward algebraic calculation, one shows that the elements  $(ac)ccac$ ,  $(ac)(ac)ab$ ,  $(ab)cab$  are linearly independent modulo  $I$ . Then using  $\omega(de) = d\omega(e)$ , together with  $df \in I$ , we conclude that  $r^2 t^4 = r^5 t^2 = r^6 t = x$  so that  $r = s = t = x = 1$ .

To obtain the final assertion of Th. 3.1', we take any integer  $n \geq 11$  and successively attach elements of degree  $\geq n+1$  to  $L$  so as to kill all homology classes of degree  $\geq n$ .

#### BIBLIOGRAPHY

- [Q1] D. G. QUILLEN, *Homotopical Algebra*, Lecture Notes in Math. 43, Springer-Verlag (1967).  
 [Q2] —, *Rational Homotopy Theory*, Ann. of Math. 90 (1969), 205–295.  
 [R] J. ROITBERG, *Rational Lie Algebras and  $p$ -Isomorphisms of Nilpotent Groups and Homotopy Types*, Comment. Math. Helvetici 50 (1975), 1–8.

Hunter College  
 CUNY and  
 Graduate Center  
 CUNY

Received April 26, 1976