

# Zernezer Nationalparktage 2005

Objektyp: **Group**

Zeitschrift: **Cratschla : Informationen aus dem Schweizerischen Nationalpark**

Band (Jahr): - **(2005)**

Heft 2

PDF erstellt am: **17.07.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

# ZERNEZER NATIONALPARK TAGE 2005

## Aktuelles aus der Nationalparkforschung

Anlässlich der Zernez Nationalparktage haben am 16. April 2005 Forschende Ergebnisse aus soeben abgeschlossenen und langfristigen Forschungsarbeiten vorgestellt. Die Beiträge stehen stellvertretend für die thematische Breite der Forschungen im Nationalpark: Waldentwicklung, Schmetterlinge, Quellenmonitoring, Pilze und Besucherinformation. Der Vortrag von Muriel Bendel, WSL, zum Thema «Der Hallimasch – Ureinwohner der Bergföhrenwälder am Ofenpass» und jener von Ruedi Haller, SNP, mit dem Titel «Webpark – digitale, mobile Information im SNP: Die Vision und die Realität» sind ausführlich in der CRATSCHLA 1/2005 wiedergegeben.

*Walter Abderhalden*

### **Waldentwicklung in Dauerzäunen: Die ersten 10 Jahre**

Parallel zu einer flächendeckenden Stichproben-erhebung in der Val Trupchun wurden im Jahr 1992 Vergleichsflächenpaare zur Dauerbeobachtung der Waldverjüngung eingerichtet. Jeweils eine Fläche pro Paar wurde mit einem Wildzaun versehen. Heute stehen noch 14 Flächenpaare für das Monitoring zur Verfügung. Im Herbst 1995 wurden ausserdem bei ausgewählten Zäunen Samenkasten installiert, um die Samenquantität und -qualität zu erfassen. Diese drei Beobachtungsprogramme erlaubten es, das Verjüngungspotential mit der tatsächlich vorhandenen Verjüngung zu vergleichen und langfristig den Einfluss des Schalenwildes auf die Waldverjüngung abzuschätzen.

Die höchsten Stammzahlen pro Hektare der Höhenklasse 10 – 130 cm sind in gezäunten Flächen zu finden. Die Stammzahlen in den ungezäunten Vergleichsflächen und in jenen Stichproben, welche über die ganze Waldfläche erhoben wurden, liegen in der Regel tiefer. Bei der Fichte, welche auf der linken Talseite nur in sehr geringer Zahl

vorhanden ist, treten kritische Verbissintensitäten auf, während diese bei den Baumarten Arve und Lärche verhältnismässig gering sind.

Auf der südexponierten rechten Talseite ist wesentlich weniger Ansamung (0 – 10 cm) vorhanden als auf der nordexponierten linken. Auch die Bäumchen der Klasse 10 – 130 cm sind auf der rechten Talseite wesentlich weniger zahlreich.

Die Standortverhältnisse bezüglich Verjüngungsgunst sind stellenweise kritisch und können mehr zum Ausbleiben respektive zum Ausfall der Verjüngung beitragen als das Schalenwild. Trotz des regelmässigen Samenangebots gibt es auf beiden Talseiten Vergleichsflächenpaare, bei denen die gezäunte Fläche keine Verjüngung aufweist. Ebenso gibt es Vergleichsflächenpaare, bei denen die ungezäunte Fläche seit der Erstaufnahme eine stärkere Zunahme an Verjüngung zu verzeichnen hat als die gezäunte, und zwar meistens auf der rechten Talseite.

Die Ergebnisse der ersten 10 Beobachtungsjahre lassen den Schluss zu, dass die natürliche Verjüngung der Wälder in der Val Trupchun durch das Schalenwild wesentlich gehemmt wird. Aber auch andere, die Verjüngung hemmende Standortfaktoren, wie Trockenheit oder verdämmende Bodenvegetation, weisen stellenweise für die Verjüngung limitierenden Charakter auf. Auf der südexponierten rechten Talseite sind solche Stellen wesentlich häufiger als auf der linken. ☾

**Samenkasten 50 x 50cm**



Aline Pasche, Daniel Cherix, Yves Gonseth

## Les papillons du Val Mingèr

Le Val Mingèr en 2004


Au cours de l'été 2004, les peuplements de papillons de jour (*Lepidoptera Rhopalocera*) du Val Mingèr ont été étudiés et suivis à l'aide d'une méthodologie simple et reproductible. Cette méthodologie est basée sur deux approches. La première approche est qualitative et consiste à identifier toutes les espèces présentes sur une surface d'un hectare (diversité spécifique). La seconde est semi-quantitative et consiste à estimer le nombre de papillons présents sur une surface d'un quart d'hectare uniquement (abondance relative spécifique). Cette méthodologie a été répétée 6 fois au cours de la saison et a été appliquée à six stations sélectionnées en milieux ouverts et réparties sur un gradient altitudinal allant de 1755 m à 2431 m.

Au cours de la saison, 55 espèces ont été recensées. La diversité spécifique des stations varie de 7 à 33 espèces. Elle est maximale sur la station située le plus bas en altitude (1755 m). Des espèces communes comme *Erebia tyndarus*, *Aglais urticae*, *Vanessa cardui*, *Argynnis aglaja*, *Brenthis pales*, *Erebia pandrose* ou *Erebia euryale* ont été recensées en abondance et sur la majorité des stations. Certaines espèces rares ont également été observées. Notamment *Euphydryas intermedia* et *Pontia callidice* qui a été retrouvée pour la première fois dans le Parc National Suisse (PNS) depuis 1942! Seuls quatre individus ont été comptés, mais à des altitudes relativement variées et à des moments différents dans la saison.

### Comparaison avec les données historiques

Les données obtenues au cours de ce travail ont ensuite été intégrées à deux autres travaux effectués récemment dans le Parc National Suisse (Besson 1998 et Bouchard & Macherez 2001) afin d'établir une synthèse globale de la diversité en papillons pour l'ensemble du Parc. Toutes ces données ont finalement été comparées aux données historiques existantes (Pictet 1942) afin de retracer les tendances évolutives des espèces au cours de ces 60 dernières années.

Il a été observé qu'environ 70 % des espèces observées par Pictet dans son secteur oriental entre 1920 et 1941 ont été retrouvées en 2004 au Val Mingèr. Les principaux changements survenus ces



60 dernières années sont une forte diminution des effectifs de *Euphydryas aurinia debilis* et de *Pontia callidice* et l'apparition de 9 nouvelles espèces que Pictet n'avait pas recensées dans ce secteur.

En ce qui concerne l'ensemble du Parc National Suisse, il a été observé qu'environ 75 % des espèces recensées par Pictet sur l'ensemble de ses 4 secteurs et en 21 saisons de terrain ont été retrouvées et cela seulement en 3 saisons et sur 20 hectares uniquement. Il faut également noter que la majorité des espèces de Pictet non retrouvées vit généralement à des altitudes inférieures à celles des stations étudiées récemment. L'approche méthodologique de ce travail est donc un outil performant pour recenser facilement et rapidement les peuplements de papillons et pourrait être utilisée pour la mise en place d'un suivi à long terme des papillons de jour en milieux alpins prairiaux du PNS. ☘

Christopher T. Robinson, Christian Schlüchter

## Quellen: Kleine aber wichtige Gewässer im Schweizerischen Nationalpark

Quellen sind Orte, an denen Wasser aus dem Untergrund an die Oberfläche austritt, entweder als neues Gewässer oder via Infiltration in ein bereits vorhandenes. Quellen sind normalerweise kleine Gewässer, weniger als einen Meter breit und mit einer Schüttung von mehr als 0.005 Liter/Sekunde. Es gibt aber auch Quellen, die mehrere Meter breite Flüsse bilden.

Im Schweizerischen Nationalpark (SNP) gibt es mehrere Tausend Quellen, die Teil eines grossen ökologischen Netzwerkes sind und wichtige Süswassersysteme bilden. Wir treffen unterschiedliche Quellentypen an, von den speziellen Eisen-Schwefel-Quellen bei Il Fuorn bis hin zu ganz gewöhnlichen Kiesquellen. Quellen sind die wichtigsten Lebensräume für Amphibien und zahlreiche Makrophyten und Moose und damit auch Anziehungspunkte für Nahrung und Wasser suchende Insekten, Vögel und Säugetiere wie Gämse oder Rothirsch.

An dieser Stelle interessieren uns die Biogeochemie und die funktionelle Ökologie von Quellen. Die Grundlage zu den Ausführungen liefern Untersuchungen aus dem Jahr 2004.

### Biodiversität

Der Zoobenthos – die an oder auf der Gewässer-  
sohle lebenden Tiere – der Quellen im Nationalpark  
wird von drei Insektenordnungen dominiert. Es  
sind dies die Zweiflügler *Diptera* mit dem Hauptge-  
wicht auf den Zuckmücken *Chironomidae*, die  
Steinfliegen *Plecoptera* und die Köcherfliegen *Tri-  
choptera*. Weitere häufig vertretene Gruppen sind  
Käfer *Coleoptera*, Spinnen *Acari* und Strudel-  
würmer *Hirundinidae*, *Crenobia alpina*. Innerhalb  
der *Diptera* waren auch die *Stratiomyidae* häufig.  
*Dixa*, eine Dipterenart die oft Quellen bewohnt,  
wurde recht häufig gefunden. *Protonemura* war die  
am häufigsten vorkommende Steinfliege. Die  
Köcherfliegen waren sehr interessant, bis zu sechs  
Arten der *Drusinae* wurden in einigen Quellen  
gefunden. Die allgegenwärtige Art *Baetis alpina*  
war die am häufigsten gefundene Eintagsfliege  
*Ephemeroptera* in einigen Quellen. Räuberische  
Arten waren vor allem Steinfliegen *Plecoptera*,  
*Perlodidae* abgesehen von Strudelwurm *Crenobia*  
oder seltener auch Käfern *Coleoptera*, *Elodes*  
und *Agabus*. Eine interessante Entdeckung war,  
dass fast alle Taxa Allesfresser waren und sich  
meist von Detritus ernährten.

### Nahrungsnetze

Die Struktur des Nahrungsnetzes wurde mit  
Hilfe der Analyse stabiler Isotope untersucht. Dabei  
vergleicht man die Verhältnisse von Stickstoff-  
und Kohlenstoffisotopen der verschiedenen Organis-  
mengruppen im Nahrungsnetz. Ein trophischer  
Transfer (d. h. wenn sich eine Gruppe von einer  
anderen ernährt) schlägt sich normalerweise in einer  
Veränderung der Isotopenverhältnisse nieder. Es  
wurden die stabilen Isotope im Gewebe der in den  
Quellen am häufigsten vertretenen wirbellosen Tiere  
und ihrer potentiellen Nahrungsgrundlage (Algen  
oder Ufervegetation) bestimmt. Das Augenmerk  
richtete sich auch auf die Spinnen in der Umgebung  
der Quellen, da sich diese Tiere auch von aquati-  
schen Insekten ernähren können, wie aus entspre-  
chenden Studien an Fließgewässern hervorgeht.  
Die Ergebnisse unserer Untersuchung zeigten, dass  
sich die Quellbewohner zu einem Grossteil von  
terrestrischem organischem Material ernähren, und  
sie bestätigen unsere frühere Annahme, dass  
diese Quellen heterotrophe Systeme sind. Ferner  
wurde klar, dass aquatische Insekten nicht als

Nahrung für die in der Nähe der Quellen vorkom-  
menden Spinnen dienen. Das bedeutet, dass die  
Nahrungsnetze von externen Energiequellen getra-  
gen werden und die Tiere effiziente Verwerter  
von organischem Material sind, das von der angren-  
zenden Vegetation stammt.

### Die Funktionalität der Quellen

Ein anderer Weg die Möglichkeit der Heterotrophie  
zu testen ist, den Metabolismus des Ökosystems  
der unterschiedlichen Quellen zu bestimmen.  
In diesem Falle wurden Sauerstoffproduktion und  
-verbrauch in den Quellen über mehrere Tage im  
Sommer gemessen. Mit diesen Werten wurden die  
Bruttoprimärproduktion GPP und die Atmung  
des Ökosystems (ER) bestimmt und daraus die Netto-  
primärproduktion ( $GPP - ER = NPP$ ) berechnet.  
Das Verhältnis zwischen GPP und ER bestimmt  
den relativen Anteil der Autotrophie (interne Primär-  
produktion:  $GPP/ER > 1$ ) oder Heterotrophie  
(Produktion aus terrestrischen Quellen:  $GPP/ER > 1$ ).  
Auch diese Ergebnisse zeigten, dass diese Quellen  
stark heterotrophe Systeme sind ( $GPP/ER < 0.72$ ).  
Dies bestätigt wiederum die enge Beziehung  
zwischen Quellen und umgebender Vegetation. Die  
Systeme sind eng gekoppelt und energetisch  
verbunden. Dadurch werden sie zu wichtigen Kom-  
ponenten der biologischen Lebensräume.

### Rückhalt von Nährstoffen

Die Bedeutung der Verbindung zwischen den  
Quellen und der umgebenden Vegetation kann fest-  
gestellt werden, indem man die Aufnahme und  
den Rückhalt von Nährstoffen bestimmt. Diese Mes-  
sungen zeigen, wie weit und wie schnell ein Atom  
(Phosphor oder Stickstoff) wandert, bevor es in  
der Quelle wieder von Algen, Bakterien oder Pilzen  
aufgenommen wird. Die gewanderte Distanz,  
Aufnahmelänge  $S_w$  genannt, wird in Metern ge-  
messen und die Aufnahmerate ( $u$ ) in Mikrogramm  
pro Quadratmeter und Stunde, also in Relation  
zur Zeit. Die beiden Parameter wurden für die Nähr-  
stoffe N und P in vier verschiedenen Quellen  
gemessen. Sowohl Stickstoff wie auch Phosphor  
wurden innerhalb von wenigen Metern aufge-  
nommen, Phosphor nach 5 – 50 m und Stickstoff  
im Bereich zwischen 21 und 60 m. Auch die  
Aufnahmeraten waren relativ hoch (die durch-

schnittlichen Raten von Phosphor und Stickstoff lagen bei 1,7 bzw. 88 Mikrogramm pro Quadratmeter und Stunde). Diese Befunde legen nahe, dass die Quellen wichtige Systeme für die Aufnahme und Speicherung von Nährstoffen innerhalb der Landschaft darstellen.

Obwohl Quellen sehr kleine Systeme sind, sind sie durch ihre Anzahl und ihre ökologische Vernetzung sehr wichtige Süswassersysteme. Daher ist der SNP bestrebt, die Entwicklung einiger weniger Quellen in einem Quellenmonitoring langfristig zu verfolgen. ☞



Foto: A. Margreth

**Moränenwall und Eisrandterrasse**

### *Annina Margreth, Valentin Burki* **Zur Geologie der Val Tavrü**

Die Val Tavrü liegt zwar ausserhalb des Schweizerischen Nationalparks, doch zieht die unmittelbare Nähe zum Nationalpark viele Wanderer und Erholung suchende Gäste an. Das Tal bietet nicht nur duftende Alpweiden, ruhige Wälder und Wildtiere; die Val Tavrü offenbart auch reichhaltige Landschaftsformen, die im Laufe der Zeit entstanden sind.

#### *Geologische Karte*

Im Rahmen von zwei Diplomarbeiten ist eine geologische Karte der Val Tavrü entstanden. Auf dieser sind die im Tal vorkommenden Gesteine und Geländeformen eingetragen. Geologisch betrachtet liegt die Val Tavrü vollumfänglich im so genannten Ostalpin, der höchsten tektonischen Einheit der Alpen, die in mehrere Decken gegliedert wird. Es finden sich Gesteine der S-charl-Decke, die aus einem kristallinen Kern, dem Orthogneis, und Sedimentgesteinen (Verrucano, Dolomit und Kalk) aufgebaut ist.

#### *Gesteine*

Die ältesten Gesteine der Val Tavrü formen die weichen, grasbewachsenen Hänge der Ostseite und des hinteren Talkessels. Der stark zerbrochene und deformierte Orthogneis zeugt von einer langen und bewegten Geschichte, die während einer voralpinen Gebirgsbildungsphase vor über 250 Millionen Jahren begann. Das alte Gebirge wurde im Laufe vieler Millionen Jahre wieder abgetragen. Zeugen dieses Abtragungsprozesses sind mit dem Verrucano erhalten: verschieferte, weisslich bis hellgrün gefärbte Sandsteine und Konglomerate. Nachdem das alte Gebirge vollständig abgetragen war, breitete sich ein untiefes Meer aus, in welchem durch Ablagerung Sedimentgesteine – unter anderem Dolomit und Kalk – entstanden. Diese Gesteine bilden heute die steilen und schroffen Felswände, welche das Tal gegen Süden abschliessen.

#### *Landschaftsformen*

Die Landschaft wird durch Wasser und Eis geformt. Moränenwälle und Eisrandterrassen sind Zeugen vergangener Eiszeiten. Nach dem Zerfall der Gletscher entwickelten sich lokale Toteislandschaften. Auch heute ist der Boden zumindest teilweise gefroren und durch wechselweises Auftauen und Gefrieren formen sich Erdzungen. Am Fusse eines sich jährlich neu bildenden Schneefeldes sammeln sich während der Schneeschmelze Steine und Blöcke an, die sich zu einer bogenförmigen Schneehaldenmoräne aneinander reihen. Beide Talflanken der Val Tavrü werden von tiefen Murgangrinnen eingeschnitten, aus denen in der Talebene mächtige Schuttfächer hervorgehen. An den Talhängen sind zahlreiche Anrissränder und offene Spalten zu erkennen, die längerfristig zu Rutschungen und Bergstürzen führen werden. Durch den Einfluss des Klimas verwittern die Gesteine, wodurch diese allmählich in einzelne, grössere und kleinere Blöcke zerfallen und am Fuss von Felswänden mächtige Schuttdecken bilden. ☞

Autorinnen und Autoren:

Walter Aberhalden, Arinas, 7530 Zernez; Aline Pasche, Département d'Ecologie et d'Evolution, Université de Lausanne, 1015 Lausanne; Daniel Cherix, Musée de zoologie, Palais de Rumine, Pl de la Riponne 6, 1014 Lausanne; Yves Gonseth, Centre suisse de cartographie de la faune, Terreaux 14, 2000 Neuchâtel; Christopher T. Robinson, Abteilung Limnologie, EAWAG, 8600 Dübendorf; Christian Schlüchter, Institut für Geologie, Universität Bern, Baltzerstr.1, 3012 Bern; Annina Margreth, Valentin Burki, Geologisches Institut ETH Zürich, Sonneggstr. 5, 8092 Zürich