

Influence de l'alcalinité

Objektyp: **Chapter**

Zeitschrift: **Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz = Matériaux pour la flore cryptogamique suisse = Contributi per lo studio della flora crittogama svizzera**

Band (Jahr): **5 (1915)**

Heft 2

PDF erstellt am: **17.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

En jetant un coup d'œil rétrospectif sur les trois essais de culture des *Coelastrum* dans les milieux acidulés, nous pouvons tirer la conclusion suivante : les milieux acides sont en général assez peu favorables au développement de notre algue. Au point de vue morphologique, les *Coelastrum* réagissent à la présence des acides dans la solution en réduisant la dimension des cénobes et en diminuant le nombre des cellules constitutives. Cette réaction est générale et très caractéristique.

Il nous reste encore pour finir l'exposé de nos expériences à voir l'influence des alcalis sur le développement des *Coelastrum*. La solution de $\frac{1}{3}$ Detmer + Fe a été neutralisée tout d'abord par la soude caustique et les quantités croissantes de NaOH ont été additionnées au milieu déjà neutralisé.

Influence de l'alcalinité.

1. 0,1‰ de NaOH.

Trois ou quatre semaines après l'ensemencement, la réaction du milieu n'est plus que très faiblement alcaline. Cénobes de toutes les formes, même du *C. cubicum*, et de toutes les grandeurs, souvent énormes et parfois en dissociation. Cellules isolées rares. Le contenu des cellules est souvent morcelé et se colore alors entièrement par KI iodé. Parfois la coloration des cellules devient jaunâtre.

2. 0,3‰ NaOH.

La réaction du milieu est encore faiblement alcaline. Développement, dans le flacon, intense. Plusieurs cénobes de toutes les formes ayant un nombre variable de cellules. Cellules isolées en majorité, pour la plupart arrondies, se multipliant par rajeunissement ou bien divisant leur contenu en de petits agrégats botryoïdes dont les cellules constitutives partent parfois une à une. Contenu cellulaire rarement divisé. Produits de bipartition.

3. 0,5‰ NaOH.

Réaction du milieu plus alcaline qu'avant et le développement dans le flacon est un peu moins intense. Les cénobes sont peu nombreux, pour la plupart petits et irréguliers. Souvent les cellules sont unies par deux ou trois ou davantage sans rappeler par leur disposition la forme des cénobes. Beaucoup de cellules chlorelloïdes à un, deux, trois ou quatre pyrénoides normaux, parfois sans pyrénouïde, se colorant alors entièrement par KI iodé. Agrégats botryoïdes compacts ou cénobes à quatre cellules groupées dans l'espace et adhérentes les unes aux autres. Cas de bipartition.

4. 1‰ NaOH.

Réaction du milieu nettement alcaline. Développement dans le flacon faible. Cellules isolées chlorelloïdes vertes à contenu parfois divisé. Petits cénobes compacts à six cellules au maximum rappelant plutôt des états coelastroïdes des *Chlorella*.

Résultats.

1. Les *Coelastrum* cultivés dans un milieu alcalin produisent bientôt une neutralisation partielle de ce milieu. Les solutions alcalines leur conviennent plus que les solutions acides.

2. L'augmentation de l'alcalinité a pour effet la production de cellules isolées et arrondies. Toutefois, les petits cénobes se trouvent encore en assez grande quantité — même à 1 ‰ de NaOH.

3. L'augmentation de l'alcalinité a pour résultat la formation de cénobes de plus en plus irréguliers et de plus en plus compacts. Les cas de rajeunissement et de bipartition deviennent plus fréquents avec les concentrations croissantes de NaOH.

Nous trouvons chez Artari (3) quelques indications sur l'influence des acides et des bases sur le développement des algues. En cultivant *Chlorella communis* dans des solutions faiblement alcalines de NH_4NO_3 , cet auteur s'est aperçu que ces solutions devenaient acides avec le temps; il s'est expliqué ce phénomène en supposant que NH_3 était employé par ces algues qui laissaient ainsi HNO_3 libre, explication qui ne s'applique évidemment pas au cas de notre algue neutralisant NaOH. La réaction alcaline, d'ailleurs, avait une influence favorable sur le développement, mais une forte alcalinité arrêta la croissance (à 5 ‰ de K_2HPO_4 pour *Chlorella*, tandis que le phosphate acide de potassium arrêta déjà le développement à 2 ‰). Ces résultats concordent ainsi avec les nôtres. Mais il n'en est pas de même pour toutes les algues, car, d'après le même auteur, *Stichococcus bacillaris* s'accommode plutôt aux solutions acides, de même que le *Chlamydomonas Ehrenbergii* (Artari 4), dont la croissance même provoque une augmentation de l'alcalinité, ce qui neutralise plus ou moins les milieux acides.

Après avoir fini nos expériences, nous avons choisi quelques flacons à contenu complètement desséché, arrivés à former une croûte rouge brique fortement adhérente au fond des Erlenmeyer et qu'il était difficile à enlever même en grattant le fond avec le scalpel. En y ajoutant un peu d'eau, nous avons pu observer comment les cénobes et les cellules gorgées de carotène et complètement desséchées sont peu à peu revenues à la vie active. Nous avons vu dans chaque cellule isolée ou faisant partie des cénobes, l'huile se ramasser en une goutte sphérique refoulée de côté et démasquant une partie de la cellule verte et normale; cette partie délivrée s'individualisait et sortait tantôt comme une cellule isolée, tantôt — beaucoup plus souvent encore et surtout dans les milieux dont la concentration initiale n'a pas

été trop élevée — en se divisant et en formant un nouveau petit cénobe tout à fait normal. La goutte d'huile et la carotène y dissoute restait à l'intérieur de la vieille membrane abandonnée ou se répandait dans le milieu liquide. Un mois après l'addition de l'eau distillée, le contenu du flacon était déjà d'un vert frais et on y trouvait rarement des cellules rouges ou à membrane fortement épaissie. Ce curieux pouvoir de reviviscence doit jouer un rôle très important dans la vie des *Coelastrum* dans la nature. Si, à un moment donné de l'année, les mares où notre algue vit se dessèchent complètement, même pour une période assez longue, l'existence de l'espèce n'en est nullement compromise. Avec les premières pluies, les *Coelastrum* acquièrent de nouveau leur aspect normal en passant de l'état latent à la vie active, ne différant en rien des *Coelastrum* vivant continuellement dans des conditions propices à leur développement.

Nous croyons pouvoir tirer de nos expériences les conclusions suivantes :

1. *Coelastrum proboscideum* Bohl. est une algue excessivement polymorphe, pouvant revêtir au cours de son développement des stades variés rappelant d'autres espèces et même d'autres genres. Ainsi nous avons pu voir, à côté des cénobes typiques *C. proboscideum*, des formes ressemblant à *C. sphaericum*, *microporum*, *cubicum*, *astroideum*, voire même *scabrum*; la même algue formait des états botryoïdes compacts, à cellules arrondies ou appendiculées; enfin, elle se présentait très souvent sous forme de cellules isolées ne différant en rien de *Chlorella* et de *Polyedrium* typiques.

2. Ces variations peuvent être considérées comme autant de réactions morphologiques vis-à-vis des différents milieux, puisqu'à chaque milieu donné correspond un ensemble de variations d'un type déterminé. La plante, dont nous nous sommes occupée, montre ainsi un polymorphisme oecogénique très prononcé.

3. Les *Coelastrum* se présentent ordinairement sous la forme des cénobes, mais ces cénobes peuvent se désarticuler en leurs cellules constitutives arrondies ou polyédriques, phénomène très fréquent dans les milieux à concentrations croissantes et indépendant des actions mécaniques extérieures.

4. Les cénobes se trouvent surtout dans des milieux à faible concentration ou bien à une température élevée. Comme l'élévation de la température et la diminution de la concentration diminuent tous

les deux la viscosité du milieu, nous sommes arrivé par la voie expérimentale aux résultats que faisaient prévoir les déductions théoriques d'Ostwald.

5. La nutrition a pourtant aussi une influence sur la production des formes d'involution en tant qu'elle détermine une augmentation de taille des cellules isolées et surtout un plus grand nombre d'individus composant un cénobe.

6. La respiration enfin semble aussi avoir une influence sur la morphologie des *Coelastrum*; en anaérobiose plus ou moins complète se forment de préférence les cellules isolées, en présence d'oxygène les cénobes. La désagrégation des cénobes semble avoir pour conséquence l'augmentation de la surface en vue d'une meilleure respiration.

7. La peptone a une influence plutôt nocive sur les *Coelastrum* et provoque chez ces algues la sécrétion d'huile et la désarticulation des cénobes. Par contre, dans les milieux peptonisés, même en présence des sucres, l'algue conserve longtemps sa chlorophylle.

8. Les sels de calcium, en proportion de 0,25 à 1,75‰, accélèrent le développement des *Coelastrum* et augmentent les dimensions des cellules isolées et des cénobes.

9. Les sels de potassium dans la proportion de 0,5 à 1,75‰ ont une influence inhibitrice sur la formation des cénobes, mais en absence de KCl le contenu des cellules est plus ou moins altéré.

10. Les acides dilués exercent plutôt une influence peu favorable sur le développement des *Coelastrum*; les cénobes y deviennent de plus en plus petits et le nombre des cellules qui entrent dans leur composition diminue aussi progressivement.

11. Les alcalis, par contre, dans la proportion de 0,1 à 0,5‰ de NaOH après neutralisation du milieu, exercent une influence plutôt favorable sur le développement des *Coelastrum* et deviennent avec le temps partiellement neutralisés.

