

On a certain problem of Ulam and its generalization

Autor(en): **Biswas, Anup**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Elemente der Mathematik**

Band (Jahr): **65 (2010)**

PDF erstellt am: **09.08.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-130694>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

On a certain problem of Ulam and its generalization

Anup Biswas

Anup Biswas received his Bachelor of Science degree at the University of Calcutta, India, in 2005. He was awarded his Master degree from the Tata Institute of Fundamental Research in Bangalore in 2007, where he is currently employed as a research scholar.

Introduction

Let \mathbb{N} be the set of all positive integers with usual operations $a + b \equiv s(a, b)$ (addition) and $a * b \equiv m(a, b)$ (multiplication). For every bijection $p : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ define two mappings σ and μ from \mathbb{N} to \mathbb{N} such that $\sigma(c) = \sigma(p(a, b)) = s(a, b)$ and $\mu(c) = \mu(p(a, b)) = m(a, b)$ for all $c \in \mathbb{N}$. Such a bijection p is known as *Peano mapping*. In [1, p. 32] S.M. Ulam asked “Does there exist a Peano mapping p such that addition commutes with multiplication in the sense that $\sigma(\mu(c)) = \mu(\sigma(c))$ for all $c \in \mathbb{N}$?”. No examples were known, and then the well-known Peano mapping $p(a, b) = 2^{a-1}(2b - 1)$ was seen by Ulam not to work, as $\mu(\sigma(2)) = \mu(3) = 2$, $\sigma(\mu(2)) = \sigma(2) = 3$. Though the question is very natural and fascinating, it never got an answer since then.

In this article, we answer Ulam’s question in showing that no Peano mapping exists with the desired property. The proof is simple and totally elementary.

In dem nachfolgenden Beitrag wird ein auf S.M. Ulam zurückgehendes Problem gelöst. Ist $p : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ eine Bijektion, eine sog. *Peano-Abbildung*, und bedeuten $s, m : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ die Abbildungen, die durch $s(a, b) = a + b$ (Addition) bzw. $m(a, b) = a \cdot b$ (Multiplikation) gegeben sind, so seien $\sigma, \mu : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ durch $\sigma = s \circ p^{-1}$ bzw. $\mu = m \circ p^{-1}$ festgelegt. Es besteht nun die Frage, ob es eine Peano-Abbildung p mit der Eigenschaft gibt, dass σ und μ vertauschen, d.h. dass für alle natürlichen Zahlen c die Gleichheit $\sigma(\mu(c)) = \mu(\sigma(c))$ gilt. Die Abbildung p , gegeben durch $p(a, b) = 2^{a-1}(2b - 1)$, ist beispielsweise eine Peano-Abbildung; allerdings gilt in diesem Fall $\sigma(\mu(2)) = 3$ und $\mu(\sigma(2)) = 2$. Der Autor zeigt, dass dieses Beispiel keine Ausnahme darstellt, dass es also keine Peano-Abbildung gibt, die das gewünschte Vertauschen von σ und μ zulässt.

We further show that no such Peano mapping exists in \mathbb{R}^+ . The proof uses only quadratic extensions of \mathbb{Q} , and so works as well for the algebraic numbers \mathbb{A}^+ , but it leaves the case of \mathbb{Q}^+ open.

Proof for \mathbb{N}

Let us assume that there exists a Peano map p such that σ and μ commute. Note that $\sigma = s \circ p^{-1}$ and $\mu = m \circ p^{-1}$. Therefore we have

$$m \circ p^{-1} \circ s \circ p^{-1} = s \circ p^{-1} \circ m \circ p^{-1},$$

or

$$m \circ p^{-1} \circ s = s \circ p^{-1} \circ m.$$

To simplify notation, write $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ for the bijection p^{-1} . Then

$$(m \circ f \circ s)(a, b) = (s \circ f \circ m)(a, b) \quad \forall (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}. \quad (1)$$

We first show that $f(1) = (1, 1)$. Assume to the contrary that there exists an integer $k > 1$ such that $f(k) = (1, 1)$. So

$$(m \circ f \circ s)(k - 1, 1) = m(f(k)) = m(1, 1) = 1 = (s \circ f \circ m)(k - 1, 1) = s(f(k - 1)).$$

This is impossible, as $s(f(n)) \geq 2$ in \mathbb{N} . Moreover $s(f(n)) = 2$ implies $n = 1$.

As a consequence,

$$(s \circ f \circ m)(1, 1) = s(f(1)) = 2 = (m \circ f \circ s)(1, 1) = m(f(2)).$$

Hence $f(2) \in \{(1, 2), (2, 1)\}$. If $f(2) = (1, 2)$, there exists an integer $k > 2$ such that $f(k) = (2, 1)$. Again from (1) we have

$$(m \circ f \circ s)(k - 1, 1) = 2 = (s \circ f \circ m)(k - 1, 1) = s(f(k - 1)).$$

So $k - 1 = 1$ or $k = 2$, a contradiction. The same argument works with $f(2) = (2, 1)$. This proves that there is no Peano mapping for which σ and μ commute. \square

Proof for \mathbb{R}^+

As above, suppose to the contrary that a bijection $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+$ exists, satisfying

$$(m \circ f \circ s)(a, b) = (s \circ f \circ m)(a, b) \quad \forall (a, b) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+. \quad (2)$$

Take three real numbers u, v, w such that the system of five equations

$$x_i + y_i = u_i, \quad x_i \cdot y_i = v_i \quad (1 \leq i \leq 5)$$

with

$$\begin{aligned} u_1 = u_2 = u_4 = v_1 = v_3 = v_5 &= u, \\ u_3 = v_2 &= v, \\ u_5 = v_4 &= w \end{aligned}$$

has positive real solutions (e.g. $u = 6, v = 7, w = 8$).

Let $f(u) = (a, b)$. From $m \circ f(x_i + y_i) = s \circ f(x_i \cdot y_i)$ (equation (2)), one gets

$$\begin{aligned} m \circ f(u) &= m \circ f(v) = m \circ f(w) = ab, \\ s \circ f(u) &= s \circ f(v) = s \circ f(w) = a + b. \end{aligned}$$

As there are at most two solutions for $f(u)$, $f(v)$, and $f(w)$, namely (a, b) and (b, a) , the map f cannot be a bijection, establishing the desired result. \square

References

- [1] Ulam, S.M.: *Problems in Modern Mathematics*. John Wiley, New York 1964.

Anup Biswas
 Centre for Applicable Mathematics
 Tata Institute of Fundamental Research
 Post Bag No 6503, Chikkabommasandra
 Bangalore–560065, India
 e-mail: anup@math.tifrbng.res.in