

Tafeln

Autor(en): **[s.n.]**

Objektyp: **Appendix**

Zeitschrift: **Eclogae Geologicae Helvetiae**

Band (Jahr): **53 (1960)**

Heft 2

PDF erstellt am: **13.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

CARTE GÉOLOGIQUE DES PRÉALPES MÉDIANES AU SW DU MOLÉSON

par
J. von der Weid
Echelle 1 : 25 000

Quaternaire

- Alluvions récentes
- Marais, tourbière
- Eboulis
- Eboulement
- Glissement
- Côte de déjection
- Tuf calcaire
- Terrasse post-würmienne
- Crête morainique
- Bloc erratique
- Glacière rhodanien (gr) sarinien (gs) et local (gl)

Direction et plongement des couches

horizontal

vertical

Plissement

Faille

Niche d'arrachement gr

Gisement fossilifère

Bassin fermé avec perte

Résurgence

Source

Source captée

Dolines

Préalpes médianes


- Néocomien
- Kimméridgien-Tithonique
- Oxfordien sup.-Séquanien
- Callovien-Oxfordien moy.
- Bathonien
- Niveau à N. tripartitum
- Bajocien
- Schistes noirs aaléniens
- Toarcien-Aalénien
- Infra-Toarcien
- faciès des schistes siliceux
- Pliensbachien-Domérien
- 3.Brèche à Bèlemnites
- Sinémurien 2.Br à Echinodermes
- 1.Br. dolomitique
- Hettangien
- Rhétien
- Dolomie et calcaire dolomitique
- Cornioule
- Gypse

Ecaillés de la zone de contact

- Crétacé supérieur (couches rouges)
- Malm
- Malm inférieur
- Lias supérieur
- Lias inférieur

Préalpes externes


- Flysch



PROFILS GÉOLOGIQUES DE LA RÉGION SW DU MOLÉSON

par
J. von der Weid

Echelle 1: 25.000



Orientation générale NW-SE

↓
Changement d'orientation (profil 11)

- | | | |
|-------------------|---|----------|
| Quaternaire | Éboulis, éboulements | } Malm |
| | Tourbe (profil 4) | |
| | Glaçière rhodanienne (gr) sarinienne (gs) et local (gl) | |
| Préalpes externes | Flysch | } Dogger |
| | Neocomien | |
| | Kimméridgien - Tithonique | |
| Préalpes médianes | Oxfordien sup. - Séquanien | } Lias |
| | Callovien - Oxfordien moyen | |
| | Bathonien | |
| | Bajocien | |
| | Lias supérieur | |
| | Lias moyen | } Trias |
| | Sinemurien | |
| | Heltangien | |
| | Rhétien | |
| | Calcaire dolomitique | |
| | Cornéule | |
| | Gypse | |

