

# Albinismus bei "Fabriciana adippe"

Autor(en): **Ziegler, H.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel**

Band (Jahr): **20 (1970)**

Heft 4

PDF erstellt am: **15.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-1042717>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## ALBINISMUS BEI "FABRICIANA ADIPPE"

H. Ziegler

Am 19. Juli 1970 hatte ich das Glück, in Le Prese im Puschlav auf ca. 1000 m Höhe die abgebildete Albinof orm (Abb.2) von "Fabriciana adippe Rott." zu fangen. Am Fangplatz, einem mit lockerem Buschbestand bewachsenen Bergbachdelta, flogen sowohl die Nominatform (Abb.1) als auch die Form "Fabriciana adippe Rott. f.cleodoxa".

Bei der Albinof orm sind die normalerweise schwarzen Flecken farblos grau. Die orange Grundfarbe unterscheidet sich nicht von der der Nominatform. Auf der Unterseite fehlt die grünliche Färbung, während die Silberflecken vollständig vorhanden sind. Die Flecken auf der Unterseite der Vorderflügel haben eine helle schwarz-graue Färbung.

Bei der Suche nach Literaturangaben über diese Form machte mich Herr P.HUNZIKER auf das im Jahre 1938 erschienene Buch "Varieties of British Butterflies" von F.W.FROHAWK aufmerksam, in dem eine solche Albinof orm abgebildet ist. Sie trägt den Namen "Albinof orm von Argynnis cydippe L." (Synonym von Fabriciana adippe Rott.) und wurde im Juli 1901 in Ramnore in Südengland gefangen und befindet sich jetzt in der Rothschild-Sammlung.




Abb. 1

Photo: G. Vogt, Birsfelden

Abb. 2

Adresse des Verfassers:

Heiner Ziegler  
Michelbacherstr. 23  
4000 B a s e l