

Sur la répartition de certains Morphidae s. l. dans la région méditerranéenne (Lepidoptera)

Autor(en): **Riedl, T.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel**

Band (Jahr): **28 (1978)**

Heft 3

PDF erstellt am: **27.06.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-1042621>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

SUR LA REPARTITION DE CERTAINS MOMPHTIDAE S. L. DANS LA REGION MEDITERRANEENNE (Lepidoptera)

T. Riedl

Le présent article est consacré à la répartition géographique de quelques espèces. Les données concernant la répartition des Momphidae s.l. (Momphidae, Blastodacnidae, Cosmopterigidae, Chrysopeleidae, Stathmopodidae) dans la région méditerranéenne sont contenues dans un grand nombre de travaux; néanmoins, il semble utile d'en citer quelques-uns. Mentionnons donc le Catalogue de L. LHOMME (1946, 1948, 1949) consacré à la faune française, ceux de MARIANI (1939, 1943) (faune italienne), de même que le travail de HARTIG & AMSEL (1951) (faune de Sardaigne). Un certain nombre des données vérifiées, selon nos connaissances actuelles, se trouve dans mes propres publications (RIEDL, 1969, 1975, 1976).

Les matériaux faisant l'objet de cet article ont été étudiés au Laboratoire de Biologie animale (Ecologie) de l'Université d'Aix-Marseille III où j'ai séjourné deux mois, en 1977, grâce à une bourse du Gouvernement français. Ils m'ont été communiqués par le Dr. L. BIGOT (Marseille) et par le Dr. F. HARTIG (Bolzano), auxquels je me permets d'exprimer ma plus vive reconnaissance pour leur aimable aide et pour leur bienveillance.

Tous les matériaux étudiés proviennent de Sardaigne, d'Italie et de France méridionale (3 ex. provenant de Turquie et de Libye mis à part); la majorité d'entre eux a été récoltée par le Dr. F. HARTIG en Sardaigne, au cours des années 1972-1976.

Il n'est question ici que de 9 espèces. Parmi elles, on trouvera des espèces nouvelles pour la faune d'Italie et de Sardaigne. En outre, on parlera également de quelques exemplaires appartenant aux espèces encore peu connues ou localisées et observées rarement.

Mompha ochraceella (Curt., 1839)

Italie: 1 ex. "Lucania, M. te Vulture, Groticelle, 1966", leg. HARTIG.

Espèce citée à plusieurs reprises d'Europe occidentale et centrale; sa distribution en Italie est peu connue.

Mompha divisella H. -S., 1853

Italie: 1 ex. "Lucania, M. te Vulture dint. Laghi di Monticchio, 750 m, 1967", leg. HARTIG.

Tout en habitant une grande partie de l'Europe, elle est localisée et manque dans certaines régions.

Cosmopterix coryphaea Wlsm., 1907

Sicile: 1 ex. "Sicilia, Casteldaccia, Palermo, VI 1930".

L'exemplaire en question provient de la collection d'E. TURATI, dans laquelle il était placé à côté du type de Cosmopterix rufella Tur. et considéré à tort comme un représentant de cette dernière espèce.

Espèce méditerranéenne; elle habite les Iles Canaries, l'Espagne méridionale, quelques parties d'Afrique du Nord, la Palestine.

Eteobalea intermediella (Riedl, 1966)

Italie: 1 ex. "Roma, Olgiata, 7.VI.1965", leg. HARTIG et 2 ex., même localité, 11.VI.1969, leg. P. PROVERA; 2 ex. "Lucania, Monticchio, Valle dell'Ofano, 300 m, 17.VI.1970" et 1 ex. "Lucania, M.te Vulture dint. Laghi di Monticchio, 750 m, 26.VI.1970", leg. HARTIG; Sicile: 1 ex. "Sicilia Ficuzza, 700 m, 28.VI.1971", leg. HARTIG; 1 ex., même localité, leg. KRUEGER; Sardaigne: 1 ex. "Sardinia, Gennargentu, Aritzo, 800 m", 1 ex. "Sardinia, Domusnovas", 1 ex. "Sardinia centr., Belvi Umg., 700 m", 15 ex. "Sardinia merid., Musei, 120 m"; tous les exemplaires ont été récoltés par HARTIG, de 1972 à 1976.

Espèce connue de Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne (Andalousie, Catalogne), France, Sicile, Autriche, Macédoine, Crète. Elle est donc nouvelle pour la faune de l'Italie continentale et de la Sardaigne.

Eteobalea sumptuosella (Led., 1855)

Turquie: 1 ex. "Marasch, Taurus".

Répartition géographiques: Tunisie, Maroc, Espagne, France méridionale, Italie, Yougoslavie, Albanie, Chypre, Palestine, Syrie, Asie Mineure, Mésopotamie.

Eteobalea serratella (Treit., 1833)

Italie: 1 ex. "Lucania, M.te Vulture dint. Laghi di Monticchio, 750 m, 17.VII.1967", leg. HARTIG, 1 ex. "Roma, Olgiata, 10.VII.1966", leg. HARTIG.

Depuis la révision des espèces du groupe d'E. serratella que j'ai réalisée en 1965, cette espèce ne figurait plus dans la liste des espèces italiennes. On peut donc la considérer comme nouvelle pour la faune d'Italie.

Elle est largement répandue, habitant l'Espagne, la France méridionale, l'Europe centrale et méridionale, le sud européen de l'U.R.S.S., la Syrie et pénétrant jusqu'en Mongolie.

Eteobalea dohrnii (Zell., 1847)

Libye: 2 ex. "Cyrenaica", leg. KRUEGER; Sardaigne: 7 ex. "Sardegna merid., Musei, 120 m" et 1 ex. "Sardinia centr., Belvi Umg., 700 m", leg. HARTIG.

E. dohrnii (Zell.) est un élément géographique méditerranéen; soulignons ici sa présence en Cyrénaïque, d'où il n'a pas été cité.

Vulcaniella fiordalisa (Petry, 1904)

Sardaigne: 1 ex. "Sardegna centr., parte centr., Sa Casa, 4.VII.1976", 1 ex. "Sard. centr., M. Gennargentu, Arcu Frucca, 1000 m, 21.VI.1976", 1 ex. "Sard. centr. Belvi M. Istiddi, 720 m, 1.VII.1976", leg. HARTIG.

Encore un élément méditerranéen typique, connu d'Espagne, de France méridionale, Corse, Sardaigne, Italie et Dalmatie.

Pancalia nodosella Mann, 1854

France: Var: 1 ex. "Mt. Aurélien, 29.IV.1969", 1 ex. "Hyères, 2.V.1948";
Vaucluse: 1 ex. "Luberon, 13.IV.1949"; Bouches du Rhône: 1 ex. "Camar-
gue, 18.III.1959". Tous les exemplaires recueillis par le Dr. L. BIGOT
et conservés dans sa collection.

Il y a beaucoup de citations de P. nodosella Mann dans certaines régions;
de nombreuses parmi elles sont erronées. Selon les données vérifiées, elle
habite l'Espagne, la Yougoslavie, l'Albanie, la Bulgarie et l'Autriche. De
la France, elle n'a été signalée que de La Bastide-Murat (Lot) (LHOMME,
1946). Voici donc une extension de l'aire de répartition de cette espèce en
France.

Bibliographie

- HARTIG, F. & AMSEL, H.G. 1951 Lepidoptera Sardinica.
Fragm. Entom., Roma, 1, p.1-152.
- LHOMME, L. 1946,1948,1949 Catalogue des Lépidoptères de France
et de Belgique, 2, p. 505-507 (sign.
32) et 677-699 (sign. 42-44).
- MARIANI, M. 1939 Fauna Lepidopterorum Siciliae (Cata-
logo Regionato). Mem. Soc. entom.
ital., 17 (1938), p. 129-187.
- 1943 Fauna Lepidopterorum Italiae, Parte
I -Catalogo Regionato dei Lepidotteri
d'Italia. Gorn. Sci. Nat. ed Econ.,
42, p. 175-178.
- RIEDL, T. 1965 Matériaux pour la connaissance des
Momphides paléarctiques (Lepidoptera).
Partie III. Etude sur quelques Mom-
phides européens. Bull. ent. Pologne,
35, p. 419-468.
- 1969 Matériaux pour la connaissance des
Momphidae paléarctiques (Lepidoptera).
Partie IX. Revue des Momphidae euro-
péennes, y compris quelques espèces
d'Afrique du Nord et du Proche-Orient.
Bull. ent. Pologne, 39, p. 635-919.
- 1975 Brève révision des espèces du groupe
d'Eteobalea beata (Walsingham) (In-
secta Lepidoptera Cosmopterigidae).
Bull. Mus. natn. Hist. nat., Paris,
3^e sér., n^o 335, Zoologie 237, p.1293-
1302.
- 1976 Sur quelques Momphidae s.l. d'Afrique
du Nord (Lep. Gelechioidea). Ann.Soc.
ent. France, (N.S.), 12, p. 187-197.

R é s u m é

L'auteur présente les données concernant la répartition géographique de 9 espèces de Momphidae s.l. L'article est basé sur les matériaux récoltés en Sardaigne, Italie et France méridionale par le Dr. L. BIGOT et par le Dr. F. HARTIG. L'espèce Eteobalea serratella (Treit.) peut être considérée comme nouvelle pour la faune italienne, E. intermediella (Riedl) est nouvelle pour la Sardaigne et l'Italie continentale. En outre, l'auteur confirme la présence de Pancalia nodosella Mann en France méridionale.

Zusammenfassung

Die Angaben des Autors betreffen die geographische Verteilung von 9 Momphidae (s.l.)-Arten. Das vom Autor studierte Material wurde in Sardinien, Italien und Südfrankreich von Dr. L. BIGOT sowie von Dr. F. HARTIG gesammelt. Die Art Eteobalea serratella (Treit.) darf als neu für die italienische Fauna betrachtet werden. E. intermediella (Riedl) ist neu für Sardinien und Kontinental-Italien. Der Autor bestätigt noch die Anwesenheit von Pancalia nodosella Mann in Südfrankreich.

Adresse de l'auteur:

Doz. Dr. T. Riedl
Académie d'Education Physique,
Laboratoire d'Ecologie
Al. Olimpijska 35
51-612 Wrocław (Pologne)

Entomologische Notizen

KARTIERUNG SARDISCHER TAGFALTER

Aufruf zur Mitarbeit

In der Entomologischen Zeitschrift (Band 80, Nr. 19) vom 1.10.1976 baten J. HEATH und J. LECLERCQ um Mitarbeit bei der Erfassung der europäischen Wirbellosen.

In diesem Aufruf wurde u. a. darauf hingewiesen, dass die Mitarbeit an diesem Projekt sich auch in der Erstellung von Artenlisten für eine bestimmte Region sowie in der Erarbeitung von Verbreitungskarten der dort vorkommenden Arten ausdrücken kann.