Zeitschrift: Bulletin romand d'entomologie

Herausgeber: Société vaudoise d'entomologie ; Société entomologique de Genève

Band: 9 (1991)

Heft: 1

Artikel: Note sur quelques araignées salticides de Suisse romande et du Tessin (Araneae, Salticidae)

Autor: Neet, Comelis

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-986309

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 02.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

BULLETIN ROMAND D'ENTOMOLOGIE **9** : 3 - 5 (1991)

Note sur quelques araignées salticides de Suisse romande et du Tessin (Araneae, Salticidae)

par Cornelis NEET
Centre de conservation de la faune, d'écologie et d'hydrobiologie appliquées
1, ch. du Marquisat, CH - 1025 St - Sulpice

La famille des Salticidae regroupe les araignées sauteuses, caractérisées par de grands yeux frontaux et un mode de chasse basé sur un repérage visuel, suivi d'une capture par un bond sur la proie. La présente note signale quelques observations éparses dans le but de contribuer à une meilleure connaissance de la distribution et de l'écologie de ce groupe d'araignées.

Evarcha falcata
Lieu:tourbière du Cachot (NE)
Coordonnées: 541250/206000
Nombre: 2 mâles, 2 femelles Date: juin-juillet 1983
Remarques: Cette espèce est assez fréquente dans la partie supérieure de la strate herbacée des canaux de la tourbière du Cachot (voir, pour plus de précisions sur cet habitat: Matthey 1971; Neet 1987). Il ne s'agit toutefois pas d'une espèce caractéristique des tourbières.

Leptorchestes berolinensis
Lieu:Avenue du Chablais, Lausanne
Coordonnées: 535650/152800
Nombre: 1 mâle, 2 femelles Date: juin 1990
Remarques: Cette araignée a été observée dans un jardin de la région lausannoise, sur de vieux murs exposés au soleil.

Marpissa muscosa
Lieu: Chemin de la Roche, Renens
Coordonnées: 535250/153950
Nombre: 1 femelle Date: mai 1986

Remarques: Cette espèce a été observé à diverses reprises sur des poteaux téléphoniques en bois. Elle se tient généralement dans les fissures du bois. Les adultes sont visibles dès les premières journées chaudes du printemps et jusqu'au début de l'été. Egalement présente en milieu urbanisé.

Marpissa nivoyi
Lieu: Prémurin, Ligornetto (TI)
Coordonnées: 717562/80800
Nombre: 1 femelle Date: 31 mai 1987
Remarques: Il s'agit de la quatrième observation de cette espèce en Suisse, et de la troisième pour le Tessin (Maurer et Hänggi 1990). Cet individu a été découvert dans un marais de pente ensoleillé de 1320 m^2, où l'on trouve des espèces comme *Phragmites communis*, *Cladium mariscus*, *Juncus acutiflorus*, *Schoenus nigricans*, *Molinia coerulea* et *Carex flacca* (Baroni et Caldelari 1987).

Myrmarachne formicaria
Lieu:Châble Perron, rive sud du Lac de Neuchâtel
Coordonnées: 543450/183250
Nombre: 1 mâle, 2 femelles Date: juin 1986
Remarques: Cette espèce a été, à plusieurs reprises, capturée parcequ'elle avait confectionné un nid dans le mécanisme de pièges Longworth utilisés pour le piégeage de micromammifères. Habitat: au sol, dans la forêt riveraine humide.

Salticus cingulatus
Lieu: tourbière du Cachot (NE)
Coordonnées: 541250/206000
Nombre: 1 mâle Date: août 1983
Remarques: Cette espèce est assez fréquente dans la strate herbacée des gouilles de la tourbière du Cachot (voir, pour plus de précisions sur cet habitat: Matthey 1971; Neet 1987). Il ne s'agit toutefois pas d'une espèce caractéristique des tourbières.

Bibliographie

Baroni, P. et Caldelari, D. 1987. Contribution à l'étude des milieux humides du Tessin méridional. Travail de certificat, Institut de

Botanique Systématique et de Géobotanique, Université de Lausanne.

Matthey, W. 1971. Ecologie des insectes aquatiques d'une tourbière du Haut-Jura. Rev. suisse Zool. 78: 367-536.

Maurer, R. et Hänggi, A. 1990. Catalogue des araignées de Suisse. Documenta Faunistica Helvetiae. Schweizerischer Bund für Naturschutz, Centre suisse de Cartographie de la Faune, Neuchâtel.

Neet, C. R. 1987. Sélection de l'habitat chez l'araignée orbitèle *Tetragnatha extensa* (L.) (Araneae: Tetragnathidae). Bull. romand Entomol. 5: 93-102.

CONGRES ET CONFERENCES

Neuchâtel, du 2 au 6 septembre 1991:

XIIIème Colloque européen d'Arachnologie

organisé par l'Institut de Zoologie de l'Université de Neuchâtel.

Renseignements:
Pierre-Alain Fürst
Institut de Zoologie, Chantemerle 22
CH-2000 Neuchâtel