

I. — Théorème général.

Objektyp: **Chapter**

Zeitschrift: **L'Enseignement Mathématique**

Band (Jahr): **36 (1937)**

Heft 1-2: **L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE**

PDF erstellt am: **13.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

SUR LES DIVISIONS SEMBLABLES TRACÉES SUR LES CÔTÉS D'UN TRIANGLE

PAR

R. MARCHAY (Rouen).

I. — THÉORÈME GÉNÉRAL.

1. Soit un triangle $A.B.C.$, $L.M.N.$, des points mobiles qui déterminent respectivement sur les côtés a, b, c , des divisions semblables.

Soit V un point quelconque du plan. Faisons une inversion de pôle V : a, b , et c , se transforment en trois cercles a', b', c' ; ceux des cercles $L.M.N.$ ou Γ qui passent par V , se transforment en des droites.

Accentuons: les inverses L', M', N' , de L, M, N , appartiennent à des divisions homographiques, sur a, b, c , qui ont V pour point commun. Il en résulte que les cercles $M'.N'.A'$ et $M'.L'.C'$ passent respectivement par des points E et F distincts de A' et C' et qui ne dépendent que de la position de V .

A tout point M' , correspondent deux intersections du cercle $E.M'.N'.A'$ avec c , l'enveloppe de $M'.N'$ quand M et N sont supposés décrire seuls les divisions données est donc une conique.

De même l'enveloppe de $M'.L'$ quand M et L sont supposés décrire seuls les divisions données est une conique.

Il en résulte que L', M', N' , ont quatre systèmes de positions en ligne droite, et, *par le point V passent au plus quatre cercles Γ .*

2. — On en conclut que *l'enveloppe de la corde commune au cercle Γ et à une position fixe Γ_0 de ce cercle est une courbe de troisième classe au plus.*

3. — Il y a trois systèmes de positions L.M.N., en ligne droite, deux sont en général à distance finie, nous les désignerons par Δ_1 et Δ_2 ; la troisième est la droite de l'infini. Si le cercle Γ correspondant coupe les côtés en trois autres points à distance finie, ces points sont en ligne droite, et nous dirons que le système est *convergent*. Dans le cas contraire, nous dirons qu'il est *divergent*.

Avant de passer à l'étude des systèmes convergents, nous examinerons quelques propriétés des droites de Simson généralisées.

II. — DROITES DE SIMSON SOUS UN ANGLE QUELCONQUE.

4. — Les projections sous l'angle φ d'un point du plan d'un triangle sur les côtés et les projections $(\pi - \varphi)$ de son inverse, sont sur une même circonférence. Si l'inverse est à l'infini, ce cercle devient la droite de Simson, sous l'angle φ du point donné. Le lieu des points qui ont des droites de Simson sous un angle quelconque est le cercle circonscrit (*J. de Vuibert, 37^{me} année, p. 45*).

5. — Les points dont les droites de Simson (φ) passent par un point Q sont sur une hyperbole passant par Q, par un sommet A, et, admettant pour directions asymptotiques, celles des projetantes (φ) sur les côtés B.A. et C.A.

Cette conique coupe le cercle circonscrit en trois autres points. *Donc la condition de convergence des droites de Simson (φ) de trois points S, S₂, S₃, est que S₂, S₃ soit antiparallèle à A.S. par rapport à l'angle B.A.C., dévié de l'angle ($-\varphi$).*

6. — Soient, s, s_2, s_3, α les distances angulaires dirigées de S, S₂, S₃, A, à A par rapport au centre O du cercle circonscrit. A' étant l'extrémité de la corde AA' parallèle à B.C. — Par A, je mène la corde AS'₁ parallèle à S₂, S₃; ou a , le rayon étant pris pour unité, $\widehat{S_2 S_1} = s_3$.

La condition de convergence est alors que AS₁ et AS, soient antiparallèles, etc... C'est-à-dire que l'on ait

$$\widehat{S_1 B} - \varphi = \varphi - \widehat{S'_1 C}$$