

8. — Les deux familles de cercles focaux des coniques A CENTRE.

Objekttyp: **Chapter**

Zeitschrift: **L'Enseignement Mathématique**

Band (Jahr): **37 (1938)**

Heft 1: **L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE**

PDF erstellt am: **13.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Quant au fait que deux droites Γ et Γ_1 se coupent sur la médiatrice de HH_1 , c'est une propriété bien connue des diamètres de la parabole.

Pour démontrer que nos courbes \mathcal{C} sont effectivement des paraboles, on pourrait procéder comme au paragraphe précédent, on ne rencontrerait que des simplifications; mais il suffira de noter qu'en prenant D confondue avec ωx , auquel cas la tangente au point M de \mathcal{C} situé sur ωx est perpendiculaire à ωx , nous avons l'équation de \mathcal{C} en coordonnées rectangulaires par la formule (17'); ωd est le paramètre de notre parabole.

8. — LES DEUX FAMILLES DE CERCLES FOCaux DES CONIQUES A CENTRE.

J'ai maintenant achevé ce que je m'étais proposé de faire quant à la théorie générale. Sans doute cette étude pourrait être, comme toute étude, poussée plus loin, mais je me bornerai à donner encore quelques indications que les professeurs pourraient utiliser pour la construction d'exercices. A cet égard, la caractérisation des familles de cercles focaux est essentielle. Elle peut être faite de bien des manières; j'indique de nouvelles formes de cette caractérisation dans le cas des coniques à centre.

Reprenons la relation, qui nous a servi dans le § 5, entre les puissances d'un point M par rapport à γ , Γ et H , et prenons pour M le point ω ; nous avons:

$$-r^2 + (k-1)[\overline{\omega\Omega}^2 - R^2] - k\overline{\omega H}^2 = 0,$$

ou

$$-r^2 - (k-1)R^2 + \overline{\omega\Omega}^2 \left[k-1 - \frac{k}{K^2} \right] = 0.$$

Simplifions en multipliant par $\frac{-k}{k-1} = -K$, on a:

$$Kr^2 + kR^2 - \overline{\omega\Omega}^2 = 0. \quad (18)$$

Cette relation, qui aurait permis une recherche facile des foyers, s'écrit, en supposant que ωx soit l'axe focal, en conservant

aux lettres a, b, c leur sens ordinaire, et en posant $B = + b^2$ pour l'ellipse, $B = - b^2$ pour l'hyperbole, d'où $k = \frac{c^2}{a^2}$,
 $K = \frac{c^2}{-B}$,

$$B [c^2 R^2 - a^2 \overline{O\Omega^2}] = a^2 [c^2 r^2 + B \overline{O\omega^2}].$$

D'ailleurs, dans les cercles Γ il y a toujours celui pour lequel Ω est en O et $R = a$, ceci donne la valeur constante du rapport du premier crochet à a^2 , d'où, pour remplacer (18),

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{c^2}{a^2} R^2 - \overline{O\Omega^2} = c^2, \\ \frac{c^2}{B} r^2 + \overline{O\omega^2} = c^2. \end{array} \right. \quad (19)$$

Ces formules donnent les caractérisations suivantes: si l'on modifie dans le rapport $\frac{c}{a}$ les rayons des cercles focaux ayant leurs centres sur l'axe non focal, on a le faisceau Φ des cercles passant par les foyers;

si l'on modifie dans le rapport $\frac{c}{\sqrt{-B}}$ les rayons des cercles focaux ayant leurs centres sur l'axe focal, on a le faisceau Ψ orthogonal au faisceau Φ .

Le rapport $\frac{c}{\sqrt{-B}}$ n'est réel que pour l'hyperbole, il égale alors $\frac{c}{b}$. Pour l'ellipse il faut dire: si l'on modifie dans le rapport $\frac{c}{b}$ les rayons des cercles focaux ayant leurs centres sur l'axe focal, on a les circonférences qui sont coupées diamétralement par celles du faisceau Φ .

Suivant la nature de la conique et la famille de cercles focaux envisagés, ces énoncés peuvent être mis sous diverses formes géométriques. Les plus élégantes ne sont d'ailleurs pas celles que suggèrent immédiatement les formules (19). Ainsi, considérons une hyperbole de cercle principal Γ_0 , de foyer F , de directrice correspondante d , d'asymptote $s'O_sT$; s' et s étant sur Γ_0 , s sur d , T sur la droite directrice D , parallèle à Ox , d'un cercle focal Γ dont le centre Ω est sur Oy ; D et d se coupent en H , le pied de d sur Ox est d_0 .

Le cercle de diamètre MT considéré au § 4 se réduit pour le cas de l'asymptote, M étant à l'infini, à la perpendiculaire en T à OT. Comme ce cercle est orthogonal à Γ , cette perpendiculaire est ΩT . (Si l'on remarque que les pieds des normales abaissées de Ω sur l'hyperbole sont les points de rencontre de cette hyperbole et de D, on reconnaît là une propriété connue que nous démontrons incidemment.)

L'axe radical Δ de Γ et Γ_0 étant équidistant des droites directrices D et Ox coupe l'asymptote au milieu Δ_0 de OT. Donc les symétriques S et S' de s et s' par rapport à Δ_0 sont sur Γ et nous avons cet énoncé, dû à M. H. Mirabel (*loc. cit.*) : *les cercles focaux d'une hyperbole ayant leurs centres sur l'axe non focal découpent sur les asymptotes des segments de longueur 2a.*

Le cercle Γ appartient au faisceau défini par H et par le cercle γ réduit au point F; H et F sont les deux cercles points de ce faisceau, donc sont deux points inverses par rapport à Γ et le rayon R de celui-ci est donné par :

$$R^2 = \overline{\Omega H} \cdot \overline{\Omega F} = \overline{\Omega F}^2 \cdot \frac{O d_0}{O F} = \overline{\Omega F}^2 \cdot \frac{\overline{O s}^2}{\overline{O F}^2} = \frac{a^2}{c^2} \cdot \overline{\Omega F}^2 .$$

Ainsi, *les cercles focaux considérés sont vus du foyer sous un angle constant, égal au supplément de l'angle des asymptotes.* Cette seconde forme, qui découle tout de suite des formules (19), permettrait d'obtenir autrement l'énoncé de M. Mirabel.

9. — PROPRIÉTÉS DIVERSES.

Il est clair que des énoncés comme ceux du numéro précédent permettent de construire des problèmes intéressants; on a vu aussi qu'en étudiant les cercles focaux on rencontrait de nouvelles démonstrations des propriétés classiques. Il resterait à indiquer des généralisations des propriétés des foyers aux cercles focaux assez simples pour qu'elles puissent servir à mieux faire comprendre ces propriétés et leurs démonstrations; il me semble que, si l'on veut rester vraiment élémentaire, le choix est bien plus limité.