

# 1. Donnée du problème

Objekttyp: **Chapter**

Zeitschrift: **L'Enseignement Mathématique**

Band (Jahr): **14 (1968)**

Heft 1: **L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE**

PDF erstellt am: **12.07.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

# CLASSES DE CHERN D'UN ESPACE HOMOGENÈNE PRESQUE COMPLEXE

par S. MAUMARY \*

## 1. DONNÉE DU PROBLÈME

Soit  $G$  un groupe de Lie compact réel,  $U$  un sous-groupe fermé, et  $G/U$  l'espace des classes à droite  $gU$ ,  $g \in G$ . Ce dernier est une variété différentiable réelle compacte, dont on désignera l'espace tangent au point  $0 = U \in G/U$  par  $(G/U)_0$ . Considérons la représentation isotrope  $\iota(u) = du(0) \in \text{Aut}_{\mathbf{R}}(G/U)_0$ ,  $u \in U$  étant interprété comme translation à gauche de  $G/U$ . Cette représentation détermine le fibré tangent  $\xi$  à  $G/U$ : l'application  $G \times (G/U)_0 \rightarrow E(\xi)$ , donnée par  $(g, v) \mapsto dg(v)$ , en interprétant  $g \in G$  comme translation à gauche de  $G/U$ , devient un homéomorphisme si l'on identifie  $(gu, v)$  avec  $(g, \iota(u)v)$ .

Supposons que  $\xi$  soit muni d'une structure complexe  $J$ , invariante par  $G$ . Autrement dit,  $J$  est un  $\mathbf{R}$ -automorphisme de  $\xi$ , tel que  $J^2 = -\text{identité}$  et  $J \circ dg = dg \circ J$ , en interprétant  $g \in G$  comme translation à gauche de  $G/U$ . Cette dernière égalité montre que  $J$  est déterminée par sa restriction à la fibre  $(G/U)_0$  et que celle-ci est invariante par  $\iota(u)$ ,  $u \in U$ . On écrira  $\xi^J$  le fibré  $\xi$  muni de la structure complexe  $J$ . La représentation réelle  $\iota$  se factorise alors canoniquement par une représentation complexe  $\iota^J : U \rightarrow \text{Aut}_{\mathbf{C}}(G/U)_0^J$ , qui détermine  $\xi^J$  comme précédemment.

Prenons un tore  $T \subset U$ , et soit  $q : G/T \rightarrow G/U$  l'application canonique  $gT \mapsto gU$ . La restriction  $\iota|_T$  détermine  $q^*\xi$ : l'application  $G \times (G/U)_0 \rightarrow E(q^*\xi)$ , donnée par  $(g, v) \mapsto (gT, dg(v))$ , devient un homéomorphisme si l'on identifie  $(gt, v)$  avec  $(g, \iota(t)v)$ ,  $\forall t \in T$ . Maintenant,  $\iota^J|_T$  est somme directe de représentations complexes  $\phi_{\alpha}^J$  de rang 1, donc  $q^*\xi^J$  est somme directe de fibrés vectoriels complexes  $\xi_{\alpha}^J$  de rang 1, déterminé par  $\phi_{\alpha}^J$ . La classe totale de Chern  $c(\xi^J) \in H^*(G/U; \mathbf{Z})$  vérifie donc

$$q^*(c(\xi^J)) = c(q^*\xi^J) = \prod_{\alpha} c(\xi_{\alpha}^J) = \prod_{\alpha} (1 + \chi(\xi_{\alpha}^J)) \in H^*(G/T; \mathbf{R}).$$

\*) Conférence donnée à la réunion des mathématiciens suisses aux Plans-sur-Bex mars 1968.

Comment la classe d'Euler  $\chi(\xi_\alpha^J)$  est-elle déterminée par  $\phi_\alpha^J$  ? Si  $T$  est un tore maximal dans  $G$ , on pourra donner une réponse complète.

En ce qui concerne les classes caractéristiques, on suppose seulement que l'on connaît, pour tout fibré vectoriel réel orienté, sa classe d'Euler, sa suite exacte de Gysin et l'existence d'une application classifiante.

*Exemple :*

Si  $G = U_{n+1}$  (groupe unitaire à  $n+1$  variables), et

$$U = \left( \begin{array}{c|c} U_1 & 0 \\ \hline 0 & U_n \end{array} \right),$$

l'application  $G/U \rightarrow PC^n$  induite par  $g \mapsto g(1, 0, \dots, 0)$ ,  $g \in G$ , est un difféomorphisme. Mais la variété  $PC^n$  admet une structure complexe invariante par  $G$ , donnée au voisinage de  $(1:0:\dots:0)$  par la carte  $(1:z_2:\dots:z_{n+1}) \mapsto (z_2, \dots, z_{n+1})$ . Soit  $J$  la structure complexe invariante induite sur le fibré tangent réel  $\xi$  à  $PC^n$ . Alors  $\xi^J$  est le fibré tangent complexe.

Soit

$$T = \left( \begin{array}{ccc} U_1 & & 0 \\ & U_1 \cdots & \\ 0 & & U_1 \end{array} \right) = U_1 \times \dots \times U_1$$

le tore dans  $U$ , qui est d'ailleurs maximal dans  $G$ . Par définition,  $\iota^J(\exp ix_1, \dots, \exp ix_{n+1})$ ,  $x_\alpha \in \mathbf{R}$ , est la différentielle complexe de la translation

$$(1:z_2:\dots:z_{n+1}) \mapsto (\exp ix_1:z_2 \exp ix_2:\dots:z_{n+1} \exp ix_{n+1}) = \\ (1:z_2 \exp i(x_2-x_1):\dots:z_{n+1} \exp i(x_{n+1}-x_1))$$

au point  $(1:0:\dots:0)$ . Dans la carte ci-dessus, on a donc

$$\iota^J(\exp ix_1, \dots, \exp ix_{n+1})(z_\alpha) = z_\alpha \exp i(x_\alpha - x_1), \quad \alpha > 1.$$

Donc

$$\phi_\alpha^J(\exp ix_1, \dots, \exp ix_{n+1})(z_\alpha) = z_\alpha \exp i(x_\alpha - x_1).$$

## 2. EXTENSION DES FIBRÉS PRINCIPAUX

Etant donné un groupe de Lie compact réel  $G$ , un  $G$ -fibré principal  $P$  est défini par un espace  $E(P)$  muni d'une action libre et continue de  $G$ , à droite, et par une projection  $\pi : E(P) \rightarrow B(P)$  sur un espace de base compact  $B(P)$ , telle que  $\pi(x) = \pi(y) \Leftrightarrow x \in yG$ . Un morphisme de  $G$ -fibrés prin-