

**Zeitschrift:** L'Enseignement Mathématique  
**Herausgeber:** Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique  
**Band:** 18 (1972)  
**Heft:** 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

**Artikel:** TOPOLOGIES FAIBLES ET TOPOLOGIES A GÉNÉRATION COMPACTE  
**Autor:** Frölicher, A. / Roulin, M.  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-45371>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 14.01.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# TOPOLOGIES FAIBLES ET TOPOLOGIES A GÉNÉRATION COMPACTE

par A. FRÖLICHER et M. ROULIN

Ayant d'excellentes propriétés, la catégorie des espaces à génération compacte devient de plus en plus importante en topologie et en analyse fonctionnelle: cf. [1], [2], [3]. Comme il y a encore peu d'exemples convenables d'espaces topologiques séparés qui n'appartiennent pas à cette catégorie, il nous a paru judicieux d'en donner un exemple simple et naturel.

Rappelons qu'un espace topologique séparé  $X$  est à génération compacte si et seulement si toute application  $f : X \rightarrow Y$  dont la restriction à tout compact  $K$  de  $X$  est continue, est elle-même continue.

*Proposition 1.* La topologie faible d'un espace de Hilbert séparable  $H$  de dimension infinie n'est pas à génération compacte.

Dénotons par  $H_f$  l'espace vectoriel sous-jacent de  $H$ , muni de la topologie faible c'est-à-dire de la topologie induite par toutes les fonctions de la forme  $x \mapsto \langle x, a \rangle$  où  $a \in H$ .  $H_f$  est un espace localement convexe séparé. Les ensembles de la forme

$$B_{a_1, \dots, a_n}^\varepsilon = \{x \in H; |\langle x, a_i \rangle| < \varepsilon \text{ pour } i = 1, \dots, n\},$$

où  $\varepsilon > 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$  et  $a_1, \dots, a_n \in H$ , forment une base du filtre des voisinages de zéro dans  $H_f$ .

Pour démontrer la Proposition, nous utilisons les résultats suivants:

- (1) Les bornés de  $H$  et de  $H_f$  sont les mêmes.
- (2) Une application linéaire  $A : H_f \rightarrow H$  est continue si et seulement si  $A$  est dégénérée, ce qui signifie que  $\text{Ker } A$  est de codimension finie.
- (3) La restriction de la topologie faible à un sous-ensemble borné  $B$  de  $H$  est métrisable.

La partie intéressante de (1) est une forme du théorème de Banach-Steinhaus: tout borné de  $H_f$  est un borné de  $H$ . La réciproque ne sera pas utilisée et est triviale, car l'application  $id_H : H \rightarrow H_f$  est continue.

Du résultat (2) nous utilisons aussi la partie la plus intéressante qui dit que  $A : H_f \rightarrow H$  continue implique  $A$  dégénérée. En effet, de la conti-

nuité de  $A$  résulte l'existence d'un voisinage  $U = B_{a_1, \dots, a_n}^\varepsilon$  de zéro dans  $H_f$  tel que  $A(U) \subset B_1$  où  $B_1 = \{x \in H; \|x\| < 1\}$ . Alors si  $x \in H$  satisfait  $x \perp a_i$  pour  $i = 1, \dots, n$  on déduit que  $\lambda x \in U$  pour tout  $\lambda \in \mathbf{R}$ , donc  $\lambda \cdot A(x) \in B_1$  pour tout  $\lambda \in \mathbf{R}$ , et cela n'est possible que si  $A(x) = 0$  c'est-à-dire si  $x \in \text{Ker } A$ . La codimension de  $\text{Ker } A$  est donc  $\leq n$ .

Pour démontrer (3) on peut, après avoir choisi une base  $\{e_i\}_{i \in \mathbf{N}}$  de  $H$ , introduire la forme bilinéaire  $b$  suivante:

$$b(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2 \langle x, e_n \rangle \cdot \langle y, e_n \rangle.$$

$b$  étant évidemment symétrique et définie positive, on obtient sur  $H$  à part la norme associée au produit scalaire donné une autre norme, celle associée à  $b$ , et par suite une certaine métrique. On vérifie par quelques estimations que pour tout borné  $B$  de  $H$ , la topologie faible sur  $B$  coïncide avec la topologie induite par cette métrique. Démontrons maintenant la Proposition 1. Le résultat (2) montre qu'on peut choisir facilement un opérateur compact  $A$  sur  $H$  tel que  $A : H_f \rightarrow H$  n'est pas continu. Soit  $K$  un sous-ensemble compact de  $H_f$ . Un compact d'un espace vectoriel topologique est toujours borné.  $K$  est donc borné dans  $H_f$  est d'après (1) aussi borné dans  $H$ . Selon (3),  $K$  est donc métrisable. Or comme l'image d'une suite faiblement convergente par l'opérateur compact  $A$  est une suite convergente on a que la restriction  $A|_K : K \rightarrow H$  est continue. Il en résulte que  $H_f$  n'est pas à génération compacte.

*Proposition 2.* L'espace vectoriel à génération compacte associé à  $H_f$  est un espace vectoriel topologique.

Le foncteur d'inclusion de la catégorie des espaces à génération compacte dans celle des espaces séparés possède un adjoint que nous dénotons selon [1] par  $k$ . Si  $E$  est un espace vectoriel topologique, la continuité de l'addition  $E \times E \xrightarrow{+} E$  implique la continuité de  $k(E \times E) \xrightarrow{+} kE$ . Or  $k(E \times E) = kE \pi kE$ , où «  $\pi$  » dénote le produit de la catégorie des espaces à génération compacte. Puisque la topologie de  $kE \pi kE$  est en général plus fine que la topologie produit, c'est-à-dire celle de  $kE \times kE$ , il n'est pas vrai en général que  $kE \times kE \xrightarrow{+} kE$  est continue. En effet, dans [3], U. Seip donne un exemple d'un espace vectoriel  $F$ , muni d'une topologie à génération compacte, dont seulement  $F \pi F \xrightarrow{+} F$ , mais pas  $F \times F \xrightarrow{+} F$  est continue.

La réponse à la question non triviale de savoir si  $kH_f$  est un espace vectoriel topologique est donnée par un des résultats les plus profonds

de la théorie des espaces vectoriels topologiques, le théorème de Banach-Dieudonné. D'après ce théorème il résulte que la topologie de  $kH_f$  est celle de la convergence uniforme des produits scalaires  $x \mapsto \langle x, a \rangle$  sur les compacts de  $H$ .

#### RÉFÉRENCES

- [1] STEENROD, N. A convenient category of topological spaces. *Mich. J.* 14 (1967), pp. 133-152.
- [2] GABRIEL, P. and M. ZISMAN. Calculus of fractions and homotopy theory. *Ergeb. der Math.* Bd. 35; Springer Verlag 1967.
- [3] SEIP, U. *Kompakt erzeugte Vektorräume und Analysis*. Lecture Notes in Mathematics, Vol. 273, Springer Verlag 1972.

(Reçu le 1<sup>er</sup> février 1972)

A. Frölicher et M. Roulin  
Institut de Mathématiques  
Université de Genève  
CH — 1211 Genève 24

**Vide-leer-empty**