

Objektyp: **Abstract**

Zeitschrift: **L'Enseignement Mathématique**

Band (Jahr): **38 (1992)**

Heft 1-2: **L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE**

PDF erstellt am: **15.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

<http://www.e-periodica.ch>

THE MEAN SQUARE OF THE RIEMANN ZETA-FUNCTION
ON THE LINE $\sigma = 1$

by R. BALASUBRAMANIAN, A. IVIĆ and K. RAMACHANDRA

*To the memory
of Professor R. Sitaramachandrarao
1.4.1948-9.8.1990*

ABSTRACT. Let $R(T) := \int_1^T |\zeta(1+it)|^2 dt - \zeta(2)T + \pi \log T$. We prove upper bounds for $R(T)$, $\int_1^T R(t)dt$ and $\int_1^T R^2(t)dt$.

One of the fundamental problems in the theory of the Riemann zeta-function is the evaluation of power moments, and in particular the evaluation of

$$(1) \quad \int_1^T |\zeta(\sigma + it)|^2 dt .$$

In view of the functional equation $\zeta(s) = \chi(s)\zeta(1-s)$, where

$$\chi(s) = 2^s \pi^{s-1} \sin\left(\frac{\pi s}{2}\right) \Gamma(1-s) = \left(\frac{2\pi}{t}\right)^{\sigma+it-1/2} e^{i(t+\pi/4)} \left(1 + O\left(\frac{1}{t}\right)\right)$$

for $s = \sigma + it, t \geq t_0 > 0$, it transpires that the relevant range for σ in (1) is $1/2 \leq \sigma \leq 1$. A considerable amount of literature is devoted to the most important case $\sigma = 1/2$ (see e.g. Ch. 15 of [3] and [4] for a comprehensive account). For $1/2 < \sigma < 1$ fixed one has (see (8.112) of [3])

$$(2) \quad \int_1^T |\zeta(\sigma + it)|^2 dt = \zeta(2\sigma)T + O(T^{2-2\sigma}) .$$