

## 3.5 COHOMOLOGIE ET ACTIONS AFFINES

Objekttyp: **Chapter**

Zeitschrift: **L'Enseignement Mathématique**

Band (Jahr): **47 (2001)**

Heft 3-4: **L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE**

PDF erstellt am: **14.09.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

pour la topologie de la convergence compacte, de sommes de fonctions de type positif associées à des représentations de  $\mathcal{S}$ . Avec ces définitions, une suite (généralisée)  $\pi_n$  de représentations unitaires de  $G$  converge vers  $\pi$  si et seulement si, pour toute sous-suite infinie  $\pi_{n'}$  de  $\pi_n$ ,  $\pi$  est faiblement contenue dans  $\{\pi_{n'}\}$ .

Pour les représentations irréductibles, la topologie ainsi induite sur  $\widehat{G}$  n'est autre que la topologie quotient définie par l'application surjective

$$P(G) \longrightarrow \widehat{G}: \varphi \longmapsto \pi_\varphi$$

qui associe à un état pur la classe de la représentation GNS correspondante,  $P(G)$  étant muni d'une quelconque des topologies mentionnées au §3.2. De plus, si  $\pi$  est une représentation irréductible et  $\mathcal{S}$  est un sous-ensemble de  $\widehat{G}$ , alors  $\pi$  est faiblement contenue dans  $\mathcal{S}$  si et seulement si  $\pi$  est dans l'adhérence de  $\mathcal{S}$  pour la topologie de Fell.

### 3.5 COHOMOLOGIE ET ACTIONS AFFINES

Une *action par isométries affines* du groupe  $G$  sur un espace de Hilbert affine  $\mathcal{H}$  est un morphisme  $\alpha$  de  $G$  dans le groupe  $\mathcal{I}so(\mathcal{H})$  des isométries affines de  $\mathcal{H}$  tel que l'application

$$G \times \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{H}: (g, \xi) \longmapsto \alpha(g)\xi$$

soit continue. Par le choix d'une origine, on identifie un espace de Hilbert affine  $\mathcal{H}$  à l'espace de Hilbert de ses translations. Si  $\alpha$  est une action par isométries affines alors, pour tout  $g$  dans  $G$  et tout élément  $\xi$  de  $\mathcal{H}$ , on peut écrire

$$\alpha(g)\xi = \pi(g)\xi + b(g)$$

où  $\pi(g)$  est un opérateur linéaire unitaire et  $b(g) \in \mathcal{H}$ . En imposant la continuité et la condition de morphisme pour  $\alpha$ , on trouve d'une part que  $\pi$  est une représentation unitaire de  $G$  sur  $\mathcal{H}$ , appelée partie linéaire de  $\alpha$ , et d'autre part que  $b$  est une application continue de  $G$  dans  $\mathcal{H}$  qui satisfait la condition de cocycle

$$b(xy) = b(x) + \pi(x)b(y) \quad \text{pour tous } x, y \in G.$$

Réciproquement, la donnée d'une représentation unitaire  $\pi$  de  $G$  sur  $\mathcal{H}$  et d'une application continue  $b$  de  $G$  dans  $\mathcal{H}$  vérifiant la condition de cocycle par rapport à  $\pi$  définit une action par isométries affines  $\alpha$  de  $G$  sur  $\mathcal{H}$ , par la formule  $\alpha(g)\xi = \pi(g)\xi + b(g)$ .

Pour  $\alpha$ ,  $\pi$  et  $\beta$  comme ci-dessus, les conditions suivantes sont équivalentes (voir [HaVa], chapitre 4, lemme 3):

- (i)  $\alpha$  possède un point fixe;
- (ii)  $\alpha$  possède une orbite bornée;
- (iii) toute orbite de  $\alpha$  est bornée;
- (iv) le cocycle  $b$  associé à  $\alpha$  est borné;
- (v) le cocycle  $b$  associé à  $\alpha$  est un cobord.

### 3.6 FONCTIONS CONDITIONNELLEMENT DE TYPE POSITIF

Si  $b: G \rightarrow \mathcal{H}$  est un cocycle continu pour la représentation  $\pi$  alors la fonction  $\psi$  définie par

$$\psi(g) = -\|b(g)\|^2 \quad \text{pour tout } g \in G,$$

est *conditionnellement de type positif*: pour tous  $g_1, \dots, g_n \in G$ , pour tous  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbf{R}$  tels que  $\lambda_1 + \dots + \lambda_n = 0$ , on a

$$\sum_{i,j=1}^n \lambda_j \lambda_i \psi(g_j^{-1} g_i) \geq 0.$$

La fonction  $\psi$  est normalisée ( $\psi(e) = 0$ ) et symétrique ( $\psi(g) = \psi(g^{-1})$ ). Réciproquement, à une telle fonction continue  $\psi$ , on associe le triple GNS  $(\mathcal{H}_\psi, \pi_\psi, b_\psi)$  où  $\pi_\psi$  est une représentation orthogonale de  $G$  dans l'espace de Hilbert réel  $\mathcal{H}_\psi$  et  $b_\psi$  est un cocycle à coefficients dans  $\mathcal{H}_\psi$  tel que, d'une part, le sous-espace engendré par  $b_\psi(G)$  est dense dans  $\mathcal{H}_\psi$ , et d'autre part, pour tout  $g \in G$ , on a

$$\psi(g) = -\frac{1}{2} \|b_\psi(g)\|^2.$$

Pour rappel, si  $V$  désigne l'espace vectoriel des fonctions  $f: \cdot G \rightarrow \mathbf{R}$  de support fini et telles que  $\sum_{x \in G} f(x) = 0$  alors  $\mathcal{H}_\psi$  est l'espace de Hilbert réel obtenu en séparant et complétant  $V$  pour la forme bilinéaire

$$\langle f | h \rangle = \sum_{x,y \in G} f(x) h(y) \psi(y^{-1}x)$$

et  $b_\psi$  applique  $g \in G$  sur la classe dans  $\mathcal{H}_\psi$  de la différence des fonctions caractéristique de  $g$  et  $e$ . La représentation  $\pi_\psi$  est déduite de l'action par multiplication à gauche de  $G$  sur  $V$ .

Soit  $\pi$  une représentation,  $b$  un 1-cocycle à coefficients dans  $\pi$  et  $\psi = -\|b\|^2$  la fonction conditionnellement de type positif correspondante. On