

# Zusammenfassungen der letzten eingegangenen Arbeiten = Résumés des derniers articles reçus

Objekttyp: **Group**

Zeitschrift: **Helvetica Physica Acta**

Band (Jahr): **49 (1976)**

Heft 1

PDF erstellt am: **12.07.2024**

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

**HELVETICA PHYSICA ACTA**  
**Zusammenfassungen der letzten eingegangenen Arbeiten**  
**Résumés des derniers articles reçus**

---

**Angular Momentum Projection in the Two-Center Model by Projection of Hilbert Spaces**

by T. H. SELIGMAN and W. ZAHN

Institut für Theoretische Physik der Universität zu Köln, Köln, Germany

(26. IX. 75)

*Abstract.* The theory of radial canonical transforms is used as a tool for angular momentum projection in quantum-mechanical problems with central interactions. The method is developed for the case where an  $n$ -body system is described by two fragments of internal angular momentum zero with oscillator wave functions of arbitrary width, with particular attention to the two-center model. By way of example the applicability of the effective Brink-Boeker nucleon-nucleon interaction for functions with independently varied width parameters is tested. A negative answer results.

**Study of Higher Excited States in  $^{20}\text{Ne}$  by Inelastic Scattering of 24.5 MeV Protons**

by R. DE SWINIARSKI, J. SHERMAN, D. L. HENDRIE, C. GLASHAUSSER and A. D. BACHER

Lawrence Berkeley Laboratory, University of California, Berkeley, California 94720 U.S.A.

(10. X. 75)

*Abstract.* The angular distributions of the differential cross-sections for the inelastic scattering of 24.5 MeV protons were measured for excited states up to 9.50 MeV in  $^{20}\text{Ne}$ . Prior to the experiment, an excitation function was measured for incident proton energies between 23 and 26 MeV to select a resonance-free region. Twenty cross-sections have been measured, generally with high precision and low statistical errors. Large variations have been found in the shapes of angular distributions for states having the same spins and parities. Some of the excited states were analyzed in the framework of the collective model using either vibrational or rotational model wave functions. Very good agreement with the cross-sections of the  $K = \text{O}^+$  ground state band have been obtained using  $\beta_2$ ,  $\beta_4$  and  $\beta_6$  multipole deformations of +0.47, +0.28 and -0.10, respectively. There is definite evidence for a new state in  $^{20}\text{Ne}$  at 9.31 MeV which we tentatively assign as a  $J^\pi = 4^+$  state.

**Local Gauge Models Predicting their own Superselection Rules**

by JEAN-LOUIS BONNARD

Institute de Physique Théorique, Université de Lausanne, Lausanne, Switzerland

and R. F. STREATER

ZIF, Universität Bielefeld, Bielefeld, Germany

(16. X. 75)

*Abstract.* By considering local SO(2) or U(1) transformations of a two-component Boson field in two-dimensional space-time, we construct certain non-vacuum representations (now called solitons) of the canonical commutation relations. Superselection rules operate between the spaces of these representations.