

Tabellen

Objektyp: **Appendix**

Zeitschrift: **Insecta Helvetica. Fauna**

Band (Jahr): **7 (1985)**

PDF erstellt am: **08.08.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Tabelle 1 - Körpermasse (in mm) und Indices; angegeben sind, soweit möglich, Durchschnitte aus zehn Werten. Bei den mit Stern (*) markierten Arten beziehen sich die Zahlen auf eine einzige Fliege.

Art	Körper- Länge	Flügel- Länge	Costal- Index	Medial- Index	Cubital- Index
<i>A. formosus</i>	1,90	2,10	5,28	1,59	0,97
<i>A. albilabris</i>	3,12	3,13	2,37	2,54	1,14
<i>A. alboguttata</i>	2,60	2,80	2,56	2,60	0,68
<i>A. basdeni</i>	2,71	2,51	1,93	2,37	0,78
<i>A. flavopruinosa</i> *	2,81	2,27	2,34	2,52	0,63
<i>A. rufescens</i>	3,35	3,23	2,19	2,44	0,84
<i>A. semivirgo</i>	3,43	3,14	2,74	3,18	1,06
<i>A. variegata</i>	3,04	2,97	2,46	3,05	1,04
<i>C. exiguus</i> *	2,00	2,00	3,30	2,60	0,70
<i>C. indagator</i>	3,15	2,57	3,14	2,98	0,71
<i>C. caudatula</i>	2,57	2,54	1,98	2,36	0,40
<i>C. costata</i>	2,09	2,29	2,04	2,72	0,43
<i>C. distincta</i>	2,81	2,61	2,49	2,72	0,41
<i>C. fuscimana</i>	2,12	2,53	2,32	2,85	0,40
<i>D. busckii</i>	2,01	2,04	2,99	1,89	0,61
<i>D. funebris</i>	2,73	3,00	3,35	1,31	1,09
<i>D. histrio</i>	3,05	3,28	3,93	1,46	0,94
<i>D. immigrans</i>	2,71	2,93	4,27	1,25	1,00
<i>D. cameraria</i>	2,33	2,53	3,48	1,44	0,66
<i>D. unimaculata</i>	3,08	3,73	3,70	1,40	0,83
<i>D. picta</i>	2,46	2,54	3,24	1,34	1,06
<i>D. kuntzei</i>	2,58	2,85	3,39	1,50	0,94
<i>D. limbata</i>	2,31	2,87	3,31	1,63	0,95
<i>D. phalerata</i>	2,42	2,85	3,80	1,53	0,78
<i>D. transversa</i>	2,06	2,57	3,19	1,82	0,96
<i>D. buzzatii</i>	2,74	2,23	2,79	1,71	0,76
<i>D. hydei</i>	3,16	2,71	3,29	1,69	0,91
<i>D. repleta</i>	2,91	2,47	2,97	1,64	0,78
<i>D. testacea</i>	2,05	2,38	3,13	1,59	0,70
<i>D. littoralis</i>	2,49	3,11	3,27	1,47	0,91
<i>D. confusa</i>	2,97	3,36	3,44	1,38	0,93
<i>D. oldenbergi</i>	2,29	2,99	2,38	1,78	0,59

Art	Körper- Länge	Flügel- Länge	Costal- Index	Medial- Index	Cubital- Index
<i>D. andalusiaca</i>	2,16	2,35	3,23	1,70	0,54
<i>D. fenestrarum</i>	1,98	2,30	3,34	1,62	0,59
<i>D. nigricolor</i> *	1,87	2,33	2,94	1,74	0,62
<i>D. deflexa</i>	2,14	2,16	2,45	1,98	0,57
<i>D. rufifrons</i>	2,04	1,95	2,06	2,45	0,46
<i>D. melanogaster</i>	2,02	2,15	2,37	2,31	0,51
<i>D. simulans</i>	1,78	1,85	2,47	2,63	0,44
<i>D. alpina</i>	2,22	2,65	2,45	2,07	0,53
<i>D. ambigua</i>	2,34	2,53	2,59	1,61	0,73
<i>D. bifasciata</i>	2,09	2,44	2,99	2,37	0,57
<i>D. helvetica</i>	1,98	2,02	2,39	2,14	0,53
<i>D. obscura</i>	2,22	2,63	2,90	1,92	0,62
<i>D. subobscura</i>	2,20	2,35	2,71	2,04	0,61
<i>D. subsilvestris</i>	2,16	2,37	2,75	2,11	0,60
<i>D. tristis</i>	2,18	2,41	2,55	1,83	0,64
<i>D. nigrosparsa</i>	2,72	3,07	3,96	1,60	1,09
<i>G. distigma</i>	3,29	3,30	2,65	4,36	0,32
<i>L. maculata</i>	3,82	3,43	3,25	2,04	0,84
<i>L. quinquemaculata</i>	3,72	4,09	2,61	1,95	1,05
<i>M. congesta</i>	1,91	2,04	1,49	4,49	0,20
<i>M. poecilogastra</i> *	1,94	2,13	1,44	2,01	0,75
<i>S. flava</i>	2,31	2,60	3,25	1,39	0,71
<i>S. graminum</i>	2,09	2,26	3,43	1,44	0,64
<i>S. pallida</i>	1,92	2,38	3,45	1,56	0,68
<i>S. baechlii</i>	1,94	2,23	2,07	1,87	0,76
<i>S. coleoprata</i>	2,50	2,57	2,19	1,90	0,72
<i>S. furta</i>	2,65	2,26	2,06	2,02	0,84
<i>S. longifibula</i>	2,74	2,72	2,13	1,66	0,71
<i>S. nigrithorax</i>	2,31	2,19	1,92	1,91	0,68
<i>S. similis</i>	2,68	2,70	2,08	1,80	0,69

Tabelle 2 - Anzahl Orte in der Schweiz, an denen die Arten festgestellt wurden, und Anzahl Fliegen je Art im Total der Fänge. Die Werte beruhen auf Fängen an 65 Orten und auf einem Total von 258 000 Drosophiliden.

Art	Anzahl Orte	Anzahl Fliegen
<i>D. subobscura</i>	65	89167
<i>D. obscura</i>	62	37885
<i>D. testacea</i>	58	23444
<i>D. phalerata</i>	56	20908
<i>D. helvetica</i>	36	19013
<i>D. immigrans</i>	29	16187
<i>D. melanogaster</i>	40	14117
<i>D. kuntzei</i>	39	11503
<i>D. subsilvestris</i>	35	4140
<i>D. busckii</i>	16	3441
<i>D. histrio</i>	33	2359
<i>D. simulans</i>	14	2091
<i>D. ambigua</i>	41	1756
<i>D. alpina</i>	29	1637
<i>D. hydei</i>	26	1464
<i>S. graminum</i>	27	1283
<i>D. deflexa</i>	25	1083
<i>D. limbata</i>	25	1039
<i>D. transversa</i>	46	961
<i>D. funebris</i>	42	948
<i>S. pallida</i>	34	780
<i>D. nigrosparsa</i>	16	509
<i>D. bifasciata</i>	17	461
<i>D. tristis</i>	33	423
<i>D. littoralis</i>	24	368
<i>D. cameraria</i>	20	343
<i>A. semivirgo</i>	6	175
<i>L. maculata</i>	14	160
<i>D. confusa</i>	12	158
<i>D. unimaculata</i>	9	88
<i>D. rufifrons</i>	5	38
<i>A. alboguttata</i>	6	32
<i>D. repleta</i>	8	22
<i>A. basdeni</i>	7	19

