

Systematische Übersicht und Verbreitung

Objektyp: **Chapter**

Zeitschrift: **Insecta Helvetica. Fauna**

Band (Jahr): **11 (1995)**

PDF erstellt am: **12.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

SYSTEMATISCHE ÜBERSICHT UND VERBREITUNG

In der nachstehenden Liste sind alle Arten aufgenommen, die entweder schon in der Schweiz nachgewiesen wurden oder mit denen man in der Schweiz rechnen kann, weil sie aus den benachbarten Ländern bekannt sind. Die Verbreitungsangaben beruhen entweder auf dem Katalog der paläarktischen Dipteren (LEHR, 1988) oder auf einer anderen modernen Quelle. A = Österreich; CH = Schweiz; D = Deutschland; F = Frankreich; I = Italien.

Laphriinae

Laphriini

Choerades Walker, 1851

<i>dioctriaeformis</i> (Meigen, 1820)	A, CH, F, I
<i>fimbriata</i> (Meigen, 1820)	A, CH, D, F, I
<i>fuliginosa</i> (Panzer, 1798)	A, CH, D, F
<i>fulva</i> (Meigen, 1804)	A, CH, D, F, I
<i>gilva</i> (Linnaeus, 1758)	A, CH, D, F, I
<i>ignea</i> (Meigen, 1820)	A, CH, D, F, I
<i>marginata</i> (Linnaeus, 1758)	A, CH, D, F, I
<i>rufipes</i> (Fallén, 1814)	A, CH, D, F, I

Laphria Meigen, 1803

<i>aurea</i> (Fabricius, 1794)	A, F, I
<i>ephippium</i> (Fabricius, 1781)	A, CH, D, F, I
<i>flava</i> (Linnaeus, 1761)	A, CH, D, F, I
<i>gibbosa</i> (Linnaeus, 1758)	A, CH, D, F, I
<i>tibialis</i> Meigen, 1820	A
<i>vulpina</i> Meigen, 1820	A, CH, D, I

Andrenosomatini

Andrenosoma Rondani, 1856

<i>albibarbe</i> (Meigen, 1820)	A, CH, D, F, I
<i>atrum</i> (Linnaeus, 1758)	A, CH, D, F, I

Pogonosoma Rondani, 1856

<i>maroccanum</i> (Fabricius, 1794)	A, D, F, I
<i>minus</i> Loew, 1869	F, I

Stenopogoninae

Dioctriini

Dioctria Meigen, 1803

<i>atricapilla</i> Meigen, 1804	A, CH, D, F, I
<i>baumhaueri</i> Meigen, 1820	A, CH, D, F
<i>bicincta</i> Meigen, 1820	A, CH, D, F
<i>calceata</i> Meigen, 1820	A, F, I
<i>conspicua</i> Becker, 1923	
<i>cothurnata</i> Meigen, 1820	A, CH, D, F
<i>engeli</i> Noskiewicz, 1953	
<i>flavipennis</i> Meigen, 1820	A, D, F
<i>gracilis</i> Meigen, 1820	CH, D, F
<i>harcyniae</i> Loew, 1844	CH, D, F
<i>humeralis</i> Zeller, 1840	CH, D, F
<i>hyalipennis</i> (Fabricius, 1794)	A, CH, D, I
<i>lata</i> Loew, 1853	D, F
<i>lateralis</i> Meigen, 1804	A, CH, D, F
<i>linearis</i> (Fabricius, 1787)	A, CH, D, F, I
<i>liturata</i> Loew, 1873	
<i>longicornis</i> Meigen, 1820	A, D, F
<i>meyeri</i> Nowicki, 1867	

<i>oelandica</i> (Linnaeus, 1758)	A, CH , D, F
<i>rufipes</i> (De Geer, 1776)	A, CH , D, F, I
<i>rufithorax</i> Loew, 1853	F
<i>speculifrons</i> Wiedemann, 1820	
<i>sudetica</i> Duda, 1940	A
<i>Molobratia</i> Hull, 1958	
<i>teutonus</i> (Linnaeus, 1767)	A, CH , D, F, I
Stichopogonini	
<i>Lasiopogon</i> Loew, 1847	
<i>cinctus</i> (Fabricius, 1781)	A, CH , D, F, I
<i>immaculatus</i> Strobl, 1893	CH , D, I
<i>macquarti</i> (Perris, 1852)	F, CH
<i>montanus</i> Schiner, 1862	A, CH , D, F, I
<i>pilosellus</i> Loew, 1847	A
<i>Stichopogon</i> Loew, 1847	
<i>albofasciatus</i> (Meigen, 1820)	A, CH , D, F
<i>elegantulus</i> (Wiedemann, 1820)	A, D, F, I
<i>inaequalis</i> Loew, 1847	A, F, I
<i>scaliger</i> Loew, 1847	F, I
<i>schineri</i> Koch, 1872	CH , D, F, I
Stenopogonini	
<i>Ancylorrhynchus</i> Berthold, 1827	
<i>glaucius</i> (Rossi, 1790)	A, F, I
<i>Cyclosocerus</i> Bezzi, 1927	
<i>platycerus</i> (Villeneuve, 1913)	CH , I
<i>Cyrtopogon</i> Loew, 1847	
<i>culminus</i> Bigot, 1885	CH , F, I
<i>flavimanus</i> Meigen, 1820	A, CH , F, I
<i>fulvicornis</i> (Macquart, 1834)	A, CH , F, I
<i>lateralis</i> (Fallén, 1814)	A, CH , D, F, I
<i>longibarbus</i> Loew, 1857	A, CH , I
<i>maculipennis</i> (Macquart, 1834)	A, CH , D, F, I
<i>meyerduerii</i> Mik, 1864	A, CH , F, I
<i>pyrenaeus</i> Villeneuve, 1913	F
<i>ruficornis</i> (Fabricius, 1794)	A, CH , D, F, I
<i>Habropogon</i> Loew, 1847	
<i>appendiculatus</i> Schiner 1867	F, I
<i>exquisitus</i> (Wiedemann, 1820)	F, I
<i>longiventris</i> Loew, 1847	F
<i>Holopogon</i> Loew, 1847	
<i>brunnipes</i> (Meigen, 1820)	A, F, I
<i>dimidiatus</i> (Meigen, 1820)	A, F, I
<i>fumipennis</i> (Meigen, 1820)	A, CH , D, F, I
<i>nigripennis</i> (Meigen, 1820)	A, CH , D, F, I
<i>priscus</i> (Meigen, 1820)	A, CH , F
<i>venustus</i> (Rossi, 1790)	A, CH , D, F, I
<i>Lithoeciscus</i> Bezzi, 1927	
<i>heydenii</i> (Loew, 1871)	CH
<i>Pycnopogon</i> Loew, 1847	
<i>fasciculatus</i> (Loew, 1847)	F, I
<i>Stenopogon</i> Loew, 1847	
<i>callosus</i> (Pallas, 1818)	D, F
<i>coracinus</i> (Loew, 1847)	F, I
<i>costatus</i> Loew, 1871	F
<i>elongatus</i> (Meigen, 1804)	F
<i>macilentus</i> Loew, 1861	A
<i>sabaudus</i> (Fabricius, 1794)	A, CH , D, F, I
<i>tristis</i> (Meigen, 1820)	

Dasygoninae

Isopogonini

Leptarthrus Stephens, 1829*brevirostris* (Meigen, 1804)A, **CH**, D, F, I*vitripennis* (Meigen, 1820)A, **CH**, D, F

Dasygonini

Dasypogon Meigen, 1803*diadema* (Fabricius, 1781)A, **CH**, D, F, I**Leptogastrinae***Leptogaster* Meigen, 1803*cylindrica* (De Geer, 1776)A, **CH**, D, F, I*guttiventris* Zetterstedt, 1842A, **CH**, D, F*pubicornis* Loew, 1847**CH**, D, F, I*pumila* (Macquart, 1834)**CH**, F*subtilis* Loew, 1847A, **CH**, D, I**Asilinae***Acanthopleura* Engel, 1927*brunnipes* (Fabricius, 1794)

A, F, I

naxia (Macquart, 1838)

A

Antipalus Loew, 1849*similis* Moucha & Hradský, 1966**CH**, I*sinuatus* (Loew, 1854)

A

varipes (Meigen, 1820)A, **CH**, D, F, I*Antiphrisson* Loew, 1849*trifarius* (Loew, 1849)**CH**, D, F, I*Asilus* Linnaeus, 1758*crabroniformis* Linnaeus, 1758A, **CH**, D, F, I*Cerdistus* Loew, 1849*erythrurus* (Meigen, 1820)A, **CH**, F, I*zelleri* Schiner, 1862

A, I

Dysmachus Loew, 1860*basalis* (Loew, 1848)**CH***bifurcus* (Loew, 1848)

A, D, F, I

bimucronatus (Loew, 1854)

A, D, F, I

cochleatus (Loew, 1854)

A, D, F, I

cristatus (Wiedemann, 1820)**CH**, F*fuscipennis* (Meigen, 1820)**CH**, D, F, I*harpax* Villeneuve, 1904**CH**, F*picipes* (Meigen, 1820)A, **CH**, D, F, I*praemorsus* (Loew, 1854)

A, D, F

stylifer (Loew, 1854)A, **CH**, D, F, I*trigonus* (Meigen, 1804)A, **CH**, D, F, I*Echthistus* Loew, 1849*rufinervis* (Meigen, 1820)A, **CH**, D, F*Epitriptus* Loew, 1849*arthriticus* (Zeller, 1840)A, **CH**, D, F, I*cingulatus* (Fabricius, 1781)A, **CH**, D, F*cowini* Hobby, 1946

D, F

inconstans (Wiedemann, 1820)**CH**, F, I*setosulus* (Zeller, 1840)A, **CH**, D, F, I*Erax* Scopoli, 1763*barbatus* Scopoli, 1763 (= *punctatus* Mg.)

D, F

punctipennis (Meigen, 1820)A, **CH**, D, F, I*Eutolmus* Loew, 1848*kiesenwetteri* Loew 1854

F, I

mediocris Becker, 1923

F, I

rufibarbis (Meigen, 1820)A, **CH**, D, F, I

<i>Machimus</i> Loew, 1849	
<i>annulipes</i> (Brullé, 1832)	CH
<i>caliginosus</i> (Meigen, 1820)	A, CH , F, I
<i>chrysitis</i> (Meigen, 1820)	A, CH , D, F, I
<i>cyanopus</i> (Loew, 1849)	A, CH , I
<i>fimbriatus</i> (Meigen, 1804)	A, F, I
<i>gonatistes</i> (Zeller, 1840)	A, D, I
<i>lacinulatus</i> Loew, 1854	A, F, I
<i>rusticus</i> (Meigen, 1820)	A, CH , D, F, I
<i>setibarbus</i> (Loew, 1849)	CH , D, I
<i>Neoitamus</i> Osten-Sacken, 1878	
<i>cothurnatus</i> (Meigen, 1820)	A, CH , D, F, I
<i>cyanurus</i> (Loew, 1849)	A, CH , D, F, I
<i>dasymallus</i> (Gerstaecker, 1861)	
<i>socius</i> (Loew, 1871)	A, CH , D, F
<i>splendidus</i> Oldenberg, 1912	CH , I
<i>Neomochtherus</i> Osten-Sacken, 1878	
<i>aquitanus</i> Tsacas, 1964	CH , F
<i>confusus</i> Tsacas, 1965	CH , F
<i>flavicornis</i> (Ruthe, 1831)	A, CH , D, F, I
<i>flavipes</i> (Meigen, 1820)	A, CH , D, F
<i>pallipes</i> (Meigen, 1820)	A, CH , D, F
<i>schineri</i> (Egger, 1855)	A, D, I
<i>Pamponerus</i> Loew, 1849	
<i>germanicus</i> (Linnaeus, 1758)	A, CH , D, F, I
<i>helveticus</i> (Mik, 1864)	CH
<i>Paritamus</i> Verrall, 1909	
<i>geniculatus</i> (Meigen, 1820)	A, CH , D, F
<i>melanopus</i> (Meigen, 1820) (= <i>alpinus</i> Mg.)	A, CH , F
<i>Philonicus</i> Loew, 1849	
<i>albiceps</i> (Meigen, 1820)	A, CH , D, F, I
<i>Rhadiurgus</i> Loew, 1849	
<i>variabilis</i> (Zetterstedt, 1838)	A, CH , D, F
<i>Stilpnogaster</i> Loew, 1849	
<i>aemula</i> (Meigen, 1820)	A, CH , D, F, I
<i>stabilis</i> (Zeller, 1840)	D, F
<i>Tolmerus</i> Loew, 1849	
<i>atricapillus</i> (Fallén, 1814)	A, CH , D, F, I
<i>atripes</i> Loew 1854	A, CH , D, F, I
<i>poecilogaster</i> (Loew, 1849)	A, CH , F, I
<i>pyragra</i> (Zeller, 1840)	A, CH , D, F
<i>strandii</i> (Duda, 1940)	D