

Altersmythos LXXXIX : Schwindel bei Betagten ist meist Folge von Labyrinthkrankungen

Objektyp: **Group**

Zeitschrift: **Intercura : eine Publikation des Geriatriischen Dienstes, des Stadtärztlichen Dienstes und der Psychiatrisch-Psychologischen Poliklinik der Stadt Zürich**

Band (Jahr): - **(2001-2002)**

Heft 76

PDF erstellt am: **10.08.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

ALTERSMYTHOS LXXXIX

Schwindel bei Betagten ist meist Folge von Labyrinthkrankungen.

Wirklichkeit

Schwindel ist ein geriatrisches Syndrom mit multiplen Teilursachen.

Begründung

- ◆ Die Analyse von 362 nicht dementen ambulanten geriatrischen Patienten in New Haven CT USA ergab unspezifischen (nicht Dreh-) Schwindel bei 21% der 79 ± 7 Jahre alten Personen.
- ◆ Es ergaben sich folgende signifikant mit Schwindel assoziierte Risikofaktoren:

- S.P. Myokardinfarkt	OR 6.6
- Katarakt	OR 5.3
- Gang- oder Gleichgewichtsstörung	OR 3.1
- Depressives Zustandsbild	OR 2.8
- Diabetes	OR 2.5
- Orthostatische Hypotonie	OR 2.0
- 3 oder mehr Medikamente	OR 1.6
- ◆ Unter Schwindel litten:
 - 6% der Pers. mit 1 der obigen 7 Risikofaktoren
 - 12% der Pers. mit 2 der obigen 7 Risikofaktoren
 - 26% der Pers. mit 3 der obigen 7 Risikofaktoren
 - 51% der Pers. mit 4 der obigen 7 Risikofaktoren
 - 0% der Personen mit 0 der obigen Risikofaktoren

AC Kao et al. Validation of Dizziness as a possible geriatric syndrome, JAGS 49: 72-75, 2001