Altersmythos CXV : häufigstes Symptom eines frischen Herzinfarktes ist auch bei Betagten der Retrosternalschmerz

Objekttyp: **Group**

Zeitschrift: **Intercura : eine Publikation des Geriatrischen Dienstes, des Stadtärztlichen Dienstes und der Psychiatrisch-Psychologischen Poliklinik der Stadt Zürich**

Band (Jahr): **- (2002-2003)**

Heft 79

PDF erstellt am: **02.06.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

ALTERSMYTHOS CXV

Häufigstes Symptom eines frischen Herzinfarktes ist auch bei Betagten der Retrosternalschmerz.

Wirklichkeit
Betagte mit frischem Herzinfarkt leiden am häufigsten unter Atemnot.

Begründung
Die Analyse von 125 hospitalisierten betagten Personen, bei denen autoptisch ein frischer Herzinfarkt nachgewiesen wurde (5% aller Autopsien) ergab:

- Nur bei 22% wurde ein Herzinfarkt zu Lebzeiten vermutet. Von diesen zeigten 80% Retrosternalschmerzen und 60% Dyspnoe.
- Bei 70% wurde klinisch **kein** Herzinfarkt vermutet, 60% litten an Dyspnoe, 2% an Retrosternalschmerzen. Bei 20% war das EKG normal.
- Die Verstorbenen zeigten sowohl klinisch wie pathologisch ausgesprochene Polymorbidität.
- Diese Befunde bestätigen die allgemeine geriatrische Regel, dass Betagte oft spezifische, klassische Symptome von Krankheiten nicht zeigen (keine Retrosternalschmerzen), sondern nur unspezifische Beschwerden (Atemnot).

O. Brugnon et al: Diagnostic antimortem de l'infarctus du myocarde chez la personne âgé: corrélation anatomique-clinique du 1985-1999 Forum Med. Suisse 2-Suppl. 8 29 2002