

# **Bernische Botanische Gesellschaft :**

## **Jahresbericht 2002**

Objekttyp: **AssociationNews**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern**

Band (Jahr): **60 (2003)**

PDF erstellt am: **10.08.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

# Bernische Botanische Gesellschaft

## Jahresbericht 2002

### 1. Geschäftliches

Im Vorstand amtierten während des Jahres 2002:

Präsident:	Dr. DANIEL M. MOSER
Kassiererin:	REGINE BLÄNKNER
Sekretärin:	RITA GERBER
Redaktor:	ANDREAS GYGAX
Exkursionsobmann:	ANDREAS PFENNINGER
Exkursionsobmann neu:	BEAT FISCHER
Beisitzer:	Dr. STEFAN EGGENBERG Prof. OTTO HEGG Dr. KONRAD LAUBER Dr. ANDRÉ MICHEL Dr. BEATRICE SENN-IRLET Dr. ANDREAS STAMPFLI
Mitgliederbetreuung:	RITA GERBER
Rechnungsrevisoren:	Dr. PETER KOHLI RUDOLF SCHNEEBERGER

### 2. Vorträge

7. Januar 2002

HANSPETER GROSSNIKLAUS

*Botanik im Natur-, Mensch-, Mitwelt-Lehrplan (Volksschule)*

21. Januar 2002

Prof. Dr. J. SCHNELLER, Zürich

*Alpenpflanzenarten – faszinierende Untersuchungsobjekte für die evolutionsbiologische Forschung*

28. Januar 2002

Prof. Dr. H. ZOLLER, Basel

*Untersuchungen zur Überlebensstrategie des Himmelsherolds, *Eritrichium nanum*. Von der Pollination bis zum multiklonalen Polster.*

11. Februar 2002

Dr. G. WAGNER und Dr. D.M. MOSER, Bern

*Eric Nelsons neuestes Werk über die Gattung Orchis und seine wissenschaftsgeschichtliche Bedeutung*

4. März 2002

Jahresversammlung

RETO DEUTSCHLE, Bern – Kurzvortrag: *Genetische Variabilität von Gentiana prostrata im Alpenraum*

4. November 2002

Dr. ANDRÉ MICHEL, Bern

*Die Flora der Ligurischen Alpen bis zum Mercantourgebiet (Seealpen), 3-D-Projektion*

11. November 2002

Dr. G. KOZŁOWSKI, Freiburg

*Die Flora des Kantons Freiburg: «Gefährdung–Veränderung–Erforschung»*

18. November 2002

Dr. D.M. MOSER, Bern

*Die Flora von Rhodos im Frühjahrsaspekt*

25. November 2002

Dr. E. RUOSS, Luzern

*Biosphärenreservat Entlebuch: «Erhalten, Forschen und Entwickeln»*

### **3. Exkursionen**

1. Exkursion: 1. Juni 2002

*Seeland: Die Renaturierungsflächen im Grossen Moos. Wiederangesiedelte Pflanzenarten in ihrem neuen Habitat*

Leitung: Dr. D.M. MOSER und U. KORMANN

2. Exkursion: 8. Juni 2002

*Aigle/Ollon: Wanderung über die Colline du Plantour und Colline de la Glaivaz*

Leitung: RAYMOND DÉLARZE

3. Exkursion: 15. Juni 2002

*Savièse: Wanderung von Savièse nach Sion über Plateau de Savièse und Lac de Mont d'Orge*

Leitung: PHILIPPE WERNER

4. Exkursion: 3./4. August 2002

*Schweizer Nationalpark*

Leitung: ADRIAN MÖHL, BEATRICE LÜSCHER, IRENE KÜNZLE

5. Exkursion: 10. August 2002

*Churfürsten: Sellamat–Hinterrugg–Chäserrugg*

Leitung: MARTHA GUBLER

6. Exkursion: 17. August 2002

*Axalp–Hinterburgsee: Wanderung vom Dotzweg zum Hinterburgsee–Chruttmettli–Urserli–Windegg–Chüemad und zurück zur Axalp*

Leitung: Prof. em. Dr. OTTO HEGG

#### **4. Mitgliederstand**

346 per 31. Dezember 2002

Im Jahr 2002 wurden 14 Mitglieder neu in die Gesellschaft aufgenommen. 7 Mitglieder traten aus der Gesellschaft aus. An Todesfällen waren zu beklagen: Frau Gret Hess, Herr Berchtold Lauterburg und Frau Theres Schläpfer.

#### **5. Sitzungsberichte**

Die Sitzungsberichte 2001 sind erschienen und wurden den Mitgliedern zusammen mit dem Winterprogramm zugestellt.

#### **6. Exkursionsberichte**

\* = Floristische Besonderheiten

##### **1. Exkursion: 1. Juni 2002**

*Seeland: Die Renaturierungsflächen im Grossen Moos. Wieder angesiedelte Pflanzenarten in ihrem Habitat*

Leitung: Dr. D.M. MOSER und U. KORMANN

Dem Wanderer bleiben die Teiche im Grossen Moos verborgen, bis er daneben steht. Mit Baggern wurden Vertiefungen in der zum Gemüseanbau genutzten Ebene geschaffen, um für bedrohte Pflanzen und Vögel – insbesondere Limikolen – Refugien zu schaffen. Das Niveau der Teiche liegt bis

zu zwei Meter unter dem der umgebenden Äcker, so dass sie aus Distanz kaum zu erkennen sind. Unter der Leitung von Daniel Moser wurden darin in Zusammenarbeit mit dem Botanischen Garten Bern Pflanzen wiederangesiedelt, welche früher im Seeland vorkamen, inzwischen jedoch beinahe oder ganz ausgestorben waren. Einerseits sind es Arten, welche sich auf den Überschwemmungsbereich von Gewässern mit stark wechselnden Wasserständen spezialisiert haben, wie z.B. *Limosella aquatica*, *Baldellia ranunculoides*, *Marsilea quadrifolia*, *Pilularia globulifera*, andererseits eine Reihe von vom Aussterben bedrohten Doldenblütlern, welche Sumpfstandorte benötigen, wie *Apium nodiflorum*, *Apium repens*, *Cicuta virosa*, *Sium latifolium*, *Oenanthe fistulosa*, *O. lachenalii*, *O. aquatica* und diverse andere Raritäten.

Es wird interessant sein, über die nächsten Jahre hinweg zu verfolgen, ob sich die wiederangesiedelten Arten halten können und wie sich das Pflanzengefüge über die Zeit hinweg weiterentwickelt. Ganz ohne Pflegemassnahmen werden die Habitate nicht auskommen, wie sich in den bereits vor mehreren Jahren angelegten Teichen auf Freiburger Seite zeigt, wo sich *Marsilea quadrifolia* erstaunlich gut hält, und *Hottonia palustris* sich richtiggehend breit gemacht hat.

Neben den Aushubarbeiten wurde die Humusdecke eines ehemaligen Ackers abgetragen, um so zwischen den Äckern einen unbewirtschafteten, mageren Standort zu schaffen. Auf der dabei entstandenen Ruderalfläche kam – neben angesäten Ackerunkräutern wie *Agrostemma githago* und *Centaurea cyanus* – interessanterweise auch *Ranunculus sceleratus* in grösseren Mengen auf. Die Samen des Gifthahnenfusses haben offenbar im Unterboden der vormals intensiv bewirtschafteten Ackerfläche mehrere Jahrzehnte überdauert.

*Agrostemma githago*  
*Alisma lanceolatum*  
 \* *Alopecurus geniculatus*  
 \* *Apium nodiflorum*  
 \* *Apium repens*  
 \* *Baldellia ranunculoides*  
*Centaurea cyanus*  
*Centaurea nigrescens*  
 \* *Cicuta virosa*  
*Dianthus superbus*  
 \* *Eleocharis acicularis*  
*Euphorbia virgata*  
*Geranium pratense*  
 \* *Gratiola officinalis*  
 \* *Hottonia palustris*  
 \* *Limosella aquatica*  
 \* *Lysimachia thyrsoiflora*  
 \* *Lythrum hyssopifolia*  
 \* *Marsilea quadrifolia*  
*Medicago minima*  
 \* *Mentha pulegium*  
 \* *Myosurus minimus*  
 \* *Oenanthe aquatica*  
 \* *Oenanthe fistulosa*  
 \* *Pilularia globulifera*

\* *Potentilla supina*  
*Ranunculus sceleratus*  
*Reseda luteola*  
 \* *Sium latifolium*  
*Stachys palustris*  
 \* *Teucrium scordium*  
*Thalictrum flavum*  
 \* *Viola elatior*

Bericht: Willy Müller



*Baldellia ranunculoides*



## 2. Exkursion: 8. Juni 2002

Aigle/Ollon (VD)

Leitung: RAYMOND DÉLARZE

Das milde, subozeanische Klima des Chablais ohne grosse Temperaturschwankungen und mit relativ viel Regen ist demjenigen des Tessins ähnlicher als dem von Sommertrockenheit und grosser Hitze geprägten kontinentalen Klima des näher gelegenen Mittelwallis. Das erklärt auch, wieso wir hier manche Pflanzen wiederfinden, die für das Tessin typisch sind, wie beispielsweise *Ruscus aculeatus* oder *Castanea sativa*. Wie im Tessin wurde die Kastanie hier ebenfalls als Nahrungsquelle angepflanzt. Da im Unterwallis saure Böden weniger verbreitet sind, findet man Kastanienhaine allerdings nur an wenigen dafür geeigneten Stellen.

Der Aufstieg zur Colline de Plantour über den schattigen Nordhang mit *Acer opalus*, *Trochiscanthes nodiflora*, *Asplenium fontanum* und allen drei in der Schweiz vorkommenden *Polypodium*-Arten führt auf ein kleines Plateau mit diversen Orchideenarten und einer Reihe immergrüner Büschen *Ruscus aculeatus*, *Ilex aquifolium* und *Daphne laureola*. Auf der vordersten Spitze des Hügels, direkt über der senkrecht abfallenden Wand findet man das vielleicht einzige steppenartige Fleckchen in der Waadt, unter anderem mit *Fumana ericoides* und *Cleistogenes serotina*.

Von Verchier führt ein Wanderweg der Hügelflanke entlang durch den Wald nach Ollon. Obwohl Exposition und Höhe sich gleich bleiben, wechselt die Vegetation hier abrupt. Die Buchen machen der Föhre Platz und *Erica carnea* bedeckt praktisch den gesamten Boden darunter. An lückigeren, etwas schattigeren Stellen des Erico-Pinetum wachsen dazwischen u.a. *Goodyera repens* und *Pyrola chlorantha*. Der Grund für den abrupten Wechsel der Pflanzendecke ist eine breite Gipsader. Der poröse Stein erodiert rasch. Ein breiter Erdrutsch riss vor einigen Jahren eine breite Schneise in den Wald, wovon u.a. *Onosma helvetica* profitierte. Interessanterweise sind auf diesem kargen Boden alpine Arten offenbar konkurrenzfähiger, wie z.B. *Dryas octopetala* und *Gentiana clusii* zeigen.

<i>Acer opalus</i>	<i>Chaerophyllum temulum</i>
* <i>Aceras anthropophorum</i>	* <i>Cleistogenes serotina</i>
<i>Acinos arvensis</i>	<i>Convallaria majalis</i>
<i>Agrimonia eupatoria</i>	<i>Cornus mas</i>
<i>Allium lusitanicum</i>	<i>Cyclamen purpurascens</i>
<i>Allium sphaerocephalon</i>	<i>Cymbalaria muralis</i>
<i>Allium ursinum</i>	<i>Dactylorhiza fuchsii</i>
<i>Anthericum liliago</i>	<i>Daphne laureola</i>
<i>Asplenium fontanum</i>	<i>Digitalis lutea</i>
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	<i>Dryas octopetala</i>
<i>Asplenium trichomanes</i>	<i>Epipactis atrorubens</i>
<i>Aster linosyris</i>	<i>Epipactis helleborine</i>
* <i>Astragalus monspessulanus</i>	<i>Erica carnea</i>
<i>Berberis vulgaris</i>	<i>Euphorbia dulcis</i>
<i>Buglossoides purpureocaerulea</i>	* <i>Fumana ericoides</i>
<i>Carex alba</i>	* <i>Gentiana clusii</i>
<i>Carex digitata</i>	<i>Geranium purpureum</i>
<i>Carex humilis</i>	<i>Globularia cordifolia</i>
<i>Carex sylvatica</i>	* <i>Goodyera repens</i>
<i>Castanea sativa</i>	<i>Helleborus foetidus</i>
<i>Cephalanthera damasonium</i>	<i>Heracleum manategazzianum</i>
<i>Cephalanthera longifolia</i>	<i>Ilex aquifolium</i>
<i>Cephalanthera rubra</i>	<i>Koeleria vallesiana</i>

- Lathyrus niger*  
*Lathyrus vernus* ssp. *vernus*  
*Levisticum officinale*  
*Melampyrum cristatum*  
*Melica ciliata*  
*Melica uniflora*  
*Melissa officinalis*  
*Melittis melissophyllum*  
\* *Misopates orontium*  
\* *Onosma helvetica*  
\* *Ophrys apifera*  
*Orchis mascula*  
*Ornithogalum pyrenaicum*  
*Orobanche hederæ*
- Orobanche teucrii*  
*Physalis alkekengi*  
\* *Pinguicula alpina*  
*Pinus sylvestris*  
*Polygala chamaebuxus*  
*Polygonatum multiflorum*  
*Polygonatum odoratum*  
\* *Polypodium australe*  
\* *Polypodium interjectum*  
*Polypodium vulgare*  
*Prenanthes purpurea*  
*Pulmonaria officinalis*  
\* *Pyrola chlorantha*  
*Pyrola rotundifolia*




*Ruscus aculeatus*



*Quercus pubescens*  
*Reseda lutea*  
*Rosa arvensis*  
*Ruscus aculeatus*  
*Saponaria ocymoides*  
*Scorzonera austriaca*  
*Sorbus torminalis*  
*Stipa eriocalis ssp. eriocalis*  
 \* *Symphytum tuberosum*  
*Tamus communis*  
*Taxus baccata*

*Tilia cordata*  
*Tilia platyphyllos*  
*Torilis arvensis*  
 \* *Trinia glauca*  
 \* *Trochiscanthes nodiflora*  
*Verbascum thapsus ssp. crassifolium*  
*Veronica teucrium*  
*Vinca minor*  
*Vincetoxicum hirundinaria*

Bericht: Willy Müller



Blattoberfläche von  
*Onosma helvetica*

### 3. Exkursion: 15. Juni 2002

Savièse (VS)

Leitung: PHILIPPE WERNER

Ein vielfältiges Mosaik von Wiesen, Hecken, trockenheissen Hügeln und feuchten Hangmooren prägt den Charakter der Savièse, welche zwischen 900 und 1200 m Höhe oberhalb von Sion liegt. Die Wiesen, zwischen moorigen Stellen aller Grössen gelegen, wären ohne Bewässerung zu trocken, um genügend Ertrag abzuwerfen. Bereits im Mittelalter schaffte man daher mit Hilfe einer «Bisse», einer Wasserleitung, über teilweise abenteuerliche Wege Wasser herbei. Mit dem Wasser mitgeschwemmt wurden Schwebeteilchen, die sich in den Wiesen ablagerten und sie mit wertvollen Nährstoffen versorgten. Dadurch entstanden blumenreiche Halbtrockenrasen, die im Juni vom gelblichen Weiss der *Filipendula vulgaris* geprägt waren, wie wir sie nur noch auf wenigen, speziell gepflegten Wiesen antreffen konnten. Moderne Bewässerungs- und Bewirtschaftungsmethoden führen auch hier zu einer Veränderung der Pflanzendecke.

Wie die einst mit Ulmen bepflanzten Hecken, in denen wir eine Äskulapnatter entdeckten, werden auch die früher zur Streugewinnung gemähten Hangmoore jährlich niedergebrannt, um sie frei zu halten. Niemand kommt für das Mähen auf. Welchen Einfluss dies längerfristig auf die Moore haben



wird, ist abzuwarten. Leider nicht mehr angetroffen haben wir *Liparis loeselii*, *Sprianthes aestivalis* und *Orchis palustris*, die früher hier wuchsen. *Liparis loeselii* verschwand, nachdem sie einer Gruppe von Botanikern gezeigt wurde...

Arten im Hangmoor:

*Carex davalliana*

*Carex flacca*

*Carex hostiana*

*Carex panicea*

*Carex sempervirens*

*Dactylorhiza incarnata*

*Epipactis palustris*

\* *Filipendula vulgaris*

*Gymnadenia conopsea*

*Juncus subnodulosus*

\* *Schoenus ferrugineus* (einer der wenigen Standorte im Wallis!)

*Pinguicula vulgaris*

\* *Silaum silaus*



*Epipactis palustris*



Im See (einer der wenigen Standorte dieser Arten im Wallis!):

- \* *Carex vesicaria*
- \* *Nymphaea alba*

Bewässerte Wiesen:

- Bromus erectus*
- \* *Filipendula vulgaris*
- Galium verum*
- Knautia arvensis*
- Koeleria pyramidata*
- Linum catharticum*
- Lotus maritimus*
- Pimpinella nigra*
- Salvia pratensis*
- Trisetum flavescens*
- Veronica teucrium*

- \* *Lathyrus tuberosus*
- Malva sylvestris*
- \* *Melampyrum arvense*
- Mercurialis annua*
- Muscari racemosum*
- Ononis repens*
- Ononis spinosa*
- Portulaca oleracea*
- Potentilla recta*
- \* *Sisymbrium irio*
- Torilis arvensis*
- Tragopogon dubius*

Trockensteppen:

- Agropyron intermedium*
- Alyssum alyssoides*

Wälder, Hecken:

- Acer campestre*
- Acer opalus*
- Anthericum liliago*
- Anthericum ramosum*
- Astragalus monspessulanus*
- Cephalanthera rubra*
- Cephalanthera longifolia*
- Epipactis atrorubens*
- Epipactis helleborine*
- Galium boreale*
- Hieracium amplexicaule*
- \* *Hieracium tomentosum*
- Listera ovata*
- Melampyrum sylvaticum*
- Ononis rotundifolia*
- Quercus pubescens*
- \* *Pimpinella nigra*
- Platanthera bifolia*
- \* *Platanthera chlorantha*

Äcker, Weinberge usw.:

- Allium sphaerocephalon*
- Allium vineale*
- Cardaria draba*
- Foeniculum vulgare*
- Isatis tinctoria*



*Lathyrus tuberosus*

<i>Anacamptis pyramidalis</i>	<i>Lotus delortii</i>
<i>Artemisia campestris</i>	<i>Melica ciliata</i>
<i>Asperula aristata</i>	<i>Onobrychis arenaria</i>
<i>Astragalus onobrychis</i>	<i>Ononis natrix</i>
<i>Carduus nutans ssp. nutans</i>	* <i>Orobanche major</i>
<i>Centaurea vallesiaca</i>	<i>Scabiosa triandra</i>
<i>Chondrilla juncea</i>	<i>Scorzonera austriaca</i>
<i>Cuscuta epithymum</i>	<i>Sedum sexangulare</i>
<i>Dianthus sylvestris</i>	<i>Silene otites</i>
* <i>Ephedra helvetica</i>	<i>Stipa capillata</i>
<i>Euphorbia seguieriana</i>	<i>Stipa eriocalis ssp. eriocalis</i>
<i>Fumana procumbens</i>	* <i>Telephium imperati</i>
<i>Galium lucidum</i>	<i>Thymus oenipontanus</i>
<i>Linum tenuifolium</i>	<i>Veronica spicata</i>

Eine eingehende pflanzensoziologische Untersuchung der Savièse wurde von C. Rey und P. Werner im Bull. Murithienne 98 (1981): 33–42, veröffentlicht.

Bericht: Willy Müller

#### 4. Exkursion: 3./4. August 2002

Schweizer Nationalpark (GR)

Leitung: ADRIAN MÖHL, BEATRICE LÜSCHER

##### 1. Tag: Ofenpass–S-charl

Die erste Wanderung führte uns von der Passhöhe des Ofenpasses nach Osten, durch das Valbella zur Plan Mattun, die Alp Astras und durch die mächtigen Arvenwälder des Tamangur hinüber nach S-charl.


Im Zentrum der Exkursion standen diesmal Pflanzen, Insekten, ihr Zusammenspiel und auch die nicht von allen geliebten Spinnen.

Wie Girlanden legen sich die Blaugrashaldenbänder an die feinschuttreichen Abhänge des Valbella. Frost und Bodennässe nach der Schneeschmelze lassen sie langsam den Hang hinabrutschen. Im dichten Wurzelwerk von Blaugras, Horstsegge und Schneeheide sammelt sich der feine Schutt und bietet einer Vielzahl von Arten Halt. Eine Besonderheit ist dabei *Carex baldensis* mit seinen charakteristischen, schneeweissen Fruchtschläuchen, welche in der Schweiz lediglich hier anzutreffen ist. *Carex baldensis* ist die einzige Seggenart, die von Insekten bestäubt wird.

<i>Achillea erba-rotta</i>	* <i>Carex baldensis</i>
<i>Acinos alpinus</i>	<i>Carlina acaulis</i>
<i>Arctostaphylos alpinus</i>	<i>Cerastium arvense ssp. strictum</i>
<i>Arabis bellidifolia</i>	<i>Cirsium acaule</i>
<i>Arenaria ciliata</i>	<i>Cirsium spinosissimum</i>
<i>Arnica montana</i>	<i>Coeloglossum viride</i>
<i>Aster alpinus</i>	* <i>Crepis kernerii</i>
* <i>Callianthemum coriandrifolium</i> (fruchtend)	<i>Daphne striata</i>
<i>Campanula cochleariifolia</i>	<i>Dryas octopetala</i> (fruchtend)
<i>Campanula scheuchzeri</i>	<i>Empetrum hermaphroditum</i>
<i>Carduus defloratus ssp. rhaeticus</i>	<i>Equisetum variegatum</i>



- Erica carnea*  
*Gentiana asclepiadea*  
*Gentiana campestris*  
*Gentiana cruciata*  
\* *Gentiana engadinensis*  
*Gentiana nivalis*  
*Globularia cordifolia*  
*Gymnadenia conopsea*  
*Gymnadenia odoratissima*  
*Gypsophila repens*  
*Hypochoeris uniflora*  
*Laserpitium halleri*  
*Leontodon montanus*  
*Leontopodium alpinum*  
*Leucanthemum adustum*  
*Linaria alpina*  
*Nigritella rhellicanii*  
\* *Papaver aurantiacum*  
*Pedicularis verticillata*  
*Phyteuma hemisphaericum*  
*Pinus cembra*  
*Polygonum viviparum*  
*Pritzelago alpina*  
*Pseudorchis albida*  
*Pyrola rotundifolia*  
*Saxifraga aizoides*  
\* *Saxifraga aphylla*  
*Saxifraga caesia*  
*Saxifraga paniculata*  
*Saxifraga stellaris*  
*Sedum atratum*  
*Senecio doronicum*  
*Thesium alpinum*  
*Tofieldia calyculata*  
*Trifolium pallescens*  
*Trifolium thalii*  
\* *Valeriana supina*



*Crepis kernerii*

## 2. Tag: Nationalpark

Die erste Wanderung des zweiten Tags führte vom Punkt P9 im Nationalpark das Val da Stabelchod hinauf, dann durch den Bergföhrenwald zurück zum Hotel «Il Fuorn». Die Vegetationsgeschichte der Stabelchodwiese wird seit Jahrzehnten verfolgt. Wahrscheinlich wurde die Wiese bereits im 15. Jahrhundert als Maiensäss genutzt. Ein Teil diente als Alpweide, der andere wurde bewässert und gemäht. Die Gründung des Nationalparks bedeutete das Ende der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung. Anstelle der Kühe grasten nun Rothirsche – von denen wir, neben Murmeltieren und Gemsen, den einen und anderen zu Gesicht bekamen – das reiche Angebot der fetten Wiesen bis auf wenige Zentimeter über den Boden ab. Nur beweidungstolerante Pflanzen, wie z.B. *Festuca rubra*, *Agrostis tenuis*, *Briza media*, *Trifolium repens*, *Galium pumilum*, *Plantago media*, deren Rosetten oder kriechenden Triebe sich eng dem Boden anschmiegen, können überleben. Höher wachsende Pflanzen oder gar Bäume und Sträucher wie die Bergföhre haben keine Chance aufzukommen.




Die Läger- und Hochstaudenfluren verschwanden nach und nach bis auf wenige Reste, u.a. im Graben beim nördlichen Rastplatz (mit *Aconitum napellus*, *Urtica dioica*, *Chenopodium bonus-henricus* und *Deschampsia caespitosa*). Die Hochgrasfluren dagegen sind langsam am Zunehmen. Unter dem Beweidungsdruck setzen sich stellenweise Arten durch, welche für die Hirsche ungeniessbar (*Carex sempervirens*, *Cirsium acaule*) oder giftig sind (*Senecio abrotanifolius*). Die Hochgrasfluren sind artenarm. Auf Alp Stabelchod dominiert meist *Carex sempervirens*.

Die ursprünglichen Bergwälder im Nationalparkareal waren für den Bergbau fast vollständig abgeholzt worden. Um aufzukommen, benötigen die Bergföhrensamens (*Pinus mugo* ssp. *uncinata*) offene Erdstellen. Diese sind selbst in den dichten Hochgrasfluren selten. Nur sehr langsam werden sie sich daher in Föhrenwald wandeln wie den, der den Rückweg zum Punkt P8 begleitet mit typischen Arten: *Erica carnea*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*, *Pyrola media*, *Pyrola minor*, *Daphne striata*, *Orthilia secunda*, *Linnaea borealis* etc.

## 2. Tag: Zernez

Der letzte Ausflug der zweitägigen Exkursion führte uns hinab nach Zernez, zuerst vorbei an üppig gelben Büschen von *Medicago falcata* dem Waldrand entlang hinüber zum Schuttkegel des Val Gondas.

- Aconitum paniculatum*
- \* *Centaurea pseudophrygia*
- Cirsium eriophorum* ssp.  
*eriophorum*
- Cuscuta europaea*
- \* *Dianthus deltoides*
- Ribes alpinum*



*Centaurea pseudophrygia*

Von dort kehrten wir zurück nach Süden und folgten der kleinen Naturstrasse oberhalb der Kirche hinauf zu den terrasierten Wiesen östlich des Dorfes. Nicht die Wiesen selbst sind es, welche uns mit ihrem Artenreichtum dorthin lockten, sondern vielmehr die Felsen und Abhänge zwischen ihnen. Für *Androsace septentrionalis*, welcher auf den Felsen auch vorkommt, waren wir leider zu spät.

<i>Allium lusitanicum</i>	<i>Laserpitium halleri</i>
<i>Cotoneaster integerrima</i>	<i>Medicago falcata</i>
<i>Cynoglossum officinale</i>	* <i>Minuartia mutabilis</i>
* <i>Dracocephalum ruyschiana</i>	* <i>Poa molineri</i>
<i>Erysimum rhaeticum</i>	<i>Polemonium coeruleum</i>
<i>Helictotrichon pratensis</i>	<i>Veronica teucrium</i>

Bericht: Willy Müller

## 5. Exkursion: 10. August 2002

Churfirsten (SG)

Leitung: MARTHA GUBLER

Leider war der Wettergott für einmal der Botanischen Gesellschaft nicht gut gesonnen. Dauerregen zwang uns, auf den Ausflug in die Churfirsten zu verzichten. Stattdessen statteten wir dem Schwendisee und dem Gräppelensee kurze Besuche ab.

Von Unterwasser zweigt südlich eine Nebenstrasse in Richtung Schwendi ab und führt hinauf zu einer kleinen Hochebene mit dem von moorigen Flächen umgebenen Schwendisee. Aus der Ferne ahnt man nicht, dass er mit seinem reichen Bestand an *Cicuta virosa* ein kleines botanisches Juwel beheimatet. In den Moorzweiden blühte – wenn auch nass – die schmalblättrige Flockenblume, einer jener Magerkeitspezialisten, die sowohl auf speziell trockenen wie feuchten Standorten anzutreffen sind, und vom Saum des nahen Waldes leuchteten uns die länglichen, roten Beeren von *Streptopus amplexifolius* entgegen.

<i>Centaurea jacea</i> ssp. <i>angustifolia</i>	<i>Potentilla palustris</i>
* <i>Cicuta virosa</i>	<i>Salix repens</i> ssp. <i>repens</i>
<i>Lonicera caerulea</i>	<i>Streptopus amplexifolius</i>
<i>Nuphar lutea</i>	

Auf der anderen Talseite befindet sich der Gräppelensee. Die Strasse, welche zu ihm hochführt, ist durch ein Fahrverbot gesperrt, so dass wir uns durch den Regen den Berg hochkämpften. Blüten von *Ranunculus trichophyllus* einen Meter unter der Wasseroberfläche zeigten, dass diese auf Grund der Niederschläge deutlich über ihr übliches Niveau gestiegen war. Entsprechend war die Umrundung des Sees ein nasses Abenteuer, das sich allerdings dennoch gelohnt hat:

Der unscheinbare See ist einer der wenigen Standorte von *Numphar pumila* in der Schweiz. Die Schwimmblätter der kleinen Teichrose gleichen in ihrer Grösse jenen der Seerose. Im Gegensatz zur gewöhnlichen *Nuphar pumila* sind die Blätter der Population des Gräppelensees an ihrer Spitze rundlich (var. *rehsteineri* Burnat.). Nach blühenden Exemplaren hielten wir vergeblich Ausschau. Die Blütezeit war offensichtlich bereits vorbei. Mutige Exkursionsteilnehmer konnten auf Brettern, welche über wackeligen Schwinggras gelegt waren, immerhin bis zum Ufer vordringen, wo ein Exemplar mit der typischen birnförmigen Frucht zu sehen war.

Neben *Nuphar pumila* kann der kleine See mit einer weiteren Rarität aufwarten: *Potamogeton praelongus*. Dieses besitzt nur untergetauchte, ganzrandige, fein gekräuselte, den Stengel teilweise umfassende Blätter und Früchte mit einem scharfen Kiel.



*Cicuta virosa*

- Carlina acaulis*
- \* *Nuphar pumila*  
— (*var. rehsteineri*)
- Orthilia secunda*
- \* *Potamogeton praelongus*
- Ranunculus trichophyllus*
- Swertia perennis*

Einen letzten Halt schalteten wir bei Starkenbach ein, wo eine asphaltierte Nebenstrasse an einer Sägerei vorbei einem Bächlein entlang nach Süden führt. Dort am Strassenrand stehen Gruppen von *Campanula latifolia*. Im Gegensatz zur ähnlichen nesselblättrigen Glockenblume sind die Kelchzipfel an den Früchten bei *Campanula latifolia* praktisch kahl und aufrecht.

Bericht: Willy Müller

## **6. Exkursion: 18. August 2002**

Axalp (BE)

Leitung: Prof. Dr. OTTO HEGG

Vorbei an stattlichen, allein stehenden Bergahornbäumen führt der teilweise mit Natursteinen befestigte Wanderweg anfänglich leicht ansteigend hinüber zum Hinterburgseeli. Wo die letzten grossen Stürme die Rottannen abgeräumt haben, kommen zwischen *Epilobium angustifolium*, *Urtica*

*dioica* etc. die Holzpflanzen *Sambucus ebulus*, *Sorbus aucuparia* und *Acer pseudoplatanus* auf. Die mindestens zum Teil angepflanzten Rottannen werden künstlich gefördert, so dass sie und nicht die Laubbäume künftig das Bild bestimmen werden.

Nach etwa einer halben Stunde Wanderung beginnt der Abstieg durch den feuchten Hangwald zum See. Auf dem feuchten, nährstoffreichen Grund zwischen den locker stehenden Rottannen wachsen auf von feuchtem Humus bedeckten Karfeldern üppige Hochstaudenfluren mit:

*Achillea macrophylla*  
*Adenostyles alliariae*  
*Athyrium filix-femina*  
*Circaea lutetiana*  
*Cicerbita alpina*  
*Geranium sylvaticum*

*Peucedanum ostruthium*  
*Ranunculus platanifolius*  
*Rumex alpestris*  
*Saxifraga rotundifolia*  
*Viola biflora*

Wer aus dem Wald tritt, lässt unwillkürlich seinen Blick über das malerische Hinterburgseeli schweifen, welches wie ein Kratersee den vom Gletscher geschaffenen Kessel füllt. Dichte Unterwasserwiesen mit dem feinblättrigen *Potamogeton berchtoldii*, dem breitblättrigen *P. alpinus* und *Ranunculus trichophyllus* bevölkern die seichteren Stellen.

Grober Blockschutt – die Reste eines Felssturzes – bildet das rückseitige Ufer des Sees. Durch die Spalten und Ritzen zwischen den Gesteinsblöcken sinkt die kalte Luft in die Tiefe und tritt am Fuss aus. Bereits den Älplern war dieser Umstand bekannt, und sie nützten die Höhlungen als natürliche Kühlschränke. Im Kondenswasser, das sich beim Austritt der Kaltluft bildet, gedeihen Moose und Farne besonders gut. Daher sind die Felsen mit einem dichten Moospelz überzogen, durch den sich erstaunlicherweise die Ausläufer des Moosglöckchens (*Linnaea borealis*) ranken. An diesem einzigen bekannten Standort im Kanton Bern scheint es sich vollständig vegetativ zu vermehren, denn blühend wurde es nie beobachtet.

*Cystopteris fragilis*  
*Cystopteris montana*  
*Gymnocarpium robertianum*

\* *Linnaea borealis*  
*Lonicera nigra*

Vom Hinterburgseeli kletterten wir den steilen Hang hinauf zum Chrutmettli. Neben gelbem und blauem Eisenhut (*Aconitum altissimum*, *A. compactum*, *A. paniculatum*) wächst hier ein grösserer Bestand des hohen Rittersporns (*Delphinium elatum*), der gemäss Prof. Hegg einst zu dieser Jahreszeit den ganzen Abhang blau gefärbt hatte. Ein kleiner Abstecher – mehr lag leider nicht drin – führte uns vom Sattel aus hinüber zum Urserli. An seinem Rand, direkt über der Felswand, welche zum Hinterburgseeli abfällt, wächst der westlichste Arvenbestand (*Pinus cembra*) im Kanton Bern.

*Acinos alpinus*  
*Aconitum altissimum*  
*Aconitum compactum*  
*Aconitum paniculatum*  
*Adenostyles alliariae*  
*Alnus viridis*  
*Aster alpinus*  
*Campanula rhomboidalis*  
*Carlina acaulis*  
*Cerinth glabra*  
*Chaerophyllum villarsii*  
*Cirsium acaule*

*Cirsium oleraceum*  
*Cirsium acaule x oleraceum*  
*Crepis pyrenaica*  
*Daphne mezereum*  
 \* *Delphinium elatum*  
*Hypericum maculatum*  
*Leucanthemum adustum*  
*Phyteuma spicatum*  
*Pinus cembra*  
*Solidago virgaurea ssp. minuta*  
*Trifolium badiu*  
*Trollius europaeus*

