

Objekttyp: **FrontMatter**

Zeitschrift: **Fisio active**

Band (Jahr): **40 (2004)**

Heft 12

PDF erstellt am: **08.08.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

<http://www.e-periodica.ch>



**Diplomierte/r Physiotherapeut/in FH –
Eine kritische Liebeserklärung**

**Apport des sciences humaines à
la relation soignant-patient**

Mutterschaftsversicherung

Nexium® 20/40

Zusammensetzung: Magnesium esomeprazolium trihydricum; WUPS®-Tabletten zu 20 mg und 40 mg; Liste B. **Indikationen:** Behandlung und Langzeitrezidivprophylaxe der Refluxösophagitis, symptomatischer gastroösophagealer Reflux, Eradikation von *Helicobacter pylori*, Heilung von *Helicobacter pylori*-assoziiertem Ulcus duodeni, Rezidivprophylaxe von *Helicobacter pylori*-assoziierten Ulkuserkrankheiten. **Dosierung:** (Indikationsabhängig) Standarddosierung: 20 bis 40 mg täglich oder nach Symptombelastung bei Bedarf. **Kontraindikationen:** Überempfindlichkeit gegenüber Esomeprazol und substituierten Benzimidazolen. **Vorsichtsmassnahmen:** bei Auftreten von unbeabsichtigtem Gewichtsverlust, anhaltendem Erbrechen, Dysphagie, Hämatemesis oder Meläena immer: Abklärung einer Malignität. Schwangerschaft, Unerwünschte Wirkungen: Gelegentlich Hautausschlag, Juckreiz, Kopfschmerzen, Benommenheit/Schwindel, Störungen im Gastrointestinalbereich. **Interaktionen:** Ketoconazol, Itraconazol, Clitalopram, Clitalopram, Phenytoin. **Weitere Informationen:** Arzneimittel-Kompandium der Schweiz oder AstraZeneca AG, 6301 Zug, www.astrazeneca.ch

A5-1101/03/04

AstraZeneca

A Guiding Star in Gastroenterology

40 mg

«Wirksamkeit
ist das Mass
aller Dinge.»



Nexium®

Esomeprazolium