

# Ein Fall akuter Jauchegasvergiftung eines Pferdes

Autor(en): **Studer, R.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **90 (1948)**

Heft 3

PDF erstellt am: **05.08.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-589343>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## Ein Fall akuter Jauchegasvergiftung eines Pferdes.

Von Dr. R. Studer, Schüpfheim.

Am 7. November 1947 vormittags wurde ich von einem Landwirt dringend verlangt, weil er ein Pferd unvermittelt tot im Stall angetroffen habe, derweil eine Stute und ein 8 Monate altes Saugfohlen schwer erkrankt seien. Ursache anscheinend unbekannt.


An Ort und Stelle angelangt, traf ich den 4jährigen sehr gut entwickelten Wallach entblutet vor dem Stall an. Eine kurze Anamnese ließ mich alsbald als Todesursache eine massive Jauchegasvergiftung feststellen.

Der Unfalltag war ein klarer, kalter (min. 6 Gr. C) Novembermorgen. Nach dem Pferdeputzen um 10 Uhr, schickte sich der Bauer an, das Verschlauchen von Gülle vorzubereiten. Er betätigte vorerst kurz das Rührwerk. Dasselbe sei kaum 5 Minuten in Betrieb gewesen. Etwa 20 Minuten später trat ein Hilfsarbeiter zufällig in den Pferdestall. Er stellte erschrocken fest, daß das junge Pferd regungslos am Boden lag und das Fohlen eben zusammenbrach. Nach dem Meister um Hilfe rufend, riß dieser die „Misttüre“ auf, um direkt von außen zur Unfallstelle zu gelangen. Mit dieser eigentlich nicht beabsichtigten Stalllüftung war höchstwahrscheinlich die Rettung der Stallinsassen eingeleitet, ohne daß der Bauer nur ahnte was für eine Ursache schuld am Unfall war. Vielmehr glaubte er im ersten Moment an eine Elektrisierung der Tiere. Er traf den 4jährigen Wallach regungslos am Boden liegend an. Daneben stand eine 10jährige Stute, die sich mit den Vorderbeinen in den Futterbarren verstiegen hatte. Sie benahm sich wie betrunken und schwankte hin und her. Im dritten Stand lag das Fohlen röchelnd am Boden.

Bei den 3 Rindern, die anschließend an die Pferde eingestallt waren, will der Besitzer keine besondern Wahrnehmungen gemacht haben.

Bis zu meinem Eintreffen an der Unfallstelle (10 km) mochten etwa 45 Minuten vergangen sein. Inzwischen hatten sich die überlebenden Pferde soweit erholt, daß für sie keine Gefahr mehr bestand. Die Stute und das Fohlen zeigten sich etwas scheu, waren ruhig in der Atmung, wogegen aber die Herztätigkeit um etwa 10 Pulse erhöht war. Mit einmaliger subc. Coffeingabe wurde symptomatisch behandelt. Keines der Pferde mußte nachbehandelt werden. Die drei Rinder zeigten bei meiner Kontrolle keine klinischen Krankheitsbefunde.

Interessant mögen die örtlichen Erhebungen sein, die den Vergiftungsvorgang beleuchten. Der Unfallstall ist südlich am Scheunenbau gelegen. Er hat die Ausmaße von  $6 \times 5 \times 2$  m. Bestückung: 3 Pferde, 3 Rinder. Zwei kleine Fenster waren des kalten Morgens wegen geschlossen. Die Abschorlücke zum Güllekasten blieb am kritischen Tag versehentlich vollständig offen ( $20 \times 50$  cm).



Der Güllekasten im Ausmaß von  $5 \times 9 \times 1,5$  m ist dem Stall direkt vorgelagert, aus Beton erstellt und mit einer massiven Betondecke abgedeckt. Nur eine Rührlücke von  $30 \times 50$  cm ist in der nördlichen Ecke des Kastendeckels ausgespart. Der Kasten war bis zu 40 cm unter der Abdeckung mit Gülle angefüllt (Gasraum etwa 18 Kubikmeter).

Der Vorgang der massiven Beschickung des Pferde- und Viehstalles mit Jauchegas ist der fatal-günstigen Situation der baulichen Gruben- und Stallkonstruktion einerseits, und den atmosphärischen Verhältnissen am Unfalltag andererseits zuzuschreiben. Nach Ingangsetzung des Rührwerkes wurden die Giftgase überreichlich freigemacht. Der scharfe Nordwind verhinderte das Entweichen derselben bei der Rührlücke, resp. verschaffte im Gasraum des Jauchekastens einen kräftigen Luftzug in südlicher Richtung. Die am Süden des Kastens angebrachte Abschorlücke wurde unter den gegebenen Verhältnissen direkt zum Gaskamin. Die kalten Jauchegase, niedergehalten und getrieben durch die Bise mußten in massiger Wolke durch die Abschorlücke in den warmen Stall aufsteigen. Nur so ist es verständlich, daß in der

kurzen Zeit von etwa 20 Minuten das wandnächste junge, robuste Pferd bereits den Gastod erlitt. Die um 1,50 m rechts davon stehende Stute vermochte die Einwirkungszeit der Vergasung bedrohlich zu ertragen. Das Fohlen im nächsten Stallstand war dagegen bereits in Ohnmacht gefallen, offenbar weil es empfindlicher war als die Mutterstute. Den 3 Rindern, die zwischen 3 m und 6 m von der Gaseintrittspforte entfernt gestallt waren, konnte die offenbar hier noch schwächere Gaskonzentration scheinbar keine Beschwerden antun.

Dieser Fall einer außerordentlich schweren Jauchegasvergiftung von Nutztieren innert kürzester Zeit soll deswegen beschrieben sein, um die Aufmerksamkeit vermehrt auf die nicht seltenen schleichenden und kaum erkannten chronischen Vergiftungen hinzulenken.

---

## Referate.

**Untersuchungen über die Tularämie in Oesterreich.** Von Prof. Dr. H. David, Wiener tierärztl. Monatsschr. 34. Jahrg. Okt. 1947, S. 523.

Die Tularämie ist eine Seuche der wildlebenden Nagetiere, die auf den Menschen übertragbar ist. Erreger ist das *Bact. tularensis*, kokkenförmig und sehr klein. Der Mensch infiziert sich meist an Feldhasen, die er krank oder tot findet, mit bloßen Händen angreift, auspelzt oder ungenügend gekocht verzehrt. Auch das Arbeiten an Strohschubern, die von kranken Nagern bewohnt waren oder der Stich von Insekten kann infizieren. Der Mensch erkrankt 24 Stunden bis 14 Tage nach der Infektion mit hohem Fieber, Schmerzen, Schwellung von Lymphknoten, und verschiedenen anderen Organaffektionen, meist aber nicht tödlich. — In der Marchniederung sind vom Oktober 1945 bis April 1946 207 Personen an Tularämie erkrankt.

Die Arbeit gibt erschöpfende Auskunft über alles bisher Bekannte über Tularämie. (Für uns ist wichtig, zu wissen, daß wildlebende, kranke oder tote Nager entlang den Landesgrenzen, mit Rücksicht auf diese Krankheit mit aller Vorsicht zu behandeln sind!) L.

**Uterusrisse und -amputation.** Von Dr. J. Mussil, Wiener tierärztl. Monatsschr. 34. Jahrg. Okt. 1947, S. 585.

Der Verfasser ist durch Erfahrung dazu gekommen, beim Vorliegen einer Uterusperforation bei der Kuh der unsicheren konservativen Behandlung die Amputation des Uterus vorzuziehen. Dazu bewerkstelligt er erst einen künstlichen Uterusprolaps, indem er den Riß vergrößert, mit der Hand in die Bauchhöhle eingeht und das