

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **141 (1999)**

Heft 2

PDF erstellt am: **15.08.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



Vergessen Sie den Schal!

Micotil® 300 ad us. vet.

Injektionslösung für nicht laktierende Rinder

Zusammensetzung: 1 ml enthält: 300 mg Tilmicosin, 250 mg Propylenglykol, in stabiler wässriger Lösung. **Indikation:** Therapie der enzootischen Bronchopneumonie beim nicht laktierenden Rind. **Dosierung/Anwendung:** Nur subkutan verabreichen. Einmalige Injektion von 10 mg Tilmicosin pro kg Körpergewicht, das entspricht 2 ml Micotil pro 60 kg. *Nicht mehr als 20 ml pro Injektionsstelle injizieren.* **Anwendungseinschränkungen:** **Kontraindikationen:** *Nicht intravenös injizieren.* Nicht bei Schweinen und Pferden anwenden. Die intramuskuläre Injektion von 20 mg/kg beim Schwein und 30 mg/kg beim Rhesusaffen hatte letale Folgen. **Vorsichtsmassnahmen:** *Nicht für laktierende Kühe verwenden.* **Unerwünschte Wirkungen:** An der Injektionsstelle kann vorübergehend eine ödematöse Schwellung auftreten. **Absetzfrist:** Essbares Gewebe: 28 Tage. **Wechselwirkungen:** Keine bekannt. **Packung:** Flacon zu 50 ml. **IKS-Nr.** 52'143 (A) Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Veterinärkompendium der Gesellschaft Schweizer Tierärzte. **Hersteller:** Elanco Animal Health, U.K. **Vertrieb:** Schweiz. Serum- & Impfinstitut Bern

BE®**NA**
PRODUKTE

Schweiz. Serum- & Impfinstitut Bern
Postfach, 3001 Bern
Telefon 031 980 6 111 Telefax 031 980 6 775

ELANCO
ANIMAL HEALTH