

Uebersicht der in Europa und den angränzenden Ländern einheimischen Arten der Gattung *Simonius*

Autor(en): **Stierlin**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss Entomological Society**

Band (Jahr): **1 (1862-1865)**

Heft 6

PDF erstellt am: **12.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-400187>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Uebersicht der in Europa und den angränzenden Ländern einheimischen Arten der Gattung *Simonius*.

Aus Candez Monographie der *Elateriden* ausgezogen und ins Deutsche
übertragen.

Von **Dr. Stierlin.**

- I. Seitennäthe des prosternum vorn als Furche ausgehöhlt.
- a) Oberseite blau oder roth oder zweifarbig.
- b) dunkelblau *violaceus* Müll. Mittel- u. Süd-
Deutschland, Lg. 9-11 mm.
- bb) röthlich *rufus* Dj. Spanien, Länge 12
millimeter.
- bbb) zweifarbig, Flügeldecken zweifarbig,
Halsschild roth *suturalis* Gbl. Süd-Russland,
Sibirien, Länge 8-9 mm.
- aa) Oberseite schwarz oder bronzen, einfarbig.
- b) Drittes Fühlerglied fast so lang als das
vierte und deutlich länger als das zweite.
- c) Beine dunkel.
- d) Flügeldecken der Nath entlang flachgedrückt *nigripes* Gyll
Deutschland, Lg. 9-11 mm.
- dd) „ in die Quere gewölbt *cylindricus* Pk. Mittel- u.
Nord-Europa. Lg. 9-11 mm.
- cc) Flügeldecken roth *tardus* Cand. Südfrankreich
Länge 8 millimeter.
- bb) Drittes Fühlerglied nicht grösser oder noch
kleiner als das zweite.
- c) Oberseite erzfarbig, Klauen in der Mitte gezähnt *minutus* L.
Europa, besonders im Norden
Länge 6 mm.
- cc) „ „ „ einfach *parvulus* Pz. Europa.
Länge 7-8 mm.
- II. Seitennäthe des prosternum vorn nicht gefurcht *Bructeri* F. Nord-
und Mittel-Europa.
Länge 6-7 mm.