

Moritz Isenschmid's Zusätze zu "Kaltenbach, Die Pflanzenfeinde aus der Klasse der Insekten"

Autor(en): **Müller, Albert**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss Entomological Society**

Band (Jahr): **5 (1877-1880)**

Heft 10

PDF erstellt am: **30.06.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-400384>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Moritz Isenschmid's

Zusätze zu „Kaltenbach, Die Pflanzenfeinde aus der Klasse der Insekten“,
(Stuttgart, 1874. 8°.) mit den Belegstücken seiner Sammlung
(Nat. Mus. Bern) verglichen und herausgegeben

von

Albert Müller.

Seite

a. Coleoptera.

- 683 auf *Pinus sylvestris* L. (Kiefer) unter der Rinde *Platysoma oblongum* F.
in Sidens im Mai 1872. (an den Seen).
- 37 auf *Iuglans regia* L. (Wallnuss) unter der Rinde *Soronia grisea* Er.
in Bern.
- 683 auf *Pinus Picea, Duroi*; (Fichte) unter der Rinde im Juli *Peltis grossa* L.
an der Lenk. (Säge am Simmensturz).
- 683 auf *Pinus Picea, Duroi*; in einem alten Stocke im *Peltis dentata* F.
Weissenburgbad.
- 683 auf *Pinus Picea, Duroi*; in „ „ „ *Platycerus caraboides* L.
die Puppen, Lenk Juli 1873.
- 633 auf *Corylus avellana* L. (Haselnuss) auf den id. id.
Blättern sitzend an der Sihl in Zürich.
- 683 auf *Pinus Picea, Duroi*; in einem alten Stocke *Ceruchus tenebrioides* F.
im Weissenburgbad.
- 151 auf *Prunus avium* L. (Kirschbaum), in einem *Sinodendron cylindricum* L.
faulen Stamme Beatenberg.
- 610 auf *Alnus* (Erle), auf den Blättern, Zürich an der Sihl. *Anomala Frischii* F.
- 563 auf *Salix*, (Weiden), am Saft trinkend u. *Cetonia aurata & metallica* F.
desshalb im Tessin auch Säufer (beveroni) genannt.
- 610 auf *Alnus* (Erle), am Stamme sitzend, Ponte Brolla *Dicerca berolinensis* F.
bei Locarno.
- 535 auf *Ulmus campestris* L. (Ulme, Rüster.) *Poecilonota decipiens*, *Mannerh.*
aus der Rinde ausgeschnitten VII. 69. Bern.
- 37 auf *Iuglans regia* L. unter der Rinde in Sidens. *Anthaxia morio* F.
- 322 auf *Tussilago Farfara* L. auf den Blüten *Anthaxia 4 punctata* L.
am Giessbach.
- 683 auf *Pinus sylvestris* L. (Kiefer), unter der *Adelocera carbonaria* *Schrk.*
Rinde 7. V. 73. in Lugano.
- 683 auf *Pinus picea Duroi*; unter der Rinde Lenk id. *fasciata* L.
(Säge am Simmensturz).
- 622 auf *Fagus silvatica* L. (Buche), auf den Blättern *Corymbites haematodes* F.
Zürich.

- 631 *Castanea vesca* L. (Kastanie), unter der Rinde in Lugano. *Helops coeruleus* L.
 631 id. > > > > > *Helops lanipes* L.
 631 id. > > > > > *Helops quisquilius* F.
 und Clarens.
 683 *Pinus sylvestris* L. unter der Rinde in Lugano. *Helops lanipes* L.
 622 *Fagus silvatica* L. unter der Rinde in Schweizer- *Brachytarsus scabrosus* F.
 hall.
 683 *Pinus sylvestris* L. unter Kiefernrinde in Siders. *Pissodes Strobyli* Redt.
 10. V. 72.
 683 *Pinus sylvestris* L. an Kiefern in Siders V. 72. *Magdalinus frontalis* Gyll.
 688 *Pinus sylvestris* L. 13. V. Locarno an *Magdalinus memnonius* Falderm.
 Kiefern.
 683 *Pinus Picea Duroi*; Sitten V. 72. *Asemum striatum* L.
 563 *Salix*, an der Maggia sehr häufig. *Lamia textor* L.
 631 *Castanea esculenta* L. bei Castagnola (Lugano) *Morimus lugubris* Fabr.
 im Mai, an Kastanienstrünken.
 683 *Pinus Picea Duroi*. an Tannenstöcken.) *Monohamnus sutor* L.
 [Lokalität ? Alb. M.]
 683 id. > > > id. *sartor* L.
 97 *Iuglans regia* L. in Clarens unter der Rinde. *Exocentrus lusitanus* L.
 587 *Betula alba* L. (Birke) häufig überall. *Compsidia populnea* L.
 19 *Nymphaea alba* L. Robenhausen VI. *Donacia dentipes* F.
 708 *Acorus calamus* L. Pfäffikersee, Sitten, Siders. *Donacia sericea* L.
 761 *Phragmites communis* Trinius. (Schilf), *Phyllobrotica 4—maculata* L.
 Pfäffikersee.
 337 *Chrysanthemum Leucanthemum* L. Weissbad VII. *Adimonia tanaceti* L.
 Die Blätter der Blumen waren davon angefressen. Wiese feucht.
 70 *Tilia europaea* L. Weissbad, VII. in der *Malthinus biguttulus* Payk.
 Blüthe häufig.
 428 *Fraxinus* im Sept. in Freiburg alle 3 Stände *Halysia 16-guttata* L.
 auf einer Traueresche.
 Bern, 20. II. 1880.
-