

# Lepidopterologische Sammelergebnisse aus der Gegend von Chiasso, Ct. Tessin

Autor(en): **Knecht, H.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss Entomological Society**

Band (Jahr): **9 (1893-1897)**

Heft 7

PDF erstellt am: **29.06.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-400562>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## Lepidopterologische Sammelergebnisse

aus der Gegend von Chiasso, Ct. Tessin.

Von H. Knecht, Basel.

Im Sommer 1892 und theilweise 1894 benützte mein junger Freund, Hr. Steph. Mayer, damals in Chiasso angestellt, seine wenigen freien Stunden als eifriger Sammler. Da in faunistischer Beziehung über jene südlichste Ecke unseres Landes noch wenig bekannt ist, gebe ich in Folgendem die Resultate seiner Ausbeute.

Es würde mich aufrichtig freuen, wenn früher oder später einem entomologischen Collegen ein kleiner Dienst mit diesem Verzeichniss geleistet würde.

Die kleine Liste gibt selbstverständlich keine, auch nur annähernde Uebersicht der Tessiner Fauna, da Freund Mayer leider allzuwenig Zeit zur Verfügung hatte. Immerhin sind etliche Arten angeführt, deren Vorkommen verdient notirt zu werden.

*Papilio podalirius* L. Chiasso, St. Sefano 29. Mai.

„ *machaon* L. Chiasso.

*Thecla rubi* L. Vacallo, auch die unten fleckenlose var. *immaculata*.

*Polyommatus dorilis* Hfn. (*circe* S. V.). Vacallo 15. Mai. Sagno 3. Juni.

„ *phlaeas* L. zahlreich. Die Hälfte der Exemplare sind var. *caeruleopunctata*.

*Lycaena argyrotoxa* Bgstr. (*aegon* S. V.). S. Martino 17. Juli.

„ *orion* Pallas. St. Stefano; oben ganz schwarz, var. *nigra*.

„ *icarus* Rott. (*alexis* Hb.). St. Martino, Vacalla, Mitte bis Ende Mai.

„ (*alexis* var.), *icarinus* Scr. St. Stefano 22. Mai.

„ *bellargus* Rott. (*adonis* S. V.). Mai, Juni. Die Männer oben, auf den Hinterflügeln öfter mit starken, schwarzen Saumpunkten.

„ *hylas* Esp. Chiasso 24. Juni. Dabei ein Ex. ♀ oben schwarz, ohne Spur von roth, mit scharfen, blau-silbernen Strahlen von der Wurzel bis zur Mitte jeden Flügels.

„ *argiolus* L. Chiasso.

„ *minima* Fuessl. (*alsus* S. V.). Ueberall häufig Anfang bis Ende Juni.

„ *cyllarus* Rott. St. Stefano 22. Mai.

„ *semiargus* Rott. Bisbinno 12. Juni, von sehr dunkelm Blau.

- Lycaena arion* L. St. Stefano 29. Juni. Sehr dunkel. Vorderflügel unten schwärzlichgrau.
- Nemeobius lucina* L. häufig. Ende Mai bis Mitte Juni.
- Libythea celtis* Esp. 26. Juni 92. Ein Exemplar mitten in der Ortschaft Chiasso.
- Vanessa atalanta* L. Chiasso; Mai.
- „ *cardni* L. Chiasso.
- Melitaea aurinia* Rott. sehr häufig. Bisbinno 3. Juni.
- „ *phoebe* S. V. St. Martino 25. Mai.
- „ *didyma* O. überall Juni, Juli, August. Ein ♂ von 47 mm. Spannweite.
- „ *athalia* Rott. St. Martino, Vacallo Ende Mai bis Ende Juni.
- „ *athalia* var., *corythalia* Hb. St. Stefano 22. Mai.
- „ *aurelia* Nick. St. Martino 25. Mai.
- „ „ var. *rhaetica* Frey. Gleich den bündnerischen Exemplaren. St. Martino 25., 29. Mai.
- „ *parthenie* Bkh. St. Martino 25. Mai.
- Argynnis selene* Schiff. Sagno 27. Mai; St. Stefano 10. Juni.
- „ *dia* L. St. Stefano 1. Juli.
- „ *adippe*, var. *cleodoxa* O. Chiasso 24. Juni, St. Sefano 7. August. Alle Exemplare mit Ausnahme eines einzigen, sind *cleodoxa*. Diese einzige Ausnahme ist eine Zwischenform zwischen *adippe* und *cleodoxa*. Weniger Silberflecken als erstere, die silbernen Randflecken fehlen ganz.
- Satyrus hermione* L. St. Stefano 29. Juni.
- „ *semele* L. Ende Juni, Anfang Juli.
- „ *dryas* (*phaedra* L.). St. Stefano 7. August.
- Parargo maera* L. 22. Mai; sehr dunkel.
- Coenonympha arcania* L. Bisbinno 12. Juli 92 sehr zahlreich. Darunter Exemplare, die durch dunkeln Saum oben und schmales, weisses Band unten an Rätzers *insubrica* erinnern.
- Syrichtus alveus* Hb. Bisbinno 12. Juni.
- „ *malvae* L. (*alveolus* Hb.) häufig 22. Mai bis 12. Juni.
- „ *sao* Hb. St. Stefano 22. Mai.
- Nisoniades* (*Thanaos*) *tages* L. 15., 22. Mai.
- Acherontia atropos* L. Chiasso 11. September.
- Deilephila vespertilio* Esp. sehr häufig und wohl in zwei Generationen. Ende Juni fanden sich zahlreiche, ausgewachsene Raupen, Verpuppung Anfang Juli. Entwicklung ohne Ausnahme 1. bis 5. August. Anfangs September wieder ausgewachsene Raupen.
- Ino statices* L. überall 3. bis 30. Mai.

- Zygaena romeo* Dup., var. *orion* H. S., *triptolemus* Frz.  
St. Stefano 29. Juni; St. Martino 26. Juni; Vacallo  
24. Juni. Alle ganz frisch.
- „ *achilleae* Esp. St. Martino 26. Juni; St. Stefano 3. Juli.
- „ *loniceræ* Esp. St. Stefano 3. Juli.
- „ „ var. *major* (?) Frey. 26. Juni bis 7. Juli.
- „ *carniolica*, var. *hedysari* Hb. St. Stefano; Chiasso  
26. Juni, 7. Juli.
- Syntomis phegea* L. St. Martino, St. Stefano, Chiasso 26. Juni,  
10. Juli. Darunter Exemplare einer schönen, ausge-  
prägten Varietät. Auf den Vorderflügeln die gewöhn-  
lichen 5 weissen Flecken, gross und deutlich. Hinter-  
flügel absolut schwarz, fleckenlos. Uebergänge mit  
kaum erkennbarem, kleinem Fleckchen.
- Setina irorella* Cl. St. Martino 26. Juni.
- „ *roscida* Esp.? Ein sonderbares Thier. Oben wie *aurita*,  
dicht, dunkelgelb beschuppt, unten mit dem schwar-  
zen kleinen *Roscidafleck* in den Vorderflügeln.
- Euchelia jacobaeae* L. St. Martino 17. Juli.
- Nemeophila russula* L. Vacallo 25., 29. Mai, 12. Juni.
- Callimorpha dominula* L. St. Stefano 1. Juli.
- „ *hera* L. St. Martino 17. Juli.
- Arctia villica* L. Chiasso.
- „ *maculania* Lang., *curialis* Esp. St. Martino 19. Juni.
- Spilosoma menthastri* Esp. Chiasso 8. Juni.
- „ *lubricipeda* Esp. Chiasso 1. Juni, 1. Juli.
- Psyche opacella* H. S. Bisbinno 3. Juni 94, häufig.
- Dasychira pudibunda* L. Chiasso 2. Juni.
- Bombyx rubi* L. Chiasso 30. Mai, sehr dunkles ♀.
- Saturnia pyri* S. V. Chiasso 27. Mai und dann noch mehrfach.
- Drepana falcataria* L. St. Stefano 22. Mai.
- Gluphisia crenata* Esp. Chiasso 20. Mai.
- Phalera bucephala* L. Vacallo 24. Juni.
- Cymatophora* or S. V. Chiasso 8. Juni.
- Acronycta psi* L. Chiasso 25. Mai.
- Agrotis pronuba* L. Chiasso 8. Juni.
- „ *castanea* Esp. Chiasso 1. Juni, ungemein dunkel.
- „ *brunnea* S. V. Chiasso 1. Juni.
- „ *exclamationis* L. Chiasso 8. Juni.
- Mamestra contigua* S. V. Chiasso 15. Mai.
- „ *oleracea* L. Chiasso 26., 27. Mai.
- Dianthoecia cucubali* S. V. Chiasso 30. Mai, 8. Juni.
- „ *carbophaga* Bkh. Chiasso 25. Mai.
- Brotolomia meticulosa* L. Chiasso 27. Mai.
- Plusia C. aureum* Knoch. Chiasso 13. Juni.
- „ *chrysitis* L. sehr häufig Mitte Mai bis Mitte Juni.

- Erastria pusilla* View. Chiasso 27. Mai.  
 „ *fasciana* L. Chiasso 15. Mai.  
*Hypena proboscidalis* L. Chiasso 8., 21. Juni.  
*Pseudoterpna pruinata* Hufn. Vacallo 25. Mai.  
*Geometra vernaria* Hb. Chiasso 8., 29. Juni.  
*Nemoria strigata* Muell. Chiasso 8., 13., 20. Juni.  
*Jodis lactearia* L. Chiasso 20. Mai.  
*Acidalia aversata* L. Chiasso 2., 17. Mai.  
 „ *fumata* Sph. Chiasso 8. Juni; Bisbinno 12. Juni.  
 „ *remutaria* Hb. Chiasso 8. Juni.  
 „ *imitaria* Hb. Bisbinno 12. Juni.  
*Zonosoma pendularia* Cl. Chiasso 8. Juni.  
*Abraxas adustata* Schiff. St. Martino 25. Mai.  
 „ *marginata* L. Chiasso 20. Mai.  
*Stegania trimaculata* Vill. Chiasso, Grotto fontana 22. Mai.  
*Cabera pusaria* L. Chiasso 8., 17. Juni.  
*Selenia bilunaria* Esp. St. Stefano 22. Mai.  
*Angerona prunaria*, ab. *sordidata* Fuessl. Chiasso 7. Aug.  
*Rumina luteolata* L. Chiasso 22. Mai.  
*Epione advenaria* Hb. Chiasso. Anf. bis Mitte Juni zahlreich.  
*Hemerophila abruptaria* Thnb. Rhana 3. August.  
*Boarmia secundaria* S. V. Chiasso 30. Mai.  
 „ *consortaria* F. Chiasso 25. Mai, 8. Juni.  
 „ *crepuscularia* Hb. Chiasso 25. Mai.  
 „ *luridata* Bkh. Chiasso 13., 29. Juni.  
 „ *punctularia* Hb. Chiasso 8., 13., 20. Juni.  
*Gnophos glaucinaria* Hb. Bisbinno 2. Juni.  
*Ematurga atomaria* L. Vacallo 29. Mai.  
*Ortholitha plumbaria* F. St. Martino 25. Mai.  
*Eucosmia undulata* L. zahlreich Chiasso 13., 30. Juni.  
*Cidaria ocellata* L. Vacallo 29. Mai.  
 „ *viridaria* F. Chiasso 20. Mai.  
 „ *riguata* Hb. Chiasso 1. Juni.  
 „ *cuculata* Hfn. (*sinuata* S. V.). Vacallo 29. Mai.  
 „ *rivata* Hb. Chiasso 8. Juni.  
 „ *sociata* Bkh. Chiasso 8. Juni.  
 „ *procellata* S. V. Chiasso 8., 29. Juni.  
 „ *tristata* L. Bisbinno 12. Juni.  
 „ *albulata* Schiff. Bisbinno 12. Juni sehr zahlreich.  
 „ *candidata* Schiff. S. V. Chiasso.  
 „ *decolorata* Hb. Chiasso 2. Juni.  
 „ *capitata* H. S. Chiasso 8. Juni.  
 „ *berberata* Schiff. Chiasso 8. Juni.  
 „ *rubidata* S. V. Chiasso 8., 27. Juni.  
 „ *tersata* S. V. Chiasso 22. Mai.

Zu bemerken wäre noch, dass *Attacus Cynthia* bei Chiasso gut acclimatisirt zu sein scheint, und Abends sehr häufig zum Licht in die Zimmer fliegt.

## Beschreibung einiger neuen Rüsselkäfer.

Von Dr. Stierlin.

### **Otorh. foveolato-striatus** m.

Ovatus, nigro-squamosus, elytris apicem versus flavomaculatis; rostro sulcato, antennis crassis, dimidio corpore brevioribus, funiculi articulo secundo primo paulo longiore, externis transversis, clava parva, breviter ovata, thorace longitudine dimidio latiore, lateribus parum rotundato, basi apiceque aequale, confertim subtiliter rugoso-granulato, obsolete canaliculato; elytris amplis, breviter ovatis, thorace duplo latioribus et triplo fere longioribus, foveolato-striatis, interstitiis angustis, non setosis, pedibus crassis, inermibus. Lg. 8,5 mm. Abchasien. Von Hrn. Rost gesendet.

In die 13. Rotte gehörend und dem *conspicabilis* und *validicornis* am nächsten, aber grösser, dicht beschuppt und die Flügeldecken nicht gekörnt.

Schwarz, mit runden Schuppen dicht bekleidet, deren Grundfarbe dunkelbraun ist und nur an einigen Stellen zeigen sich kleine Flecken von hellgelber Farbe, so zwei an der Stirn, an den Seiten des Halsschildes und gegen die Spitze der Flügeldecken. Rüssel und Stirn gefurcht, die Fühlerfurche verflacht sich sehr rasch und verläuft in der Richtung nach der Stirn; Fühler dick und kurz, das 2. Geisselglied  $\frac{1}{3}$  länger als das 1., die äussern quer, die Keule klein, kurzoval.

Halsschild kaum um die Hälfte breiter als lang, seitlich sehr schwach gerundet, etwas vor der Mitte am breitesten, vorn kaum schmaler als an der Basis, dicht und ziemlich fein, etwas runzlig gekörnt, mit schwacher Mittelfurche.

Flügeldecken bauchig, doppelt so breit und fast dreimal so lang als das Halsschild, hinten abgerundet, breit gefurcht und in den Furchen mit einer Reihe flacher Grübchen, die Zwischenräume schmal, uneben, aber weder gekörnt, noch mit Borsten besetzt, Beine kurz, die Schenkel ziemlich dick, aber nicht gezähnt, die Schienen gerade.

### **Otorh. carcelliformis** Stl.

Ovatus, castaneus, antennis pedibusque dilutioribus, squamulis luteis vestitus, rostro brevi, lato, basi obsolete carinulato,