

Catalogue des Variétés et Aberrations de ma collection : Macrolépidoptères de la zone paléarctique

Autor(en): **Agassiz, G.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss Entomological Society**

Band (Jahr): **10 (1897-1903)**

Heft 6

PDF erstellt am: **12.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-400599>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Catalogue des Variétés et Aberrations de ma collection.

Macrolépidoptères de la zone paléarctique.

Janvier 1900.

Ce catalogue a pour but de renseigner mes honorables collègues sur les variantes de couleur, de dessin et de grandeur que j'ai constatées dans ma collection, afin de provoquer leurs communications éventuelles à ce sujet.

Je me suis contenté d'une description très sommaire des variétés et aberrations qui ne portent pas de noms dans le Catalogue Staudinger. Il y a là évidemment, à côté de véritables aberrations, des cas de dimorphisme de localité ou de saison qui ne peuvent être précisés que par l'indication exacte du lieu et de l'époque de la capture et par la vue du sujet. Toutefois, cette description sommaire offrira, je crois, quelque intérêt, en amenant un échange de communications avec mes correspondants, auxquels je suis par avance reconnaissant des renseignements qu'ils voudront bien me transmettre après examen de ce catalogue. Je me mets à leur entière disposition pour compléter ces indications sommaires dans chaque cas particulier.

Lausanne, Janvier 1900.

G. Agassiz.

Obs. L'autorité n'est pas ajoutée aux noms, le catalogue Staudinger servant de base à ce travail.

Dans la colonne „Provenance“, le mot Aix signifie Aix-les-bains (Savoie) et ses environs montagneux; les mots Jura bernois indiquent particulièrement Tramelan.

I. Rhopalocera (Diurnes).

<i>Papilio podalirius.</i>	ab. tache rougeâtre à l'angle sup. des ailes infér.	Suisse et Savoie.
ab. de 56 mm.		
ab. 9 raies noires aux ailes sup. (au lieu de 7).	ab. sphyrus.	Syrie.
ab. double raie couleur ocre aux ailes inf. Suisse-Jura.	<i>Thais rumina.</i>	
var. Feisthamelii. Espagne.	var. castiliana, passage à medesicaste.	Valence.
<i>P. machaon.</i>	ab. Canteneri.	Grenade.
Blanchâtres et jaunâtres.	var. medesicaste.	Digne.
ab. de 46 mm. Corse.	ab. Honoratii.	Digne.
ab. bordure noire, large, aux ailes sup.	<i>Th. polyxena.</i>	
ab. point noir sous l'angle apical.	ab. taches noires déformées aux ailes sup.	Florence.
ab. asymétrique.	var. ochracea.	Hongrie.

- Th. Cerisyi.*
var. *Deyrollei.* Marmara.
- Ismene helios.*
var. *maxima.* Turkestan.
- Doritis apollinus.*
var. *bellargus.* Syrie.
- Parnassius apollo.*
Alpes, Jura, Pyrénées.
var. *hesebolus.* Sibérie.
ab. 6. taches noires aux ailes sup. (au lieu de 5).
ab. 1, 2 et 3 taches rouges aux ailes sup.
ab. taches et bande rouges à l'angle anal.
ab. œil rouge double à l'aile infér.
ab. taches noires réunies en bande transversale aux ailes sup.
Suisse: Alpes, Jura.
ab. de 54 mm. Savoie.
- P. delius.*
ab. 3 taches rouges aux ailes sup. Suisse: Haut Valais.
var. *intermedius.* Sibérie.
- P. mnemosyne.*
ab. *trans. ad. melaina.*
ab. *melaina.* Tyrol.
- Pieris rapae.*
var. *minor* de 35 mm.
ab. teinté de jaune.
ab. base des ailes tachée de noir. Suisse.
- P. napi.*
var. *napaeae.*
var. *minor* de 31 mm. Suisse.
ab. *bryoniae*, fond blanc et fond gris. Suisse: Alpes.
ab. *flavescens.* " Jura.
- P. daphidice.*
var. plus foncé dessous. Espagne.
- var. *bellidice.* Espagne.
- P. callidice.*
var. *chrysidice.* Perse.
- Anthocharis belemia.*
var. *glauce.* Espagne.
- A. belia.*
var. *ausonia.* Espagne.
var. *simplonia* (espèce?). Haut Valais.
- A. tagis.*
var. *bellezina.* Espagne.
- A. euphenoides.*
var. *minor* de 24 mm. (un type de 44 mm). Nice.
- Zegris eupheme.*
var. *menestho.* Arménie.
var. *meridionalis.* Grenade.
- Leucophasia sinapis.*
var. *lathyri.*
var. *diniensis.*
ab. *erysimi.* Suisse.
- L. Duponchelii.*
var. *aestiva.* Arménie.
ab. tache noire grande, couvre tout le bord des ailes sup. Nice.
- Colias palaeno.*
var. *orientalis.* Amour.
var. *europomene.* Suisse: Jura.
ab. *Werdandi* ♀. Suisse: Alpes.
- C. phicomone.*
ab. ♂ et ♀ très foncés.
ab. ♂ et ♀ très pâles.
ab. ♀ dessin effacé. Savoie, Haut Valais.
- C. hyale.*
ab. ♂ dessin effacé.
ab. ♀ ailes infér. teinte foncée.
ab. ♀ " " " " et double bordure de points noirs. Suisse: Jura.

- C. chrysothème.*
♂ et ♀ douteux, edusa?
Florence.
- C. edusa.*
var. minor de 32 mm.
ab. ♂ et ♀ large tache orange
aux ailes infér.
Florence et Espagne.
ab. helice. Suisse et Savoie.
ab. " minor de 36 mm.
Espagne.
var. major ♂ de 52 mm.
ab. ♀ large bordure noire,
taches jaunes disparaissent.
ab. ♀ larges taches jaunes
dans la bordure noire.
ab. une aile supér. atrophiée.
Suisse et Savoie.
- Rhodocera rhamni.*
ab. de 45 mm. Suisse.
var. farinosa. Arménie.
- R. cleopatra.*
var. massiliensis. Marseille.
- Thecla ilicis.*
ab. de 20 mm. Savoie (Aix).
var. caudatula. Syrie.
ab. cerri.
var. esculi.
Sud France (Riviera).
- Th. Spini.*
var. lynceus. Aix (Provence).
- Th. quercus.*
ab. ♀ les taches bleues se
répandent dans les ailes
supér.
ab. tache bleue remplacée
par uneraie blanche (fané?).
Savoie (Aix).
- Th. rubi.*
ab. de 19 mm. Savoie (Aix).
ab. immaculata. Nassau.
- Polyommatus virgaureae.*
var. virgaureola. Turquie.
var. zermattensis. H^t-Valais.
- P. dispar.*
var. rutilus grands.
ab. taches albinés.
Vénétie (Padoue).
- P. Hippothoë.*
var. eurybia. H^t-Valais.
- P. alciphron.*
var. gordius. H^t-Valais.
- P. dorilis.*
var. subalpina. Grisons.
- P. Phlaeas.*
var. eleus. Espagne.
- P. amphidamas.*
ab. obscura. Saxe.
- Lycaena baetica.*
ab. très petits exempl. de
23 mm. Espagne.
- L. argus.*
var. aegidion. Laponie.
var. argulus. H^t-Valais.
- L. aegon.*
var. alpina. H^t-Valais.
var. bella. Amour.
- L. argiades.*
ab. grande ♀ teintée de bleu.
var. polysperchon.
Savoie (Aix).
ab. coretas. Hongrie.
- L. eros.*
var. eroides. Sarepta.
- L. sebrus.*
ab. ♀ teintée de bleu.
ab. ♂ bleu opale.
Suisse: Valais.
- L. baton.*
var. panoptes. Espagne.
- L. minima.*
var. Lorquini. Espagne.
- L. orion.*
var. nigra. Espagne.
var. ornata. Amour.
- L. semiargus.* Les ♂ d'Italie
plus foncés.

- var. montana. Grisons.
 var. bellis. Arménie.
- L. pheretes.*
 ab. maloyensis. Grisons.
- L. optilete.*
 var. cyparissus. Laponie.
- L. icarus.*
 ab. ♀ dessous taches réunies
 en bande noire.
 ab. icarinus.
 ab. dessous grandes taches
 noires. Suisse.
 ab. passage à caerulea.
 ab. caerulea. Savoie (Aix).
 var. glauca. Kissingen.
 var. celina. Algérie.
- L. Escheri.*
 ab. points noirs aux ailes
 infér. Savoie.
 ab. dessous sans taches fauves,
 points noirs seulement au
 bord des ailes sup.
 Hautes Alpes.
- L. hylas.*
 ab. points noirs aux ailes
 infér. Suisse: Jura.
- L. bellargus.*
 ab. points noirs au bord des
 ailes infér.
 ab. passage à cernus.
 Suisse, Savoie (Aix).
 ab. cernus. Provence.
 var. punctifera. Algérie.
- L. coridon.*
 ab. large bordure noire.
 ab. Sohni. Suisse.
 ab. syngrapha.
 Suisse, Sud France.
 var. corydonius. Arménie.
 var. albicans. Andalousie.
- L. dolus.*
 ab. vittata. Marseille.
- L. damon.*
 ab. large bordure noire.
 ab. ♀ teintée de bleu.
 Suisse.
- L. cyllarus.*
 ab. ♀ très noire.
 var. Andereggii. Valais.
 ab. Blachieri, passage à me-
 lanops.
 ab. grand ♂ de 40 mm. large
 bordure noire. Nice.
- L. astrarche.*
 var. montana. Andalousie.
 var. aestiva. Espagne.
 ab. allous. Suisse, Allem.
- L. zephyrus.*
 var. lycidas. Valais.
- L. arion.*
 var. alpina.
 Savoie, H^t-Valais.
 ab. taches noires très épaisses.
 ab. 5 petits points noirs, ex.
 de 30 mm. Suisse, Savoie.
- Nemeobius lucina.*
 ab. ailes infér. noires pres-
 que sans taches.
 Savoie (Aix).
- Apatura iris.*
 ab. iole. Hongrie.
- A. ilia.*
 ab. astasioides (dilutior?).
 Suisse: Jura.
 var. metis.
 var. bunea. Sarepta.
 ab. clytie. Suisse: Baden.
- Limenitis populi.*
 ab. tremulae. Saxe.
- Vanessa levana.*
 ab. porima. Saxe.
 var. prorsa. Grisons.
- V. egea.*
 var. autumnalis.
 ab. I album. Florence.

- V. urticae*.
 var. *pygmaea*. Leipzig.
 var. *polaris*. Tromsøe (Norvège).
 ab. sans les 2 petits points noirs aux ailes sup., la bande de points bleus plus étroite (à décrire). Florence.
 var. *ichnusa*. Corse.
 ab. *nigrita*.
 ab. " (à décrire) *ichnusoides* (?). Elevage Zurich.
- V. polychloros*.
 ab. *pyromelas* (?).
 var. *pygmaea*. Elevage.
 var. *erythromelas*. Algérie.
 ab. *testudo*.
 ab. " (à décrire). Elevage Zurich.
- V. Jo*.
 ab. sans écailles (ioides).
 ab. ioides.
 ab. ioides à droite, Jo à gauche. Elevage.
 ab. *belisaria*.
 ab. " (à décrire). Elevage Zurich.
- V. callirhoë*.
 var. *vulcanica*. Ténériffe.
- V. atalanta*.
 ab. point blanc dans la raie transversale rouge. Suisse.
- V. antiopa*.
 ab. les 2 taches jaunes des ailes sup. confondues.
 ab. bordure jaune étroite, taches jaunes déformées, taches bleues allongées transversalement.
 ab. *hygiaea*. Elevage Zurich.
 ab. bordure blanche (fané après l'hiver). Suisse.

- Melitaea aurinia*. (France et Italie.)
 ab. tache jaune clair rectangul. à la base des ailes supér. Italie.
 var. *merope*. Valais.
 var. *provincialis*. Nice.
 var. *orientalis*. Asie min.
 var. *Desfontainii*. Espagne.
- M. dictynna*.
 ab. ailes infér. noires presque sans taches.
 ab. ailes infér. noires tache noire partie médiane ailes supér. Suisse et Savoie.
- M. parthenie*.
 var. *beata*. Sud France.
 var. *varia*. Grisons.
- M. aurelia*
 var. *plotina* (espèce?). Amour.
- M. didyma*.
 ab. ♂ dessous taches noires aux ailes infér. Savoie (Aix).
 ab. ♀ foncées, noirâtres. Nice.
 ab. ♀ claires, dessin effacé. Savoie (Aix).
 ab. couleur plus vive, moins de points noirs. Florence.
 var. *occidentalis*. Nice.
 var. *neera*. Sarepta.
 var. *meridionalis*. Arménie.
 var. *alpina*. H^t-Valais.
 ab. ♂ base des ailes supér. très noire. Savoie.
 ab. teinte jaune-rouge. France (Ardèche).
- M. phoebe*.
 ab. dessin effacé au sommet des ailes supér. Florence.
 var. *occitanica*. Andalousie.
 var. *aetherie*. Algérie.
 ab. *melanina*. Florence.

- ab. base très foncée.
France (La Grave).
- M. dejone.*
ab. dessin effacé aux extrémités des ailes sup.
Sud France.
ab. petite, dessins de phoebe.
France (Ardèche).
- M. athalia.*
ab. ailes supér. minces, allongées.
ab. foncées et claires.
ab. dessin effacé.
ab. déformations d'ailes.
Suisse et Savoie.
ab. corythalia.
Domo d'Ossola.
var. nipponica. Amour.
var. berisalensis (espèce?).
Valais (Martigny).
- M. arduinna.*
var. rhodopensis. Perse.
- Argynnis dia.*
ab. tache albine.
ab. base des ailes infér. noire.
Suisse: Jura.
- A. selene.*
var. hela. Sibérie.
- A. pales.*
ab. tache jaune clair rectangulaire à la base des ailes supér.
var. isis.
ab. noirâtre.
ab. napaea.
H^t-Valais et Grisons.
var. arsilache. Grisons.
var. generator. Pamir.
ab. remarquable: défigurée dessus et dessous (à décrire). France (La Grave).
- A. ino.*
var. maxima. Amour.
- A. amathusia.*
ab. taches albinés.
ab. dessins très noirs.
ab. aile déformée.
Savoie (Aix).
- A. lathonia.*
ab. ailes infér. angulaires.
Suisse.
- A. aglaja.*
ab. de 43 mm. Savoie.
var. fortuna. Amour.
- A. niobe.*
ab. passage à eris.
ab. eris.
ab. ♀ très noire, 55 mm.
Savoie (Aix) et Suisse: Jura.
- A. adippe.*
ab. grandes taches noires.
Suisse.
ab. cleodoxa. Savoie (Aix).
- A. paphia.*
ab. ♀ très foncée. Suisse.
var. anargyra. Castille.
ab. valesina. Tessin.
- Danais chrysippus.*
ab. alcippus (espèce?). Grèce.
- Melanargia galathea.*
ab. blanchâtre.
ab. passage à procida.
ab. de 34 mm.
Suisse et Savoie.
var. procida. Marseille.
ab. galene.
ab. leucomelas.
France (Charente Inf.).
- M. Japygia.*
var. Suwarovius. Turkestan.
- M. halimede.*
var. lugens. Amour?
- M. ines.*
ab. asymétrique. S. Espagne.
- Erebia gorge.*
ab. erynis. Grisons.

- var. triopes. Grisons.
- E. tyndarus.*
ab. coecodromus. Grisons.
var. dromus. Pyrénées.
- E. melampus.*
ab. taches albines. H^t-Valais.
- E. epiphron.*
var. cassiope.
ab. nelamus. Grisons.
- E. manto.*
var. caecilia. Pyrénées.
var. pyrrhula. Grisons.
- E. goante.*
ab. tache albine. H^t-Valais.
- E. ceto.*
var. obscura.
var. phoreys. H^t-Valais.
- E. aethiops.*
ab. de 34 mm.
var. leucataenia? H^t-Valais.
- E. glacialis.*
ab. très larges taches fauves.
ab. alecto. H^t-Valais.
var. pluto. Tyrol.
- E. pronœ.*
var. pitho. H^t-Valais.
- E. melas.*
var. Lefebvrei. Pyrénées.
- E. euryale.*
ab. ocellaris. S. Autriche.
var. euryaloides. Tyrol.
- E. ligea.*
ab. taches albines.
var. adyte. Suisse et Savoie.
- E. medusa.*
var. hippomedusa. Autriche.
- Oeneis bore.*
var. taygete (espèce?).
Laponie.
- Satgrus alcyone.*
Grands exemplaires (58 au lieu de 50 mm.) Espagne.
- S. briseis*
ab. pirata. N. Allem.
ab. ♂ et ♀ exactement pareils à meridionalis, larges bandes blanches. Savoie.
var. meridionalis. Arménie.
ab. ♂ de 45 mm.
ab. ♀ taches blanches étroites, comme au ♂. Suisse.
- S. anthelea.*
var. amalthea. Grèce.
- S. arethusa.*
ab. ♂ presque sans taches.
ab. ♂ taches très larges.
ab. ♀ " " " 3 points noirs ailes sup. Savoie (Aix).
var. erythia. S. France.
var. boabdil Espagne.
- S. semele.*
ab. les yeux sur fond jaune ocre. Suisse.
- S. statilinus.*
var. allionia. France (Var).
- S. dryas.*
ab. ♀ à 3 yeux bleus.
ab. de 44 mm. Savoie (Aix).
var. bipunctata. Mongolie.
- S. cordula.*
ab. ♀ très foncée, œil infér. double. Valais.
var. nana. Touran.
var. amasina. Arménie.
var. bryce. Sarepta.
ab. brune, 3 grands yeux pupillés de blanc aux ailes sup. et 2 petits yeux pupillés de blanc aux ailes infér. Valais et France (La Grave).
- Pararge achime.*
var. eximia. Amour.
- P. megaera.*
var. tigelius. Sardaigne.

- var. *lyssa*. Dalmatic.
- P. maera*.
 ab. ♀ très foncées.
 ab. ♀ très pâles, dessin effacé.
 ab. ♀ " " œil à 3 pupilles. Suisse et Savoie.
 var. *adrasta*. S. Allem.
- P. aegeria*. (Meone.)
 var. *intermedia* et passage à var. *aegerides*. Italie.
 var. *aegerides*. Suisse et Savoie.
 ab. ♂ presque sans taches.
 ab. ♂ taches blanchâtres.
 ab. ♀ grandes taches, aux extrémités des ailes seulement. Florence.
- Epinephele lycaon*.
 Petits exempl. ♀ de 30 mm.. moins colorés. Valais.
- E. hyperanthus*.
 ab. *arete*. Allem.
- E. jaurira*.
 ab. de 30 mm.
 ab. une aile infér. albine. Suisse.
 var. *hispulla*. Bilbao.
 var. *fortunata*. Canaries.
- Coenonympha arcania*.
 ab. ♀ bordure moins noire, de 37 mm. Savoie (Aix).
 var. *Darwiniana*. Valais.
 var. *satyrion*.
 ab. avec 2 gros points seulement dans la bande blanche dessous. Aix (Revard).
- ab. avec un petit filet blanc dessous. Aix (Revard).
- C. pamphilus*.
 ab. minor de 23 mm.
 ab. major de 34 mm. Suisse.
 var. *lyllus*. Andalousie.
 var. *marginata*. Mésopotamie.
 ab. passage à *lyllus*. S. France, Italie.
- C. tiphon*.
 var. *isis*. Laponie.
 var. *philoxenus*. N. Allem.
- Spilothyrus althaeae*.
 var. *baetica*. Andalousie.
- Syrichthus malvae*.
 ab. de 15 mm. Suisse.
- S. alveus*.
 var. *fritillum*. Suisse.
- S. cacaliae*.
 ab. sans taches blanches. Suisse.
- S. serratulae*.
 var. *caecus*. Autriche, H^t-Valais.
- Hesperia comma*.
 ab. *catena*. Tyrol.
- H. lineola*.
 var. *ludoviciae* (?). H^t-Valais.
- Nisoniades tages*.
 ab. *unicolor*. Arménie.
- Carterocephalus palaemon*.
 ab. ailes infér. noires, presque sans taches. Suisse.

II. Heterocera. Sphinges.

- Acherontia atropos*.
 ab. sans dessin sur le thorax, seulement une petite tache jaune. Savoie (Aix).
- Sphinx convolvuli*.
 ab. dessins très marqués et dessins effacés. Suisse.

- S. ligustri.*
ab. ailes supér. blanchâtres. Aix.
- S. pinastris.*
ab. dessins très marqués et dessins effacés.
ab. teintes variées du gris clair au gris-noir. Aix.
- Deilephila vespertilio.*
hibr. epilobii (vespertilio × euphorbiae). Vienne.
- D. euphorbiae.*
ab. tache rosée dans la bande vert foncé.
ab. taches vertes des ailes sup. agrandies et étendues dans l'aile.
ab. paralias. Aix et Suisse.
var. Grentzenbergi. Portugal.
- D. elpenor.*
ab. le noir envahit les ailes infér.
ab. à dessin effacé. Aix et Suisse.
- D. porcellus.*
ab. de 40 mm. Aix.
- Smerinthus ocellata.*
var. rosea.
hibr. hybridus (ocellata × populi). Saxe.
- S. tiliae.*
ab. de 58 mm. taches des ailes sup. séparées, petites.
ab. teinte foncée, large bande noire aux ailes infér.
ab. brune et verdâtre; ailés infér. vert foncé et marron.
ab. ulmi. Aix.
ab. brunnea. Berne.
- Ino cognata.*
var. subsolana. Hongrie.
- I. statices.*
var. Mannii. Espagne.
- Zygaena achilleae.*
ab. viciae. Hongrie.
var. tristis. Pyrénées.
- Z. pilosellae.*
ab. polygalae. Valais.
var. nubigena. Autriche.
- Z. exulans.*
var. vanadis. Laponie.
- Z. meliloti.*
var. confusa. Touran.
- Z. romeo.*
var. orion. H^t-Valais.
var. nevadensis. Andalousie.
- Z. favonia.*
var. Staudingeri. Algérie.
- Z. trifolii.*
ab. bordure large ailes infér.
var. confluens. Valais.
ab. orobi. S. Allem.
var. dubia. Valais.
- Z. transalpina.*
var. astragali. Nice.
- Z. filipendulae.*
var. Mannii. Autriche.
ab. cytisi.
ab. les points rouges réunis par deux. Valais.
ab. de 25 mm. Valais.
- Z. ephialtes.*
ab. medusa. Valais.
ab. trigonellae. Valais.
ab. coronillae. Hongrie.
var. peucedani. Savoie.
ab. athamanthae. Valais.
ab. aeacus. Autriche.
- Z. larandulae.*
ab. consobrina. Marseille.
- Z. stoechadis.*
ab. ailes inf. noires avec 3 taches rouges. Suse (Italie).
- Z. rhadamanthus.*
ab. cingulata. Espagne.

- | | | | | |
|--------------------------|---------------|--|---|----------|
| <i>Z. occitanica.</i> | | | <i>Z. carniolica.</i> | |
| ab. albicans. | Espagne. | | var. berolinensis. | |
| <i>Z. fraxini.</i> | | | ab. de 24 mm. | |
| ab. Scovitzii. | Amour. | | ab. hedysari. | |
| <i>Z. fausta.</i> | | | ab. taches rouges envahissant
les ailes sup. | |
| var. nicaeae. | S. France. | | ab. albina, le noir remplacé
par du blanc sauf une
petite bordure noire. Aix. | |
| var. jucunda. | Alpes. | | var. orana. | Algérie. |
| Grands exempl. de 30 mm. | | | | |
| | Suisse: Jura. | | | |

III. Bombyces.

- | | | | | |
|--|------------|--|--|-------------|
| <i>Nudaria murina.</i> | | | var. arideola. | S. Allem. |
| var. cinerescens. | Arménie. | | <i>L. lutarella.</i> | |
| <i>Sarrothripa undulana.</i> | | | var. pygmaeola. | Angleterre. |
| var. degenerana. | Livonie. | | <i>Gnophria rubricollis.</i> | |
| ab. brunâtre, dessin effacé. | | | ab. taches grises à l'extré-
mité des ailes sup. Aix. | |
| | Suisse. | | | |
| ab. dilutana. | Touran. | | <i>Deiopeia pulchella.</i> | |
| <i>Hylophila prasinana.</i> | | | ab. taches rouges et noires
plus grandes et plus serrées
sur fond grisâtre des ailes
sup. Berne? | |
| ab. à 3 bandes blanches. | | | | |
| ab. verdâtre, ailes supér. en-
cadrées de rouge. Aix. | | | <i>Emydia striata.</i> | |
| <i>Setina roscida.</i> | | | ab. melanoptera. | Paris. |
| ab. de 18 mm. | | | <i>E. cribrum.</i> | |
| var. melanomos. | Valais. | | var. candida. | Aix. |
| <i>S. irrorella.</i> | | | var. punctigera. | Tyrol. |
| var. Freyeri. | Valais. | | <i>Nemeophila plantaginis.</i> | |
| var. flavicans. | S. France. | | ab. ♀ ailes sup. jaunes sans
le dessin noir de la partie
médiane et 3 points noirs
à l'extrémité. | |
| var. Andereggi. | | | ab. matronalis, dont 2 ♀. | |
| var. riffelensis. | Valais. | | ab. hospita ♂. | |
| <i>S. Kuhlweini.</i> | | | ab. " base des ailes
infér. noire. | |
| var. alpestris. | Valais. | | ab. hospita ailes inf. blanches
sauf quelques points noirs. | |
| <i>S. aurita.</i> | | | ab. ♀ passage du type à
♀ matronalis. | |
| var. sagittata. | | | Aix (Revard) et Suisse: Jura. | |
| ab. ailes infér. sans taches. | | | | |
| ab. transiens. | | | | |
| var. ramosa. | | | | |
| ab. alpina. | | | | |
| ab. nervures noires très lé-
gères. | Valais. | | | |
| <i>Lithosia unita.</i> | | | | |
| var. palleola. | Hongrie. | | | |

N. russula.

ab. ♂ base et large bordure
noires aux ailes infér. Aix.

Callimorpha hera.

ab. lutescens. Bretagne.
var. magna. Algérie.
ab. de 45 mm. Savoie.

C. dominula.

ab. asymétrique. Aix.
var. minor de 38 mm. Saxe.
var. persona. Italie.
var. Romanovi.

Elevage Zurich (?).

ab. toutes les taches blanches
aux ailes sup. Aix.

Arctia caja.

ab. de 45 mm.
ab. asym.
ab. ail. sup. minces, allongées.
ab. sans taches à la partie
médiane des ailes sup.
ab. taches bleues reliées, aux
ailes infér.
ab. bandes blanches teintées
de rose.
ab. bandes blanches très
larges.
ab. ailes infér. rouge carmin.
ab. confluens. Aix.
ab. al. post. flav. Portugal.

A. villica.

ab. Brunhilda. Sicile.

A. purpurata.

ab. ailes sup. presque sans
taches.
var. atromaculata. Suisse.

A. maculosa.

var. simplonica. Alpes.

Pleretes matronula.

ab. asymétrique. ?

Spilosoma lubricipeda.

ab. zatima. Saxe.
ab. thor. nigro. ?

ab. ailes sup. jaunes, bor-
dure noire. Alsace.

hybr. lubric × zatima.
Angleterre.

S. fuliginosa.

ab. ailes infér. bordées de
noir.

ab. ailes sup. déformées.

ab. ailes infér. presque en-
tièrement noires. Aix.

S. mendica.

ab. rustica. Hongrie.

S. menthastri.

ab. à très petits points aux
ailes sup.

ab. à très petits points, un
seul grand aux ailes infér.

ab. à 3—4 points seulement.

ab. ailes sup. teintées de
jaune. Aix.

Cossus cossus.

ab. foncée.

ab. dessins très marqués sur
fond clair.

ab. de 63 mm. Aix.

Endagria ulula.

ab. marmorata. Asie min.

Psyche febretta.

var. lutea. Asie min.

Orgyia dubia.

var. splendida. Espagne.

Dasychira pudibunda.

ab. concolor. Stettin.

D. fascelina.

ab. ♂ und ♀ de haute mon-
tagne, teinte gris perle,
dessins très marqués en
noir. France (La Grave).

Psilura monacha.

ab. trans. ad eremita. Allem.

ab. eremita. Aix.

ab. asymétrique. Allem.

Ocneria dispar.

- ab. très claire.
 ab. ♂ de 32 mm.
 ab. ♀ de 40 mm. Aix.
 var. orientalis. Arménie.
 ab. demi-hermaphrodites.
 Coblenz.

Bombyx crataegi.

- ab. brune, dessins effacés
 (var. ariae?). Alpes.

B. castrensis.

- ab. ♂ de 23 mm. Grisons.

B. neustria (jaune).

- ab. ♂ de 22 mm.
 ab. passage à l'ab. brune.
 ab. brun foncé. Aix.
 ab. unicolor. N. Allem.

B. alpicola.

- ab. brun très foncé.
 H^t-Valais.

B. quercus.

- ab. ailes infér. angulaires.
 ab. raies jaunes très larges.
 var. subalpina (?).
 Suisse: Jura.
 var. alpina. Valais.
 var. Guillemotii. ?
 var. roboris. Nice.
 ab. spartii. Pyrénées.
 ab. callunae. Allem.

B. trifolii.

- ab. de 36 mm.
 var. medicaginis. Aix.
 var. cocles. Espagne.

Lasiocampa pini.

- ab. brunnea. Suisse: Jura.
 var. montana.
 ab. ♀ brun-rougeâtre, dessin
 seulement au bord des
 ailes sup.
 ab. ♀ tachetée brun et blanc,
 dessin effacé. Berne.

L. pruni.

- ab. de 35 mm. Aix.

L. quercifolia.

- ab. brun foncé. Aix.
 var. meridionalis. Dalmatie.
 ab. alnifolia. Hambourg.

L. populifolia.

- var. aestiva. Allem.

Saturnia pyri.

- ab. asymétrique. Aix.
 ab. ailes supér. blanchâtres.
 Paris.
 ab. très noire. Aix.
 hibr. Daubii (pavonia ♂ ×
 pyri ♀).
 hibr. Emiliae (pavonia ♂ ×
 pyri ♀). Elevage.

S. pavonia.

- ab. ♂ de 45 mm.
 ab. ♀ de 50 mm. Suisse.

Agria tau.

- ab. ♀ de 60 mm.
 Suisse: Jura.
 ab. lugens. ?
 ab. ferenigra. Thuringe.

Drepana binaria.

- ab. de 22 mm. Aix.

Harpyia vinula.

- ab. ♀ ailes supér. foncées.
 Aix.
 var. Delevoici. Algérie.

Hybocampa Milhauseri.

- ab. ailes supér. dessins effacés.
 Aix.

Notodonta trimacula.

- var. dodonaea. Aix.

Lophopteryx camelina.

- ab. plus foncée. Berne.
 ab. giraffina. ?

IV. Noctuae.

- Acronycta leporina.*
var. *bradyporina.* Autriche.
- A. menyanthidis.*
ab. large bande noire au bord
des ailes sup.
Jura bernois.
- A. rumicis.*
ab. brun foncé, dessins effacés.
Jura bernois.
- A. euphorbiae.*
var. *montivaga.*
ab. dessins noirs partie mé-
diane ailes sup.
Jura bernois.
- A. euphrasiae.*
ab. *esulae.* France.
- A. megacephala.*
ab. teinte noirâtre, tache or-
biculaire en rond blanc
très apparent.
ab. teinte brunâtre, espace
subterminal faisant large
tache grisâtre.
Jura bernois.
- A. aceris.*
ab. noirâtre, dessins élargis
et noirs.
ab. gris foncé, dessins élargis
et foncés. Jura bernois.
- Bryophila perla.*
ab. petites taches noires sur
fond blanc. Jura bernois.
ab. taches noires et larges
sur fond gris.
ab. dessin très net de tous
les points, traits et taches.
Aix.
- B. ravula.*
var. *ereptricula.* Aix.
- B. algae.*
ab. *mendacula.* Arménie.
- B. raptricula.*
ab. *deceptricula.* Allem.
- B. muralis.*
ab. dessins fondus dans le
fond verdâtre. Aix.
var. *par.* France.
- Agrotis multangula.*
ab. bord des ailes sup. très
noir (subrectangula?).
Jura bernois.
- A. festiva.*
ab. base des ailes sup. dessin
effacé jusqu'à la tache réni-
forme.
ab. brun rougeâtre, dessins
fondus (ab. *congener?*).
Jura bernois.
- A. triangulum.*
ab. teinte rougeâtre.
Jura bernois.
- A. fimbria.*
ab. ailes sup. brunes, dessin
brun foncé. Jura bernois.
ab. ailes sup. verdâtres, dessin
vert foncé (ab. *solani?*). ?
- A. linogrisea.*
ab. ailes sup. grises, dessins
brun clair. Valais.
- A. comes.*
ab. ailes sup. brun rougeâtre,
dessins effacés (ab. *pro-*
sequa?). Valais.
- A. janthina.*
ab. ailes sup. brun-rouge-
âtre, dessins effacés. Aix.
- A. pronuba.*
ab. *innuba.*
ab. ailes sup. brun foncé,
dessins effacés. Aix.
- A. puta.*
ab. *lignosa.* S. France.

- A. saucia.*
ab. margaritosa. S. France.
var. aequa. Jura bernois.
- A. ypsilon.*
ab. fond des ailes sup. jaun-
âtre, dessin en bandes noires
transversales, petit exem-
plaire de 40 mm.
Jura bernois.
- A. ripae.*
var. Weissenbornii. N. Allem.
- A. subrosea.*
var. subcaerulea. Livonie.
- A. vestigialis.*
var. magna. Suisse.
- A. baja.*
ab. grande tache brune partie
médiane des ailes sup.
Jura bernois.
- A. brunnea.*
ab. tache réniforme très
blanche. Jura bernois.
- A. segetum.*
var. pallida. Touran.
- A. forcipula.*
ab. teinte foncée, dessins
effacés. Suisse.
- A. nigricans.*
ab. de 30 mm., ailes étroites.
ab. teinte foncée, dessins
effacés. Jura bernois.
ab. rubricans. ?
- A. xanthographa.*
ab. cohaesa.
ab. teinte grise. Aix.
- A. corticea.*
ab. teinte grise, dessins noirs.
Valais.
- A. exclamationis.*
var. serena. Touran.
ab. teinte foncée, dessins noirs,
ailes infér. grises.
Jura bernois.
- ab. teinte grise.
Jura bernois.
- A. plecta.*
var. unimacula. Bilbao.
- A. tritici.*
var. aquilina.
var. eruta.
ab. très noire. Valais.
- A. obelisca.*
ab. plus noire.
ab. taches jaunes à la base
de l'aile sup. gauche.
Suisse.
- A. decora.*
ab. dessins très marqués en
noir.
ab. dessins effacés, ailes inf.
blanchâtres. Jura bernois.
- A. trux.*
ab. fond gris dessins très
marqués.
ab. fond gris dessins effacés.
ab. " " " très noirs
(obscurior?). Valais.
- A. cinerea.*
ab. brun foncé, dessins effacés.
Berne.
- A. prasina.*
ab. teinte brune.
Jura bernois.
- Charaeas granimis.*
ab. tricuspis. Valais.
ab. traits sagittés très ap-
parents. Jura bernois.
- Mamestra nebulosa.*
ab. teinte gris sale, dessins
moins marqués.
Jura bernois.
- M. leucophaea.*
ab. grande tache noire partie
médiane des ailes sup.
Jura bernois.

- M. brassicae*.
ab. noire, dessins effacés.
Jura bernois.
- M. pisi*.
ab. de 32 mm.
ab. fond très clair, dessins très marqués en brun, tache blanche très grande.
ab. ailes sup. brun rouge, dessins effacés.
Jura bernois.
- M. persicariae*.
ab. de 33 mm. Aix.
ab. unicolor. Allem.
- M. marmorosa*.
var. microdon. Aix.
ab. dessins fondus. Suisse.
- M. dentina*.
ab. latenai. Alpes.
- M. reticulata*.
ab. très noire. Jura.
var. unicolor. Touran.
- M. serena*.
var. obscura. Suisse.
ab. teinte grise. Aix.
- Dianthoecia carpophaga*.
ab. teinte gris-brun et jaunâtre.
ab. teinte brun foncé.
ab. dessins très marqués.
ab. " " effacés. Aix.
- D. filigrana*.
var. xanthocyanea. Valais.
- Polia rufocincta*.
ab. dessins très noirs.
Jura bernois.
- P. xanthomista*.
var. nigrocincta. Suisse.
- Aporophyla lutulenta*.
var. luneburgensis. N. Allem.
ab. ailes sup. noires, sans dessins. S. France.
- Episema glaucina*.
ab. tersina.
ab. dentimacula. Hongrie.
- Luperina matura*.
ab. ailes inf. brunes, bordure fondue. Aix.
- Dryobota protea*.
ab. de 23 mm. Aix.
- Apamea Dumerilii*.
var. diversa. Arménie.
- Miselia oxyacanthae*.
ab. de 35 mm. Jura bernois.
- Hadena rurea*.
ab. teinte brun foncé, dessins accentués.
ab. forma intermedia.
ab. alopecurus.
ab. " brun-noir.
Jura bernois.
- H. hepatica*.
ab. de 30 mm. Suisse.
- H. zeta*.
var. pernix. H^t-Valais.
- H. monoglypha*.
var. obscura. Jura bernois.
var. nigricans. Carlsbad.
- H. bicoloria*.
ab. furuncula. Allem.
- H. strigilis*.
ab. aethiops.
ab. latruncula. Aix.
- H. didyma*.
ab. teinte foncée.
ab. nictitans. Jura bernois.
ab. leucostigma.
var. moderata. Bilbao.
- H. unanimitis*.
ab. teinte foncée.
Jura bernois.
- H. basilinea*.
ab. teinte grisâtre de 34 mm.
Jura bernois.

- Euplexia lucipara.*
ab. de 27 mm. Aix.
- Mania maura.*
ab. espace terminal, ligne
coulée et bordure des ailes
infér. blanc sale. Suisse.
- Naenia typica.*
ab. fond des ailes sup. plus
clair, nervures très blan-
ches. Jura bernois.
- Hydroecia nictitans.*
ab. erythrostigma. Allem.
- Nonagria geminipuncta.*
var. pallida. Allem.
- N. arundinis.*
ab. fraterna. N. Allem.
- Grammesia trigrammica.*
ab. brune. Jura bernois.
- Leucania lythargyrea.*
var. argyritis.
ab. de 34 mm. Jura bernois.
- Caradrina exigua.*
var. pygmaea. Aix.
- Amphipyra pyramidea.*
var. magna. Amour.
- Taeniocampa incerta.*
ab. fuscata. Grisons.
- T. stabilis.*
ab. jaunâtre.
ab. brun foncé, de 32 mm.
Jura bernois.
var. grisea. Aix.
- Calymnia trapezina.*
ab. brun-rouge, dessins ef-
facés. Jura bernois.
- C. pyralina.*
ab. brun-noir, dessins effacés.
Suisse.
- Anchocelis lunosa.*
ab. gris foncé, dessins noirs.
S. France.
- Orthosia lota.*
ab. grisâtre de 34 mm.
- ab. teinte foncée. Jura bernois.
- O. circellaris.*
ab. brun rougeâtre. Berne.
- O. litura.*
ab. teinte foncée.
ab. ailes étroites, allongées.
Jura bernois.
- O. pistacina.*
var. grisea. Berne.
ab. serina. Autriche.
- O. rutililla.*
ab. brun rougeâtre.
S. France.
- O. nitida.*
ab. brun foncé. Berne.
- O. helvola.*
ab. gris-brun.
ab. brun foncé. Valais.
- Hoporina croceago.*
ab. jaune-brun, dessins ef-
facés. Jura bernois.
- Xanthia fulvago.*
ab. flavescens. ?
- X. aurago.*
ab. fucata. ?
- Scopelosoma satellitia.*
ab. brun foncé, tache blanche
à peine visible. Berne.
- Orrhodia ligula.*
ab. polita. Saxe.
- O. vaccinii.*
ab. mixta. Aix.
ab. spadicea. Saxe.
- O. rubiginea.*
ab. unicolor. Alsace.
- O. erythrocephala.*
ab. glabra. Valais.
- Xylina lambda.*
var. somniculosa. Berlin.
- X. furcifera.*
ab. brun foncé. Jura bernois.

- Calophasia lunula.*
ab. de 22 mm. Aix.
- C. casta.*
ab. barre noire de la ligne
coulée interrompue.
Valais.
- Plusia jota.*
ab. un seul point doré.
ab. brun foncé, ailes infér.
foncées.
ab. precontationis, tache en Y.
Jura bernois.
- P. pulchrina.*
ab. tache en Y. Jura bernois.
- P. gamma.*
ab. très noire, bordure ailes
infér. très noire.
Jura bernois.
- Heliothis ononis.*
ab. teinte grise. Valais.
- Anarta melanopa.*
var. rupestralis. Alpes.
- Acontia lucida.*
ab. très noire, trois taches
blanches aux ailes infér.
(lugens?). Vénétic.
var. albicollis. S. Russie.
- Thalpochara candidana.*
var. ? taches brunes au lieu
de la ligne subterminale.
Bilbao.
- Euclidia glyphica.*
ab. fond plus gris. Aix.
- ab. foncée, le noir envahit
presque toute l'aile infér.
ab. de 22 mm. Aix.
var. dentata. Amour.
- E. mi.*
ab. dessins effacés.
ab. fond des ailes sup. blanc
sale, une seule tache mé-
diane gris noir.
Jura bernois.
var. litterata. Allem.
- Catocala nupta.*
ab. ailes supér. foncées, tache
noire agrandie. Aix.
- C. sponsa.*
ab. taches très blanches et
agrandies aux ailes sup.
Jura bernois.
- C. hymenaea.*
ab. de 32 mm. Autriche.
- C. conversa.*
var. agamos. Bavière.
- Toxocampa pastinum.*
ab. de 27 mm. Aix.
- T. viciae.*
ab. de 27 mm. Jura bernois.
- Spintherops spectrum.*
ab. dessins beaucoup plus
marqués. Tyrol?
var. phantasma. Arménie.
- Brephos nothum.*
ab. brun foncé, dessins effacés.
Jura bernois.

V. Geometrae.

- Acidalia aversata.*
ab. jaunâtre.
ab. spoliata. Aix.
- A. inornata.*
var. deversaria. Altenbourg.
- A. virgularia.*
var. canteneraria. Nice.
- A. rusticata.*
var. mustelata.
ab. grande (méridionalis?).
Pyrénées.
- A. degeneraria.*
var. meridiaria?
ab. rubraria? Bilbao.

- A. politata.*
 var. abmarginata. Bilbao.
 ab. bande marginale grise effacée. Aix.
- Zonosoma punctaria.*
 var. subpunctaria. S. France.
 ab. ruficiliaria. Suisse.
- Z. porata.*
 ab. dessins plus foncés. Aix.
- Pellonia vibicaria.*
 ab. rouge répandu sur tout le bord des ailes. Aix.
- P. calabraria.*
 ab. bandes rouges très vives. Aix.
 var. tabidaria. Asie min.
- Stegania trimaculata.*
 ab. cognataria. Hongrie.
- Ellopia prosapiaria.*
 ab. prasinaria. Bohême.
- Abraxas marginata.*
 ab. pollutaria. Aix.
 ab. lignes médiane composée de gros points noirs sur les 2 ailes (nigrofasciata?). Aix.
 var. bicinctata. France (La Grave).
- Metrocampa margaritaria.*
 ab. ♀ de 28 mm.
 ab. ♀ de 46 mm.
 ab. ligne et espace médians teintés de brun. Aix.
- Eugonia fuscantaria.*
 ab. dessin effacé. Aix.
 ab. partie médiane très claire, partie marginale très foncée. Angleterre.
- E. quercinaria.*
 ab. equestraria. Rhin.
- E. autumnaria.*
 ab. points et bordure brun foncé. Aix.
- Selenia bilunaria.*
 ab. teinte grise. Aix.
 var. juliaria. Genève.
- S. tetralunaria.*
 var. aestiva. Allem.
- S. lunaria.*
 var. delunaria. Autriche.
- Crocallis elinguaria.*
 ab. trapezaria. ?
- Angerona prunaria.*
 ab. de 33 mm.
 ab. ♂ rouge brique, rayures et dessins très noirs.
 ab. ♂ jaune paille id. Aix.
 ab. ailes infér. blanches. ?
 ab. sordiatia ♂ et ♀. Aix.
- Rumina luteolata.*
 ab. de 26 mm. Aix.
- Macaria alternaria.*
 ab. fond brun violacé. Aix.
- M. liturata.*
 ab. fond brun violacé, ligne auté-marginale brun foncé, très marquée. Aix.
- Hybernia leucophaearia.*
 ab. marmorinaria. ?
- H. defoliaria.*
 ab. obscura. Berne.
- Amphidasis betularius.*
 ab. ♂ de 36 mm. (♀ 55 mm.). Aix.
 var. insularis (forma mixta). Dusseldorf.
- ab. Doubledayaria.
 ab. taches albinés, une aile infér. albine, déformée. Angleterre.
- Nychiodes lividaria.*
 var. amasina. Amasie.
- Synopsia sociaria.*
 ab. fond gris clair. Hongrie.

- S. serrularia.*
var. *phaeoleucaria.* Sarepta.
- Boarmia secundaria.*
ab. de 30 mm. Aix.
- B. crepuscularia.*
var. *defessaria.* Saxe.
- B. cinctaria.*
ab. ♀ fond blanchâtre, dessins très noirs. Aix.
ab. *consimilaria.* S. France.
- B. gemmaria.*
ab. ♀ dessins effacés.
ab. ♂ dessins très noirs sur fond gris-noir. Aix.
var. *perfumaria.* Ecosse.
- B. consortaria.*
var. toute noire, petit filet terminal blanc. ?
- B. repandata.*
ab. *destrigaria.*
ab. *conversaria.*
ab. passage du type à ces 2. ab. Aix.
- Gnophos glaucinaria.*
var. *falconaria.*
var. *plumbearia.* Autriche.
- G. dilucidaria.*
ab. (var.?) gris foncé. Suisse.
- G. obscuraria.*
var. *argillacearia.* S. France.
- G. sordaria.*
var. *mendicaria.* Valais.
- G. asperaria.*
var. *pityata.* France.
- G. caelibaria.*
var. *spurcaria.* Neuchâtel.
- G. obfuscaria.*
var. *canaria.* Tyrol.
- Dasydia tenebraria.*
var. *Wockearia.* Tyrol.
- Eurranthis plumistaria.*
ab. ♀ dessin effacé. S. France.
- Ematurga atomaria.*
ab. ♂ large bordure brun foncé.
ab. ♀ dessin effacé.
ab. ♀ dessin noir. Aix.
ab. ♀ dessin noir, barre noire longitudin., au milieu de l'aile sup. Italie.
- Selidosema ericetaria.*
ab. brun foncé. Angleterre.
- Phasiane clathrata.*
ab. dessins noirs très larges. Aix.
- P. glarearia.*
ab. simple pointillé noir sur fond blanchâtre. Vénétie.
- Ortholitha bipunctaria.*
ab. teinte brune. Berne.
ab. *gachtaria.*
ab. dessins brun noir.
var. *nigra.* (?) Bilbao.
var. *maritima.* Alpes mar.
ab. large bande médiane toute brune. ?
- Siona decussata.*
ab. *fortificata.* Hongrie.
- S. nubilaria.*
var. *exalbata.* Sarepta.
- Anaitis praeformata.*
ab. dessins effacés. Aix.
- A. paludata.*
var. *imbutata.* Poméranie.
- Eucosmia certata.*
ab. brun rougeâtre. Hesse.
var. *simplonica.* Simplon.
- Lygris testata.*
ab. de 23 mm. Saxe.
- Cidaria bilineata.*
ab. dessins effacés.
ab. " très noirs. Jura bernois.
- C. albulata.*
var. *griseata.* (?) Aix.

- C. ferrugata.*
ab. spadicearia. Jura bernois.
- C. siterata.*
ab. brune, dessins fondus.
Jura bernois.
- C. sordidata.*
ab. fusco-undata.
ab. brun verdâtre, dessins
très marqués. Jura bernois.
- C. variata.*
ab. dessins noirs.
ab. fond blanchâtre, de 33 mm.
ab. stragulata. Jura bernois.
var. obeliscata. Saxe.
ab. dessins fondus.
Jura bernois.
- C. trifasciata.*
var. literata. Grisons.
ab. dessins brun-noir sur fond
blanchâtre.
ab. dessins fondus.
Jura bernois.
- C. nebulata.*
var. achromaria. (?) Aix.
- C. truncata.*
ab. brune, dessins fondus. ?
ab. perfuscata. Angleterre.
- C. immanata.*
ab. foncée, petite.
Angleterre.
var. scotica. Ecosse.
- C. miata.*
ab. grise, dessins fondus.
ab. vert foncé, dessins noirs.
Jura bernois.
- C. salicata.*
var. gris foncé. Aix.
- C. hastata.*
var. subhastata. Valais.
- C. flavicinetata.*
var. brune. Jura bernois.
- C. silacea.*
ab. bande médiane noire (sans
nervures blanches).
Jura bernois.
- C. corylata.*
ab. dessins brun noir, très
marqués, de 32 mm.
Jura bernois.
- C. dilutata.*
ab. dessins très marqués en
brun noir.
ab. obscurata.
var. autumnata. Jura bernois.
- C. caesiata.*
ab. annosata? Jura bernois.
- C. montanata.*
ab. fond gris. Aix.
- C. unifasciata.*
ab. aquilaria. Autriche.
- V. simulata.*
var. geneata.
France (Lautaret).
- C. nigrofasciaria.*
ab. de 23 mm. Jura bernois.
- Eupithecia subvulvata.*
ab. oxydata. Wiesbaden.
- E. pumilata.*
var. pauxillaria. Bilbao.
-

