

Description d'une sous-espèce nouvelle de Lymantriide marocaine

Autor(en): **Audeoud, G.E.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =
Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the
Swiss Entomological Society**

Band (Jahr): **16 (1934-1936)**

Heft 6-7

PDF erstellt am: **11.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-400830>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

**Description d'une sous-espèce nouvelle
de Lymantriide marocaine**

par

le D^r G. E. AUDEOUD.

Laelia impura Her, **brauni** n. ssp.

(Pl. V, fig. 7.)

♀ Palpes ochracés. Antennes blanc grisâtre en dessus, pectination noire. Front blanchâtre. Thorax gris en dessus, blanc en dessous. Tibias et tarses brunâtres en dessus, couverts de longs poils blancs en dessous.

Ailes antérieures à fond gris blanc légèrement teinté de brunâtre clair. Les nervures brun noirâtre. A part un assez étroit espace sous-costal au tiers proximal, où seule la couleur fondamentale apparait, l'aile tout entière est assez densément et uniformément saupoudrée de brun noirâtre. Franges grises, interrompues de traits blanchâtres à l'extrémité des nervures sauf à l'apex.

Ailes postérieures blanc grisâtre, se fonçant progressivement vers leur bord extérieur. Nervures gris-brun clair. Très fine ligne terminale brunâtre. Franges blanc grisâtre.

Abdomen: Les trois premiers anneaux en dessus, les deux premiers seulement en dessous, sont blanchâtres, le reste gris teinté de fauve.

Envergure: 42 mm. 1 exemplaire capturé à Agadir le 3 avril 1926, à la lumière; type; dans ma collection (plus tard au Museum d'Histoire naturelle de Genève).

Diffère d'*impura* Her. en ce que les ailes inférieures sont grises et non blanc pur, et en ce que l'abdomen n'est blanc qu'à sa partie proximale, tout le reste étant gris fauve. Ces deux caractères le rapprochent par contre de la sous-espèce *promissa* Her. de l'Afrique orientale anglaise.

Ce papillon, obligeamment examiné par MM. Le CERF et COLLENETTE, m'est revenu étiqueté par ce dernier comme ssp. nov. Je le dédie à M. BRAUN-BLANQUET, l'organisateur et le chef des deux excursions scientifiques suisses au Maroc auxquelles j'ai eu le plaisir et le privilège de prendre part.

La capture est intéressante du fait que l'espèce est nettement éthiopienne: la forme patronymique se trouve en Abyssinie, et la seule sous-espèce décrite jusqu'ici, *promissa* Her., vient de l'Afrique orientale anglaise. Nous avons là apparemment l'un des quelques témoins de l'époque relativement récente où le Sahara n'était pas aussi imperméable qu'actuellement. On peut en dire probablement autant de *Ilema* (ou *Lithosia*) *bipuncta* Hb. dont j'ai capturé deux exemplaires les 24 et 25 avril 1926 à Kénitra (actuellement Port Lyautey), car si cette espèce a été prise dans l'extrême sud de l'Europe, elle est pourtant nettement éthiopienne.