

Zeitschrift: Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =
Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss
Entomological Society

Band: 29 (1956)

Heft: 2

Artikel: Synonymie et homonymie de quelques Plécoptères

Autor: Aubert, Jacques

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-401269>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 23.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Synonymie et homonymie de quelques Plécoptères

par

JACQUES AUBERT

Musée zoologique, Lausanne

(Travail effectué à l'aide d'un subside du Fonds national suisse
de la Recherche scientifique)

En 1952 (Plécopt. décrits par le R. P. L. NAVAS, ce Bulletin, vol. 25, p. 245), j'ai proposé la synonymie de *Nemoura caudata* NAVAS 1924 avec *Nemoura monspessulana* DESPAX 1930 après examen des types des deux espèces. En 1902, KLAPALEK avait décrit une *Nemoura bolivari* du Rio Moro, en Espagne, et en 1865, EDOUARD PICTET avait découvert, dans la Sierra de Guadarrama une *Nemoura lacustris*, caractérisée par la tête entièrement brun rouge.

Au printemps 1954, j'ai capturé des *Nemoura* (♂ et ♀) à tête entièrement brun rouge dans la Sierra de Guadarrama (la plupart des *Nemoura* ont la tête entièrement brun noir ; quelques-unes ont une bande transverse brun rouge sur la nuque). Elles correspondent évidemment à l'insecte décrit et dessiné par ED. PICTET et leurs génitalia correspondent à celles des formes de KLAPALEK, NAVAS et DESPAX. Aussi, je propose la mise en synonymie suivante :

Nemoura lacustris ED. PICTET 1865 = *N. bolivari* KLAPALEK 1902 = *N. caudata* NAVAS 1924 = *N. monspessulana* DESPAX 1930.

Cela m'oblige à donner un nouveau nom à une autre *Nemoura* que j'avais attribuée, en 1952, à *N. lacustris* ED. PICTET et que j'ai également retrouvée en 1953 et en 1954 dans la Sierra de Guadarrama. Cette Némoure appartient au sous-genre *Protonemura* et a seulement la nuque rougeâtre.

Nemoura (Protonemura) peñalara nom. nov. = *N. (Protonemura) lacustris* AUBERT 1952 (Plécopt. récoltés en Espagne par M. F. SCHMID, EOS, 28), nec ED. PICTET.

En 1954, j'ai décrit dans ce Bulletin (27, p. 132) une *Leuctra variabilis* capturée dans le val Sesvenna, en Engadine. Or, J. F. HANSON a décrit, en 1941 (Bul. Brooklyn. Ent. Soc., 36, p. 62) une *Leuctra variabilis* américaine. Je dois donc donner un autre nom à l'espèce suisse et je propose ***Leuctra helvetica*** nom. nov.