

Zeitschrift: Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =
Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss
Entomological Society

Band: 30 (1957)

Heft: 2

Artikel: Quelques Apidae (Hymén.) de l'Afrique du Nord

Autor: Benoist, R.

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-401312>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 15.10.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Quelques Apidae (Hymén.) de l'Afrique du Nord

par

R. BENOIST
Bois-le-Roi, France

Je cite dans cette note quelques Apidae nord-africains du Musée zoologique de Lausanne, qui ont été récoltés récemment par divers entomologistes suisses.

Prosopis bipunctata F. (*pratensis* GEOFFR., *signata* PANZ.).
Algérie, El Affroun, 10.IV.1950, 1 ♂, J. AUBERT.

Prosopis Fertoni VACHAL.
Algérie, Misserghin, 25.III.1950, 3 ♀; Fort-de-l'Eau, 15.IV.1950, 1 ♂, J. AUBERT

Prosopis leptodactyla J. PÉREZ.
Algérie, Fort-de-l'Eau, 16.IV.1950, 1 ♂, J. AUBERT.

Prosopis clypearis SCHENCK.
Algérie, El Affroun, 10.IV.1950, 2 ♂, J. AUBERT.

Prosopis pictipes NYLANDER.
Algérie, El Affroun, 10.IV.1950, 1 ♀, J. AUBERT.

***Prosopis lactipennis* nov. sp.**

Algérie, Beni-Abbès, 1-4 avril 1950, 2 ♀, J. AUBERT.

Coloration. ♀ noire ; sont blanc jaunâtre : une tache oblique sur chaque joue contiguë au bord de l'œil à son extrémité supérieure et au clypeus à son extrémité inférieure, une ligne interrompue au milieu sur le pronotum, les tubercules huméraux, une tache sur les écailles alaires (leur bord transparent), les genoux de toutes les pattes, le côté externe des tibias I et II, les tibias III (sauf une petite tache noire du côté postérieur), les métatarses ; les autres articles des tarses un peu rembrunis. Funicule des antennes brunâtre en dessus, testacé rougeâtre en dessous. Ailes blanchâtres, stigma et nervures testacés.

Pilosité. Pilosité courte et rare ; le premier tergite abdominal non frangé.

Morphologie. ♀ 4-5 mm. Tête, vue de face, aussi longue que large, un peu rétrécie vers le bas, bords internes des yeux convergents en avant ; sur la tête vue de côté, les tempes beaucoup plus étroites que l'œil ; vue en dessus la tête rétrécie derrière les yeux ; mandibules terminées en pointe aiguë ; tubercule du labre transversal ; espace malaire très court, linéaire, presque nul ; clypeus et joues très finement réticulés avec des points dispersés, superficiels ; aire supraclypéale avec un fin sillon longitudinal médian ; front à ponctuation fine ; vertex finement rugueux au milieu, assez brillant sur les côtés où la ponctuation est fine et peu dense ; sillon oculaire se recourbant à son extrémité supérieure vers l'ocelle pair correspondant. Pronotum mince, un peu épaissi latéralement. Mesonotum à points irréguliers, les intervalles plus grands que les points, un peu brillants, à réticulation peu distincte ; mésopleures à ponctuation semblable, les points plus arrondis ; scutellum convexe à ponctuation semblable à celle du mesonotum ; postscutellum mat, finement rugueux. Triangle du propodeum orné d'un réseau de rides peu saillant, sa troncature non bordée d'une ligne élevée sur les côtés ni en arrière de l'aire stigmatique. Premier tergite abdominal poli et brillant, sa ponctuation fine, les points irréguliers, peu denses, les intervalles sans réticulation visible ; les tergites suivants à ponctuation plus fine encore, les intervalles peu brillants, peu distinctement aciculés. Sternites à réticulation évidente, la ponctuation à peu près nulle.

Colletes Eatoni MORICE.

Algérie, Biskra, 24.V.1948, 1 ♀, J. DE BEAUMONT, 27.V.1948, 1 ♀, R. M. NAEF.

Colletes acutus PÉREZ.

Algérie, Guyotville, 8.IV.1950, 1 ♀, J. AUBERT.

Colletes flavescens NOSKIEWICZ.

Maroc, Tizin'Test, 3.IX.1935, 9 ♂, R. M. NAEF.

Colletes nanus FRIESE.

Algérie, Béni-Abbès, 1-4.IV.1950, 1 ♀, 3 ♂, J. AUBERT.

Colletes pumilus MORICE.

Algérie, Béni-Abbès, 1-4.IV.1950, 1 ♂, J. AUBERT.