

4. Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Schweiz

Autor(en): **Linder, A.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =
Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the
Swiss Entomological Society**

Band (Jahr): **41 (1968)**

Heft 1-4

PDF erstellt am: **17.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-401559>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

4. Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Schweiz

von

A. LINDER
Uetligen b. Bern

In den Jahren 1937, 1946 und 1953 habe ich in den Bänden XVII, XX und XXVI der « Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft » Listen von Käferarten publiziert, deren Vorkommen in der Schweiz bisher unbekannt war.

Seit 1953 wurde durch intensive Sammeltätigkeit verschiedener Coleopterologen des In- und Auslandes sowie durch Revision alter Sammlungsbestände durch Spezialisten die Zahl der aus der Schweiz bekannten Käferarten um weitere 300 vermehrt.

In der nachfolgenden Liste werden die Familien der Scydmaenidae, Ptiliidae und Pselaphidae nicht berücksichtigt. Die zahlreichen neuen Arten aus der Schweiz, die in diese Familien gehören, werden zu gegebener Zeit vom Spezialisten dieser Gruppe, Herrn Dr. Cl. Besuchet, publiziert werden.

Seit meinem letzten Nachtrag wurden folgende wichtigere Arbeiten über die Coleopteren-Fauna der Schweiz publiziert :

- BÄNNINGER, M., 1959. *Die schweizerischen Arten der Gattung Nebria* LATR. Mitt. schweiz. ent. Ges., 32.
- BESUCHET, C., 1963. *Coléoptères endogés des environs de Genève*. Mitt. schweiz. ent. Ges., 36.
- HANDSCHIN, E., 1963. *Die Coleopteren des schweizerischen Nationalparkes und seiner Umgebung*. Kommission der Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft zur wissenschaftl. Erforschung des Nationalparks, 8 (49).
- HUGENTOBLER, H., 1966. *Beitrag zur Kenntnis der Käfer der Nordostschweiz*. Naturwissenschaftl. Gesellschaft St. Gallen.
- POCHON, H., 1964. *Buprestidae*. Insecta Helvetica, Fauna, 2.
- REHFOUS, M., 1955. *Contribution à l'étude des Insectes des Champignons*. Mitt. schweiz. ent. Ges., 28.
- SCHEERPELTZ, O., 1965. *Die von Herrn A. Linder auf dem Gebiete der Schweiz entdeckten neuen Arten von Staphyliniden*. Mitt. schweiz. ent. Ges., 38.

In allen diesen Publikationen — mit Ausnahme der Arbeit von M. BÄNNINGER — werden für die Schweiz neue Arten gemeldet. Die Arten, die Hugentobler als neu für die Schweiz anführt, habe ich in meine Liste aufgenommen, da seine Arbeit nur in kleiner Zahl als Vervielfältigung erschienen ist.

Meiner Liste habe ich in Anordnung und Nomenklatur den « Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae », A. WINKLER, Wien 1924-1932, zugrunde gelegt.

Allen meinen Sammelfreunden im In- und Ausland, die mir in selbstloser Weise über ihre Neufunde Angaben geliefert haben, danke ich herzlich.

Abgeschlossen am 15. März 1968.

Carabidae

Carabus catenulatus SCOP. Riva San Vitale, an den Hängen des Monte San Giorgio in Anzahl geködert (BARI).

Leistus rufescens FABR. Bereits von mir in einem früheren Nachtrag von Muntelier (POCHON leg.) gemeldet. Walenstadtberg, ca. 1100 m, im Uferschotter eines Bergbaches, 17.VI.59, 2 Ex. (SPÄLTI). Reutigenmoos BE, VII.65, in Anzahl beim Treten der Moose und Gräser im Sumpfgelände (SCHERLER).

Notiophilus pusillus WATERH. Oberengadin, VIII.46, 1 Ex. gesiebt (TOUMAYEFF). Fiesch VS, VIII.60, 2 Ex. aus faulendem Laub unter *Prunus padus* gesiebt (LINDER).

Notiophilus hypocrita CURT. Jaman, 4 Ex. im Moos (SCHERLER). Chasseral, VII.53, Dent de Vaulion, V.54, Mont Tendre, V.55, mehrere Ex. (SERMET). Mte. Generoso, 23.VII.51, 1 Ex. nahe dem Gipfel unter Stein (BESUCHET). Zihlschlacht, Hudelmoos, 11.XI.63, 1 Ex. (HUGENTOBLE). Dents du Midi, Pointe de Bellevue, 1 Ex. (SCHERLER). Chasseral, VI.50, 1 Ex., Origlio, Seeufer, X.58, 1 Ex., Muolen, Hudelmoos, XI.63, 1 Ex. (LINDER).

Notiophilus substriatus WATERH. Genf, 3 Ex. im Genfer Museum (TOUMAYEFF i. l.). Chiasso, 24.VIII.67, 1 Ex. gesiebt (SCHERLER).

Dyschirius similis PETRI. Zernez, Innufer, 1 Ex. (SERMET). Visp, Rhoneufer, VI.45, 1 Ex., VI.46, 3 Ex., Freiburg, Saaneufer, V.53, 1 Ex., Bern, Lehmaufschüttung am Aareufer im Bremergartenwald, IV. und V.57, 7 Ex. (LINDER).

Bembidion starcki SCHAU. Schinznach, V.53, 1 Ex. aus Lehmsprüngen von ausgetrocknetem Altwasserboden getreten (LAUTNER).

Bembidion virens GYLL. Diese hochnordische Art wird bereits von STIERLIN von Genf aufgeführt. Das Vorkommen in Mitteleuropa wurde dann von verschiedenen Autoren bestritten. Das Tierchen ist an den Ufern des Genfersees zwischen Préverenges und Genf an vielen Stellen von mehreren Sammlern (BESUCHET, REGNIER, SERMET, TOUMAYEFF, LINDER) in vielen Ex. (Massenfund bei Préverenges 20.III.55 : 50 Ex.) erbeutet worden, besonders unter angeschwemmtem Detritus. Belegexemplare wurden von DE MONTE und SCHULER verifiziert.

Bembidion jaqueti JEANN. Furka, 19.VII.51, 3 Ex. unter Steinen, Bänzberg UR, 23.IX.50, 1 Ex. unter Stein, S. Giacomo TI, 20.X.50,

1 Ex. unter Stein, Lago Efra TI, 26.VII.51, 1 Ex. unter Stein (BESUCHET leg., DE MONTE det.).

Bembidion alpicola JEANN. Anzeindaz, 31.VII.55, 1 Ex. auf 2000 m an Schneefleck (BESUCHET leg., SCHULER det.), Gemmi, Passhöhe, 14.VII.52, 12 Ex. an Schneefleck, Daubensee an der Gemmi, 14.VII.54, 1 Ex. unter Stein (BESUCHET leg., DE MONTE det.). Hohtürli, VII.39, 2 Ex., Weissmieshütte, VIII.51, 8 Ex., Piz Griatschoul, VII.52, 6 Ex. (LINDER leg., DE MONTE det.).

Bembidion intractabile DE MONTE. Furka, VII. und VIII.36, 3 Ex., Saas-Plattjen, VII.51, 3 Ex., Weissmieshütte, VIII.51, 1 Ex. (LINDER leg., DE MONTE det.).

Scotodipnus subalpinus BAUDI. Am Monte Bar und an allen Hängen des Monte Tamaro auf 1300–1400 m von mehreren Sammlern zahlreich aus faulendem Buchenlaub gesiebt (BESUCHET, FOCARILE, SCHERLER, SERMET, LINDER).

Badister dilatatus CHAUD. Les Bioux, Jura vaud., IX.64, 2 Ex. (TOUMAYEFF).

Harpalus vernalis DFT. Die Art ist in der Westschweiz, in den Kantonen Genf, Waadt und Wallis weit verbreitet und nicht selten. Lausanne, St. Sulpice, Morges, Genf (TOUMAYEFF), Martigny, Zeneggen (ALLENSPACH), St. Prex, Fiesch (LINDER). Wahrscheinlich beziehen sich alle Fundortangaben für *Harpalus picipennis* DFT. auf *vernalis* DFT.

Bradycellus csikii LACZO. Pfyn TG, im Geröll an der Thur, III.56, 1 Ex. (HUGENTOBLE), IX.56, 1 Ex. (LINDER).

Pterostichus melas CREUTZ. ssp. *italicus* DEJ. Mendrisio, V.43, 1 Ex. auf der Strasse laufend, Tremona, IX.67, 1 Ex. unter Stein (LINDER).

Calathus piceus MARSH. Allondon GE, 17.VI.64, 4 Ex. aus durren Blättern gesiebt (SCHERLER).

Agonum livens GYLL. Altenrhein, 21.V.61, 1 Ex., 9.IV.64, 6 Ex. (HUGENTOBLE), V.61, 3 Ex., IV.66, 5 Ex. (LINDER). Die Tierchen wurden in der Mehrzahl aus dem faulen Holz liegender Pappelstämme gesiebt.

Platynus longiventris MNNH. Altenrhein, 5.X.58, 2 Ex. (HUGENTOBLE), IV.66, 10 Ex., IX.66, 4 Ex. unter loser Rinde alter, stehender und gestürzter Pappelstämme (LINDER).

Dromius angustus BRULLÉ. Yverdon, im Winter zahlreich unter Platanenrinde (SERMET), Mörschwil SG, 17.XI.58, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., SOKOLOWSKI det.).

Cymindis variolosa FABR. Die schöne, bereits von FONTANA als selten aus dem Tessin gemeldete Art ist von Mai bis August im Verzascatal (Sonogno, Frasco, Gerra) unter Steinen in den mageren, mit Steinen übersäten Wiesen am Fluss recht häufig (BESUCHET, SCHERLER, LINDER). Biasca, V.49, VII.58, VI.63, total 6 Ex. (ALLENSPACH).

Haliplidae

Haliplus heydeni WEHNCKE. Die Art scheint weit verbreitet und recht häufig zu sein. Es sind mir folgende Funde gemeldet : La Sagne, La Brévine, Bôle NE, Ponts-de-Martel, Chaux-de-Fonds, Le Locle (AELLEN leg., MOUCHAMPS det.), Grabs SG, Hagenwil TG (Hudelmoos), Hemberg SG (HUGENTOBLER leg., HOCH det.), Weite SG (SPÄLTI leg., HOCH det.).

Haliplus immaculatus GRH. Hemberg SG, 59, 1 Ex. (HUGENTOBLER leg., HOCH det.).

Dytiscidae

Bidessus grossepunctatus VORBR. Burgäschisee, Moortümpel, Reutigen BE, Waldtümpel, häufiger als *unistriatus* ILLIG. (LINDER leg., HOCH det.). Sicherlich über das ganze Mittelland verbreitet und häufig.

Hydroporus neglectus SCHAUM. Les Grangettes bei Villeneuve, 5.IV.59, 2 Ex. aus kleinem Kanal gefischt (SCHERLER).

Agabus melanarius AUBÉ. Oberhalb Gryon, 20.IV.47, 1 Ex. in Moortümpel, Taveyannaz, 1600 m, 14.VIII.49, 1 Ex. in Tümpel, Chalet-à-Gobet, 30.IV.52, 1 Ex. in Wasserlache (BESUCHET). St. Gallen, Schattenbach in die Sitter, VI.56, 2 Ex. (TOUMAYEFF). Grabs SG, 1959, 2 Ex. im Torfmoor Gamperfin (HUGENTOBLER).

Ilybius aenescens THOMS. La Chaux bei Tramelan, IX.55, 1 Ex., VI.51, 3 Ex. in Moorgräben, La Brévine, VI.59, 8 Ex. in Moortümpel (LINDER).

Rhantus latitans SHP. Altenrhein, VI.60 und VII.61, mehrere Ex. in grossem Tümpel (HUGENTOBLER, LINDER).

Hydrophilidae

Hydraena sternalis REY. Uttwil TG, 23.VIII.62, 1 Ex. (HUGENTOBLER leg., HOCH det.).

Hydraena subimpressa REY. Muggio, VIII.65, 3 Ex. unter Steinen in Bergbach (LINDER leg., HOCH det.).

Hydraena lapidicola KSW. Soubey BE, V.49, 1 Ex. unter Stein im Doubs, Muggio, VIII.62 und VIII.65, 8 Ex. unter Steinen in Bergbach (LINDER leg., HOCH det.).

Hydraena italica GANGLB. Muggio, VIII.62, 1 Ex. unter Stein in Bergbach, Miglieglia, VII.62, 2 Ex. (LINDER leg., HOCH det.).

Hydraena truncata REY. Muggio, VIII.62, 1 Ex., VIII.65, 3 Ex. unter Steinen in Bergbach (LINDER leg., HOCH det.).

Limnebius nitidus MRSH. St. Gallen, 1965, 2 Ex. (HUGENTOBLER).

Limnebius aluta BED. Zwischen Cossonay und La Chaux, 8.X.51, 15 Ex., 27.VIII.52, 14 Ex., in einem Weiher (BESUCHET).

Helophorus arvernicus MULS. Es liegen mir von dieser Art zahlreiche Meldungen vor : St. Gallen, Aesch BL (TOUMAYEFF), Bülach, Frauen-

feld (LAUTNER), Pfyn TG, St. Gallen, Mörschwil SG (HUGENTOBLER), Brugg (ALLENSPACH), Rossinière VD (SCHERLER), Pfyn TG, Lac de Joux, Soubey BE (LINDER). Die Art lebt am Ufer im Boden und unter dem angeschwemmten Detritus.

Helophorus asperatus REY. Stein AR, 1960, 1 Ex. (FREY leg., HOCH det.).

Helophorus fallax KUW. Genf, Mai, 1 Ex. (TOUMAYEFF). Burgäschisee, Moortümpel, V.29, 3 Ex., VIII.29, 2 Ex., X.34, 2 Ex. (LINDER).

Cercyon marinus THOMS. Egnach TG, 30.X.64, 1 Ex. (HUGENTOBLER leg., LOHSE det.). Erlach, IX.59, 1 Ex. im Seegenist (LINDER).

Cercyon laminatus SHP. Adventivart aus Ostasien, seit etwa 1940 in ganz Mitteleuropa eingebürgert, fliegt im Hochsommer abends gerne ans Licht. St. Gallen (HUGENTOBLER), Minusio (ALLENSPACH), Yvorne, Vevey (SCHERLER), Uettligen BE, Aarberg (LINDER), Bern, Martigny, Ausserberg VS (SCHMIDLIN).

Cryptopleurum subtile SHP. Ebenfalls Adventivart aus Ostasien. Vevey, 5.IX.53, 5 Ex. aus Mist gesiebt (SCHERLER). St. Gallen, 2.VII.60, 2 Ex. gesiebt (HUGENTOBLER). Zuzwil SG, 2.VII.60, 5 Ex. aus Müllhaufen gesiebt (SPÄLTI).

Silphidae

Choleva spadicea STURM. Mt. Pélerin, 30.XII.53, 1 Ex., 17.XI.56, 1 Ex., 22.XII.56, 6 Ex., alle in Maulwurfsgängen (SCHERLER). Uettligen BE, IX.65, 1 Ex. aus Laub an Waldrand gesiebt (LINDER).

Choleva breiti JEANN. Mt. Tendre, VI.55, 1 Ex., im Moos, Tour d'Ai, 1960 (SERMET). Rochers de Naye, 15.VII.55, 1 Ex. in Maulwurfsgang (SCHERLER).

Choleva solarii JEANN. Yverdon, XI.55, 6 Ex. (SERMET).

Choleva bicolor JEANN. Les Grangettes bei Villeneuve, 9.IV.56, 1 Ex., La Fouly (Val Ferret), 1700 m, 29.VIII.57, 1 Ex. in Maulwurfsgängen (SCHERLER).

Choleva glauca BRITT. Rochers de Naye, 15.VII.55, 7 Ex., Solalex VD, 29.VIII.56, 1 Ex., Ueschinental bei Kandersteg, 11.VIII.56, 1 Ex., alle in Maulwurfsgängen (SCHERLER).

Choleva fagniezi JEANN. Im Museum Genf 7 Ex. vom Salève und von Carouge (SERMET i. l.). Curtilles VD, 4.IV.56, 2 Ex., Mt. Pélerin, 24.XII.55, 2 Ex., Aigle, 6.V.56, 1 Ex., Les Grangettes bei Villeneuve, 9.XII.56, 2 Ex., alle in Maulwurfsgängen (SCHERLER).

Catops nigricantoides REITT. Val d'Anniviers, 2300 m, 1 Ex. in Mäusenest (HENRIOT). Rochers de Naye, VI.58, 3 Ex. (SERMET). Gryon, 1.VI.47, 1 Ex., Muggio, 17.IX.55, 1 Ex. in Kastanienstrunk (BESUCHET leg., SERMET det.). Frauenfeld, 1955 und 1956, je 1 Ex. (HUGENTOBLER leg., LOHSE det.).

Catops joffrei DEV. Die Art ist in Murmeltierbauten wohl über das ganze Gebiet der Schweizeralpen verbreitet. Col de Balme, VII.60,

1 Ex. (SERMET). Col de Balme, 10.VII.55, 1 Ex. auf 2000 m in Murrenbau (BESUCHET leg., SERMET det.). La Fouly VS, VIII.63, 1 Ex. (TOUMAYEFF). La Fouly VS, 29.VIII.57, mehr als 50 Ex. in Murrenbau geködert (SCHERLER). Scans GR, VIII.52, 5 Ex. in Murrenbau geködert (LINDER).

Catops westi KRÖG. Von dieser Art liegen zahlreiche Meldungen vor: Yverdon, III.52, 2 Ex. in Maulwurfsnest (SERMET). Trélex VD, X.50, 1 Ex. (REHFOUS). Buch TG, 1955, Frauenfeld, 1956 (HUGENTOBLE leg., SOKOLOWSKI det.). Marbach SG, 26.XII.57, 1 Ex. an toter Maus (SPÄLTI leg., SOKOLOWSKI det.). Curtilles VD, 12.IV.62, 3 Ex., 4.IV.61, 1 Ex., 29.VIII.55, 1 Ex., in faulen Pilzen, Les Grangettes bei Villeneuve, 29.X.55, 2 Ex. in faulen Blättern, Allondon GE, 17.VI.61, 1 Ex. in faulen Blättern (SCHERLER).

Colon armipes KR. Chancy GE, 2.VI.61, 2 Ex., 25.X.62, 2 Ex. in gewaschener Erde (BESUCHET).

Liodidae

Hydnobius danieli VOGT. Camoghè TI, 1800 m, 7.VIII.63, 1 Ex. unter Stein (BESUCHET leg., VOGT det.).

Hydnobius spinipes GYLL. Alpe Tracuit bei Zinal VS, 2000 m, 20.IX.59, 1 Ex. im Moos (BESUCHET leg., VOGT det.).

Liodes skalitzkiji GANGLB. St. Moritz GR, VIII.55, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., v. PEEZ det.).

Liodes sparre-schneideri STRAND. Haut de Bagne VS, 19.VIII.1893, 1 Ex. unter Stein (BUGNION leg., v. PEEZ det.). Salanfe VS, 1900 m, 27.VI.64, 5 Ex. am Rande eines Wasserkanals, Fafferalp VS, 1500 m, 14.VIII.64, 1 Ex. (STEFFEN leg., v. PEEZ det.). Strada GR, 21.VIII.55, 2 Ex. unter dünnen Blättern und im Harz einer Fichte, La Schera (Nationalpark), 18.VIII.55, 1 Ex. auf 2100 m im Moos (BESUCHET leg., v. PEEZ det.).

Liodes lucens FAIRM. Leukerbad, 1400 m, 14.IX.53, 1 Ex. im Moos eines alten Strunkes (BESUCHET leg., v. PEEZ det.).

Liodes distinguenda FAIRM. St. Gallen, Sitterufer, VI.52, 1 Ex., Zürich, VI.52, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., v. PEEZ det.).

Agathidium confusum BRIS. Eau froide VD, 17.VII.59, 1 Ex. unter Rinde eines Strunks (SCHERLER).

Clambidae

Clambus nigriclavus STEPH. Allondon GE, 17.V.53, 2 Ex. unter Blättern, Bussigny VD, 12.VI.53, 1 Ex. unter Genist am Ufer der Venoge (BESUCHET leg., ENDRÖDY-YOUNGA det.).

Clambus evae ENDRÖDY-YOUNGA. Bussigny, 12.VI.53, 1 Ex. unter Genist am Ufer der Venoge (BESUCHET leg., ENDRÖDY-YOUNGA det.).

Clambus nigrellus REITT. Bussigny VD, Ufer der Venoge, 12.VI.53, 3 Ex. 19.VII.53, 1 Ex., Chiasso, Ufer der Faloppia, 28.VII.54, 3 Ex. (BESUCHET leg., ENDRÖDY-YOUNGA det.).

Clambus punctulum BECK. Nicht selten unter Blättern, im Moos, unter alten Heuhaufen und im Mist. Lausanne, Romanel, Boussens, Buchillon, Agiez bei Orbe, Villeneuve, Gryon, Euseigne VS (BESUCHET leg., ENDRÖDY-YOUNGA det.).

Clambus radula ENDRÖDY-YOUNGA. Solalex bei Gryon, 1500 m, 28.VIII.49, 1 Ex. in Fichtenstrunk (BESUCHET leg., ENDRÖDY-YOUNGA det.).

Orthoperidae

Sacium pusillum GYLL. Pfynwald VS, 4.VII.63 und 31.VII.63, 15 Ex. nach Waldbrand von verbrannten Bäumen geklopft (SCHERLER).

Arthrolips obscurus SAHLBG. Romanel bei Lausanne, 6.VII.51, 1 Ex. unter Rinde von Buchenstrunk (BESUCHET).

Orthoperus punctulatus REITT. Zürich, IX.57, 1 Ex. im Gesiebe (TOUMAYEFF). St. Gallen, 26.IX.63, 2 Ex. an verschimmeltem Holz (HUGENOBLE).

Orthoperus improvisus BRUCE. St. Gallen, Bruggwald, 26.IX.62, 2 Ex. an schimmeligem Nadelholz (HUGENOBLE leg., LOHSE det.).

Staphylinidae

Micropeplus marietti DUV. Genf, XI.48, 2 Ex. im Strohgesiebe gemeinsam mit *Micropeplus fulvus* ER. (TOUMAYEFF).

Micropeplus longipennis KR. Benken BL, VI.55, 1 Ex. in Kompost (TOUMAYEFF).

Megarthus franzi SCHEERP. St. Gallen, Höchsterwald, 14.II.61, 3 Ex. (HUGENOBLE leg., SCHEERPELTZ det.).

Proteinus crenulatus PAND. Abtwil SG, an der Sitter, 23.XII.62, 1 Ex. (HUGENOBLE leg., SCHEERPELTZ det.).

Anthobium elongatum GANGLB. Baden AG, Juni, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.). Saas-Almagel, VII.63, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Anthobium procerum BAUDI. Yvorne, IV.62, 2 Ex. in den Blüten von *Primula officinalis* (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.). Die Art wird bereits im « Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas » von HORION aus der Schweiz aufgeführt.

Anthobium octavii FAUV. Rehetobel AR, 1958, 2 Ex. auf *Viburnum lantana* (HUGENOBLE leg., LOHSE det.). Auch diese Art wird bereits im « Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas » von HORION aus der Schweiz aufgeführt.

Omalium funebre FAUV. Gurnigel, VI.60, 1 Ex. im Waldgesiebe (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Omalium ferrugineum KR. Von mir in einem früheren Nachtrag bereits von Avers-Cresta (ALLENSPACH leg.) gemeldet. Seither habe ich die Art immer wieder im Engadin-Albula, Berninahäuser, Morteratsch

— zahlreich aus dem faulenden Laub unter Bergerlen gesiebt (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Omalium minus REY. Kemmeriboden BE, IX.59, 1 Ex. gesiebt (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Omalium rugatum HEER. Scans, VIII.52, 1 Ex., Gasterntal, VII.60, 1 Ex., Kemmeriboden BE, VI.63, 2 Ex., Alvaneu, IX.63, 1 Ex., Bonaduz, X.63, 1 Ex. (LINDER leg., SCHNEERPELTZ det.). Die Art dürfte über die ganze Schweiz verbreitet und recht häufig sein.

Olophrum transversicolle LUZE. Albula, VII.61, 1 Ex. unter Moos (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Olophrum recticolle SCHEERP. Saas-Grund, VII.51, 2 Ex. unter nassem Moos (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Olophrum bernhauerianum SCHEERP. Thal SG, 19.V.58, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.). Gr. St. Bernhard, VIII.57, 3 Ex. unter Steinen an Schneefeldern, Zuoz, VII.61, 2 Ex., Berninahäuser, VIII.64, 1 Ex., Albula, VII.64, 2 Ex., La Punt GR., VIII.64 1 Ex., alle im faulenden Laub unter Bergerlen, Altenrhein, IV.66, 8 Ex. im angeschwemmten Detritus (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.). Das Vorkommen dieser alpinen Art in der Bodenseegegend ist sehr merkwürdig.

Lesteva nivicola FAUV. Freiburg, Saaneufer, 3.V.57, 1 Ex. im angeschwemmten Detritus (ALLENSPACH leg., SCHEERPELTZ det.).

Lesteva carinthiaca LOHSE. Binn VS, 1600 m, 8.VIII.60, 2 Ex. aus überrieseltem Moos gesiebt (KÖSTLIN leg., LOHSE det.).

Antophagus aeneicollis FAUV. Gasterntal, VI.59, 2 Ex., VI.60, 2 Ex., Mitholz unterhalb Kandersteg, V.61, 1 Ex., alle von blühenden Weiden geklopft (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Ancyrophorus flexuosus FAIRM. Allondon GE, 17.IV.64, 1 Ex. im Angeschwemmten (COMELLINI).

Thinobius delicatulus KR. Heitenried FR, Senseufer, VI.61, 1 Ex. aus Sand geschwemmt (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Thinobius pusillimus HEER. Aarberg, Aareufer, IX.58, 1 Ex. aus Sand geschwemmt, Heitenried FR, Senseufer, VI.63, 2 Ex. aus Sand geschwemmt (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Trogophloeus distinctus FAIRM. Aarberg, Frühling bis Herbst am Aareufer unter Steinen und im Angeschwemmten häufig (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.). Bereits von FONTANA von Chiasso gemeldet.

Trogophloeus mannerheimi KOLEN. Altenrhein, 1958, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., G. BENICK det.).

Trogophloeus politus KSW. Egnach TG, Seeufer, 27.X.62, 2 Ex., Staad SG, 1960, 2 Ex. im Schutt (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.).

Trogophloeus subtilicornis ROUBAL. Arnegg SG, 1958, 1 Ex., Thal SG, 1957, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., G. BENICK det.).

Oxytelus fulvipes ER. Genf, IV.54, 1 Ex., Mies VD, V.56, 1 Ex. (TOUMAYEFF).

Oxytelus clypeonitens PAND. Zürich, VI.52, 7 Ex. (TOUMAYEFF).

Bledius elongatus MNH. Heitenried, Senseufer, VI.65, 1 Ex. im Angeschwemmten (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Bledius dissimilis ER. Pfyn TG, VIII.55, 1 Ex. am Thurufer aus Lehm Boden getreten (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Bledius baudii FAUV. Heitenried FR, Senseufer, Frühling 1962 und 1963, zahlreich im Angeschwemmten (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Bledius agricultor HEER. Heitenried FR, V.62, 2 Ex. aus dem Schlamm der Sense geschwemmt (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Stenus nitens STEPH. Romanshorn, 5.V.60, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.).

Stenus eumerus KSW. Schuls, Innufer bei Pradella, VII.58, 2 Ex., VII. und VIII.64, 6 Ex. auf Schlamm- und Sandbänken laufend (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Stenus coarcticollis EPPH. Zahlreiche Meldungen: Genf, Crêt de la Neuve VD, Les Cullayes VD (TOUMAYEFF), Bernhardszell SG, Winkeln SG, Egnach TG, Lommis TG (HUGENTOBLE), Cossonay, Les Verrières, Gasterntal, Kemmeriboden BE, Zuoz, Scanfs, meist in Anzahl (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.). Die Art wurde bereits von JÖRGER von Chur gemeldet.

Stenus muscorum FAIRM. Mörschwil SG, 21.IX.57, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., G. BENICK det.), Zuoz, VIII.58, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Stenus flavipalpis THOMS. Saas-Fee, 2.VII., 14.VIII und 21.VIII.62, je 1 Ex. aus verrottetem, sehr feuchtem Moosköder gesiebt (KÖSTLIN leg., ULBRICH det.). Gasterntal, VI.55, 1 Ex., VI.63, 6 Ex., Sörenberg LU, IX.61, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Paederus melanurus ARAG. Die schöne Art ist im Tessin weit verbreitet, läuft im Sonnenschein über den Schlamm und Sand der Seeufer zwischen den Uferpflanzen, wird auch von der Ufervegetation gestreift. Gordola, Lago di Muzzano (BESUCHET), Lago d'Origlio (LINDER).

Lathrobium bicolor ER. Heitenried FR, Senseufer, VI.61, 1 Ex. im Angeschwemmten (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Lathrobium gracile HAMPE. Gachnang TG, VI.56, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.). Altenrhein, Seeufer, 1960, 1 Ex. (SPÄLTI). Zürich, Katzensee, 6.III.48, 1 Ex. aus nassem Schilfdetritus gesiebt (ALLENSPACH).

Lathrobium letzneri GERH. Altenrhein, 26.IV.64, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.). Uettligen BE, IV.39 und IV.53, je 1 Ex., Zollikofen, V.39, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Leptolinus nothus ER. Genf, IV.54, 1 Ex. (TOUMAYEFF).

Leptacinus intermedius DONISTH. Zuzwil SG, 1960, mehrere Ex. (SPÄLTI).

Othius brevipennis KR. St. Gallen, 14.III.60, 1 Ex. (GENTINA leg., SCHEERPELTZ det.).

Philonthus alpinus EPP. Wädenswil, 19.V.61, 1 Ex. aus faulendem Gras gesiebt (ALLENSPACH leg., SCHEERPELTZ det.). Lostallo GR, IX.66, 3 Ex. in Kuhdung (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Philonthus spermophili GANGLB. Von HEINZE bereits von Basel gemeldet. Commugny GE, 5.IV.59, 2 Ex. im Nest eines kleinen Nage-tiers (STEFFEN leg., SCHEERPELTZ det.).

Philonthus femoralis HOCHH. S. Nazzaro, VII. und VIII.48, 3 Ex., Origlio, VII.54, 1 Ex., Mendrisio IV.55, Lugano, VIII.59, je 1 Ex., alle an Ufern von stehenden und fliessenden Gewässern (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Philonthus tirolensis LUZE. Laquintal am Simplon, VII.62, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.). Albligen BE, Senseufer, VI.50, 1 Ex., Saas-Grund, VIII.51, 1 Ex., Schuls, VII.61, 1 Ex., Gasterntal, VI.63, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Philonthus suffragani JOY. Fanelstrand bei Gampelen BE, VI.50, 1 Ex., Aarberg, Aareufer, V.50, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Philonthus appendiculatus SHP. Es liegen zahlreiche Meldungen vor: Murten, Salavaux VD, Niederglatt ZH, Aesch BL, Morges (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.). Altenrhein, Arbon, Güttingen TG, St. Gallen (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.). Saas-Grund, Berni-nahäuser (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Philonthus toxotes JOY. St. Margrethen SG, 1958, 1 Ex. (HUGENTOBLE).

Philonthus stipes SHP. Güttingen TG, 25.IX.58, 1 Ex. im Gesiebe (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.). Altstätten SG, 1960, 1 Ex. an totem Igel (SPÄLTI leg., SCHEERPELTZ det.). Saas-Grund, VII.51, 1 Ex., Generoso, X.58, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Staphylinus falcifer NORDM. Rancate, VIII.8.63, 1 Ex. am Fusse eines Kastanienbaums (COMELLINI).

Heterothops binotatus GRAV. Sugiez FR, II.62, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Heterothops niger KR. Oberglatt ZH, XI.53, 1 Ex., Spreitenbach AG, X.57, 2 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.). Büren a. A., Pfyn TG, Uettligen BE, Mt. Pélerin, überall in Maulwurfsnestern überaus häufig, einer der häufigsten Käfer in diesem Biotop (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Quedius mülleri GRID. Furka, VII.49, 1 Ex., Eggishorn VS, VIII.40, 1 Ex., Faulhorn, VIII.41, 1 Ex., Kleine Scheidegg VIII.43, 1 Ex., Gasterntal, VII.50, 1 Ex., Mattmark, VIII.51, 2 Ex., Bernina, VIII.52, 1 Ex., Vrin GR, VIII.53, 1 Ex., Val Somvix, VII.53, 1 Ex., Simplon VI.44 und VII.63, je 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Quedius bicolor MULS. Kemmeriboden BE, V.59, 3 Ex., IX.59, 2 Ex., VIII.60, 1 Ex., Gurnigel, VII.59, 1 Ex., Muggio, VIII.59, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Quedius riparius KELLNER. Altstätten, am Tobelbach, 13.VIII.62, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.).

Quedius acuminatus HOCHH. Champex VS, X.55, 5 Ex. aus Moos gesiebt (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Atanygnathus terminalis ER. Au ZH, 15.VI.62, 1 Ex. aus Detritus einer Sumpfwiese gesiebt (ALLENSPACH leg., SCHEERPELTZ det.).

Mycetoporus mulsanti GANGLB. Morges, IX.59, 1 Ex., Mühlebach VS, VIII.62, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.). Dotzigen BE, VI.50, 1 Ex., Seealpsee AI, VIII.55, 3 Ex., Mte. Lema, VII.62, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Mycetoporus monticola FOWL. In einem früheren Nachtrag bereits aus dem Val Verzasca gemeldet. Bürglen TG, 21.V.64, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., LOHSE det.). Gurnigel und Berninahäuser, zahlreich im Gesiebe (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Mycetoporus piceolus REG. Saas-Grund, VIII.51, 1 Ex., Saas-Fee, VII.51, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Mycetoporus solidicornis WOLL. Fiesch VS, VIII.60, 2 Ex. im Gesiebe von dürren Blättern unter *Prunus padus* (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Mycetoporus boreellus SAHLBG. Scanfs, Zuoz, Albula, Berninahäuser, zahlreich im Gesiebe von faulendem Bergerlenlaub (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Hypocyptus pulicarius ER. Frauenfeld, XII.51, 1 Ex., Gachnang TG, IX.55, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.).

Oligota apicata ER. Grasburg BE, IV.59, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.).

Gyrophæna obsoleta GANGLB. Bonaduz, X.65, 2 Ex. in Pilzen (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Gyrophæna rugipennis MULS. Trélex VD, IX.61, 1 Ex. aus Pilzen gesiebt (TOUMAYEFF).

Gyrophæna joyi WEND. Magadino, VII.65, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Gyrophæna joyoides WÜSTH. Bonstetten ZH, 10.IX.42, 10 Ex. aus überreifen Hutpilzen gesiebt (ALLENSPACH leg., SCHEERPELTZ det.). Genf, VI.53, 1 Ex., Schwarzenburg, VIII.54, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.). St. Gallen, 1960, 6 Ex., Wittenbach SG, 1957, 2 Ex., Langentannenholz SG, 1960, über 500 Ex. in *Collybia platyphylla* (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.).

Rhopalocera clavigera SCRIBA. Reute AI, 1957, 1 Ex., Wittenbach SG, 1963, 2 Ex. (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.).

Pseudomicrodota paganettii BERNH. Kloster Fahr ZH, XI.53, 2 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.).

Tachyusa objecta MULS. Bereits von JÖRGER von Chur gemeldet. Romanshorn, 26.VI.64 (HUGENTOBLE).

Schistoglossa curtipennis SHP. Niederglatt ZH, XI.55, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.).

Amischa soror KR. La Punt GR, VIII.64, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Sipalia zeithammeri BERNH. Generoso, VII.54, 2 Ex., VIII.59, 2 Ex. im Gesiebe, Muggio, VIII.65, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Atheta appulsa SCRIBA. Aarberg, VI.51, 1 Ex. im Angeschwemnten (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Atheta hygrobia THOMS. Niederglatt ZH, IX.52, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.). Aarau, IV.49, 2 Ex., Aarberg, VI.52, 1 Ex., Uettligen, V.54, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Atheta fallaciosa SHP. Wolfhausen ZH, XI.52, 1 Ex., Genf, IV.54, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.). St. Gallen, 28.X.61, 1 Ex., Horn TG, Seeufer, 1959, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.).

Atheta spurnyi BERNH. Von JÖRGER bereits von Vals GR angeführt. Gurnigel, VI.62, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Atheta tonsura MESCHN. Bettingen BL, IV.51, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.).

Atheta excellens KR. Walenstadtberg, 1961, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.).

Atheta depressicollis FAUV. St. Gallen, 1960, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.). Uettligen, X.51, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Atheta subglabra SHP. Forst bei Bern, IV.59, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.).

Atheta glabricula THOMS. Chiasso, VIII.59, 4 Ex. im Kompostgesiebe (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Atheta parvicornis MULS. Bürchen VS, VIII.63, 3 Ex. aus Pilzen gesiebt (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Atheta spatula FAUV. Fiesch, VII.49, 1 Ex., Uettligen, X.55, 1 Ex., Zuoz, VII.64, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.). Leukerbad, VII.64, 1 Ex. (KÖSTLIN leg., BENICK det.).

Atheta spatuloides BEN. Heitenried FR, IV.62, 1 Ex. im Angeschwemnten der Sense (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Atheta benickiella BRUNDIN. Frauenfeld, 1956, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.). Uettligen, VIII.51, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Atheta haarwoodi WILLIAMS. Grabs SG, 28.VIII.62, 1 Ex. in Pilz, Mörschwil SG, 1960, 2 Ex., St. Gallen, 1962, 1 Ex. in Buchenschwamm, Sulgen TG, 29.V.62, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.). Aarberg, IX.55, 2 Ex., Heitenried FR, Senseufer, V.62, 2 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Atheta ithyophalli SCHEERP. Genf, Okt., 1 Ex., St. Moritz, III.59, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.). Uettligen, IV.52, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Atheta biimpressa SCHEERP. Uettligen, III.52, 2 Ex., VII.52, 1 Ex., Kemmeriboden BE, VIII.54, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Atheta paracrassicornis BEN. Isenfluh BE, 1400 m, 19.VIII.63, 1 Ex. aus Pferdemit gesiebt (KÖSTLIN leg., BENICK det.).

Atheta ebenina MULS. Genf, IV.58, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.). Mörschwil SG, 1958, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.). Altstätten SG, 7.XI.59, 1 Ex. an altem Fischköder (SPÄLTI leg., SCHEERPELTZ det.). Scans, VIII.52, 4 Ex. in Murmeltierbau, Val Colla, VIII.54, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Atheta nidicola JOH. Genf, X.50, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.).

Atheta incognita SHP. Geiserwald AR, 1958, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., BENICK det.). Bereits von JÖRGER vom Rigi gemeldet.

Atheta brunneipennis THOMS. Gurnigel, VI.61, 3 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Atheta valida KR. Saas-Grund, VII.51, 1 Ex., Saas-Almagell, VIII.60, 1 Ex., Sörenberg LU, IX.61, 1 Ex., Gurnigel, VII.64, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Atheta aquatilis THOMS. Kemmeriboden BE, VIII.60, 1 Ex., Gurnigel, VI.60 und VI.62, je 1 Ex., Albula, VII.64, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Atheta laevicauda SAHLBG. St. Moritz, VIII.55, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.). Saas-Fee, 7.VIII.60, 2 Ex. aus sehr feuchtem, verrottetem Moosköder (KÖSTLIN leg., BENICK det.). Lukmanier, VII.53, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Atheta wüsthoffi BEN. Es liegen zahlreiche Meldungen aus dem Mittelland und den Alpen vor: Simplon (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.). Saas-Fee (KÖSTLIN leg., BENICK det.). Romanshorn, Mörschwil SG, St. Gallen, Stein AR, Gonten AI (HUGENTOBLE). Gurnigel, Kemmeriboden, Leuk, Saas-Almagell, Schuls, Generoso (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Atheta hanseni STRAND. Isenfluh BE, 1400 m, 19. und 23.VIII.63, 3 Ex. aus Pferdemit gesiebt (KÖSTLIN leg., BENICK det.).

Atheta heymesii HUBENTH. Egnach TG, 1958, 1 Ex. am Seeufer unter Algen (HUGENTOBLE leg., BENICK det.).

Atheta roettgeni BERNH. Im Winkler-Katalog bereits aus der Schweiz angeführt. Schuls, VIII.64, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.). Leukerbad-Torrenthorn, ca. 2600 m, 2.VII.64, 2 Ex. (KÖSTLIN leg., BENICK det.).

Atheta verticipunctata SCHEERP. St. Gallen, 1959 und 1961, 3 Ex. (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.). Gurnigel, IX.58, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Atheta reissi BEN. Leukerbad, 2100 m, 7.VII.64, 3 Ex. im Murmeltierkot (KÖSTLIN leg., BENICK det.).

Atheta consanguinea EPP. Salez SG, 1959, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., SCHEERPELTZ det.).

Atheta melanaria MNNH. Generoso, VI.50, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Atheta gilvicollis SCHEERP. Genf, IX.50, 1 Ex., Lupsingen BL, VIII.57, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.). Allschwil, IV.56, 1 Ex., Uettligen, V.57 und IX.58, je 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Megaloscapa punctipennis KR. Frauenfeld, 1955, 1 Ex. (HUGENOBLE leg., BENICK det.).

Apimela macella ER. Heitenried FR, V.62, 12 Ex. im Angeschwemmten der Sense (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Apimela pallens MULS. Genf, März und April, 2 Ex., Grasburg BE, IV.59, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.). Laupen, VIII.55, 1 Ex. unter Stein am Saaneufer, Heitenried FR, V.62, zahlreich im Angeschwemmten der Sense (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Meotica bucephala SCHEERP. Genf, IV.54, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.).

Rhopalotella hungarica BERNH. Uesslingen TG, IV.54, 1 Ex., Altstätten SG, 19.IV.63, 2 Ex. an Aas (HUGENOBLE leg., SCHEERPELTZ det.).

Ocyusida rufescens KR. Saas-Grund, VIII.51, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Oxypoda procerula MNNH. Genf, X.49, 1 Ex. (TOUMAYEFF leg., SCHEERPELTZ det.).

Oxypoda tirolensis GREDL. Saas-Almagell, VII.51, 1 Ex., Saas-Grund, VIII.51, 2 Ex., Schuls, VII.58, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Oxypoda vicina KR. St. Gallen, 20.IV.61, 2 Ex. unter Unkrauthaufen (HUGENOBLE leg., SCHEERPELTZ det.).

Oxypoda induta MULS. Mammern TG, 1956, 3 Ex. unter Genist am See, St. Gallen, 3 Ex. unter Unkraut (HUGENOBLE leg., BENICK det.).

Oxypoda skalitzkyi BERNH. Alt St. Johann SG, Neuenalp, 1960, 1 Ex. unter Tannadeln (HUGENOBLE leg., SCHEERPELTZ det.).

Oxypoda rufula MULS. St. Gallen, 1957, 1 Ex. (HUGENOBLE leg., BENICK det.).

Oxypoda rugulosa KR. Berg SG, 1957, 1 Ex. (HUGENOBLE leg., BENICK det.).

Thiasophila canaliculata MULS. Muolen TG, Hudelmoos, IV.62, 1 Ex. (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Microglotta picipennis GYLL. Felben TG, VI.52, 1 Ex. (HUGENOBLE leg., SCHEERPELTZ det.).

Aleochara marmottae DEV. Scanfs, VIII.52, 3 Ex. in Murrenbau geködert (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Aleochara spadicea ER. Überall gemein in Maulwurfsnestern im Vorwinter und Frühling, z. B. Mt. Pèlerin, Siselen BE, Galmiz FR (LINDER leg., SCHEERPELTZ det.).

Histeridae

Onthophilus affinis REDTB. Orgilio, 14.VIII.62, 1 Ex. aus Detritus gesiebt (SCHERLER leg., LINDER det.).

Acritus homoeopathicus WOLL. Romanel b. Lausanne, 12.V.51, 3 Ex., 19.V.51, 3 Ex., 30.V.51, 1 Ex., 2.VI.51, 3 Ex., 10.VI.51, 9 Ex., alle auf einem Eichenstrunk und unter dessen Rinde (BESUCHET).

Saprinus subnitidus MARS. Zwischen Vouvry und Mies VS, 13.VI.52, 1 Ex. unter toter Kröte, Locarno, 10.IX.50, 1 Ex. unter toter Viper (BESUCHET leg., THÉRONDET det.).

Saprinus punctatostrigatus MARS. Lausanne, 14.VI.48, 1 Ex. unter Vogelkadaver, 17.V.50, 1 Ex. unter Igelkadaver, Yvonand, 7.VII.52, 5 Ex. unter totem Maulwurf, Martigny, 26.VI.49, 2 Ex. unter Igelkadaver, Bellinzona, 23.VII.50, 1 Ex. in Menschenkot, Locarno, 10.IX.50, 1 Ex. unter toter Viper (BESUCHET leg., THÉRONDET det.).

Cantharidae

Malthodes montanus KSW. Schuls, VI.38, 1 Ex. (TOUMAYEFF). Saas-Almagell, VII.42, 1 Ex. gekätschert (LAUTNER).

Malachiidae

Ebaeus flavicornis ER. Umgebung Sihlsee, VI.46, 3 Ex. gekätschert (LAUTNER).

Dasytidae

Trichoceble fulvohirta BRIS. Bürchen VS, VIII.63, 1 Ex. (LINDER).

Eucnemidae

Dromaeolus barnabita VILLA. Umgebung Frauenfeld, VI.59, 1 Ex. gekätschert (LAUTNER).

Dirrhagus sahlbergi MNNH. Locarno, VII.65, 1 Ex. am Fenster-
vorhang abgelesen (LINDER).

Nitidulidae

Brachypterolus vestitus KSW. Die Art ist auf *Anthirrhinum* weit verbreitet. Yverdon, Genf (SERMET). Basel (TOUMAYEFF). Bern, Aarberg (LINDER).

Meligethes brevis STRM. Bözingerberg, VIII.55, 2 Ex. in den Blüten von *Helianthemum* (LINDER).

Meligethes anthracinus BRIS. Genf, Mai, 1 Ex. (TOUMAYEFF). Frauenfeld, IV.55, mehrere Ex. (HUGENTOBLE). Leuk, 5.VI.67, in grosser Zahl in den Blüten von *Isatis tinctoria* (LINDER).

Cryptophagidae

Cryptophagus skalitzkyi REITT. Frauenfeld, 18.IV.57, 1 Ex. in faulendem Heu, Uesslingen TG, 5.V.56, 1 Ex. (HUGENTOBLETER).

Atomaria lewisi REITT. Adventivart aus Ostasien, heute in der Ostschweiz weit verbreitet und häufig, sicherlich auch in den andern Gegenden der Schweiz zu finden. Erstfund: St. Gallen, 20.VIII.58 (HUGENTOBLETER und SPÄLTI leg., LOHSE det.).

Lathridiidae

Enicmus histrio JOY. Bürglen TG, 1.VIII.60, 1 Ex. (HUGENTOBLETER leg., LOHSE det.).

Cartodere separanda REITT. Muolen SG, Hudelmoos, 7.VIII.61, im Gesiebe (HUGENTOBLETER leg., LOHSE det.).

Cartodere argus REITT. Egnach TG, 27.V.63, 1 Ex. in faulendem Heu (HUGENTOBLETER leg., LOHSE det.).

Adistemia watsoni WOLL. St. Gallen, 8.II.63, in Anzahl an schimmeligem Herbar (HUGENTOBLETER leg., LOHSE det.).

Colydiidae

Rhopalocerus rondanii VILLA. Genf, 4.IV.64, 4 Ex. in hohlem Ulmenstamm, Versoix, 5.V.63, 1 Ex. am Fusse einer Pappel (BESUCHET).

Cicones pictus ER. Roche VD, V.52, 1 Ex. im Flug (TOUMAYEFF). Roche VD, 7.VI.59, 1 Ex. unter Rinde (SCHERLER leg., LINDER det.).

Oxylaemus cylindricus PANZ. Oberhalb Mezzovico TI, 22.VII.54, 3 Ex. in hohlem Kastanienstrunk, Genthod GE, 19.VIII.63, 3 Ex. in Eichenstrunk, Petit-Saconnex, 6.XI.64, 4 Ex., 18.XI.64, 7 Ex. in hohlem Eichenstrunk (BESUCHET).

Oxylaemus variolosus DUF. Roveredo GR, VI.48 (ALLENSPACH). Petit-Saconnex, 6.XI.64, 25 Ex., 18.XI.64, 18 Ex. in hohlem Eichenstrunk (BESUCHET).

Cerylon fagi BRIS. Von dieser Art liegen zahlreiche Meldungen vor. Sie findet sich unter Rinden und in faulem Holz. Agiez bei Orbe, Cossonay, Oulens VD, Roche VD (BESUCHET). Bettingen BL, Grellingen BE, Roche VD (TOUMAYEFF). Vevey, Roche VD, Mt. Pélerin (SCHERLER). Roggenfluh SO, Uettligen, Aarberg, St. Blaise, Cossonay (LINDER).

Coccinellidae

Rodolia cardinalis MULS. Diese australische Art wurde schon vor Jahrzehnten zur Bekämpfung eingeschleppter Schildläuse nach Italien und Südfrankreich importiert und ausgesetzt und erfüllte die in sie gesetzten Hoffnungen. Auch im Tessin wurde die Art angesiedelt und hat sich um Locarno während Jahren gehalten. Ob sie noch heute

dort vorkommt, weiss ich nicht. Locarno, 6.VIII.45, 15 Ex. (SIMONET).
Locarno, IX.51, 10 Ex. (SCHENK).

Aspidiphoridae

Aspidiphorus lareyniei DUV. Roche VD, 25.V.52, 1 Ex. unter der Rinde eines Eichenstrunks, 19.VI.54, 2 Ex. in altem Lindenstrunk, Origlio TI, 30.VI.54, 2 Ex. unter faulem Laub und Heu, Morbio, 26.VII.54, 2 Ex. in faulem Holz (BESUCHET).

Cisidae

Cis quadridens MELL. Von STIERLIN ohne schweizerischen Fundort aufgeführt. Oberhalb Gryon, 21.X.47, 1 Ex., I.48, 3 Ex., 27.III.48, 17.X.48, 12.VIII.49, je 1 Ex. in Holzschwämmen der Fichte zwischen 1500 und 1700 m (BESUCHET).

Anobiidae

Episernus granulatus WSE. Uettligen, VI.46, 1 Ex. an Waldrand gekätschert (LINDER).

Pythidae

Rabocerus gabrieli GERH. Oberhalb Gryon, 1500 m, 20.III.49, 3 Ex. unter Rinde (BESUCHET).

Anthicidae

Anthicus gracilis PANZ. Lago di Muzzano, 24.VII.54, 6 Ex. am Seeufer (BESUCHET). Lago d'Origlio, 14.VIII.62, 1 Ex. (SCHERLER).

Endomia occipitalis DUF. Genf, IV.53, 1 Ex. (TOUMAYEFF).

Mordellidae

Mordella holomelaena APF. Binn, 1400 m, 8.–18.VIII.60, 6 Ex. auf Umbelliferen, Leukerbad, 28.VI. und 1.VII.64, je 1 Ex. auf Schafgarbe (KÖSTLIN leg., ERMISCH det.). Grabs SG, Voralpsee, 30.VIII.62, 1 Ex., Mörschwil SG, 3.VI.59, 1 Ex., St. Gallen, 16.VII.62, 1 Ex., Walenstadtberg, 29.VI.60, 1 Ex. (HUGENBLOCHER leg., ERMISCH det.).

Mordella hütheri ERMISCH. Weisstannen SG, 1.VII.64, 1 Ex. (HUGENBLOCHER leg., ERMISCH det.). Laquintal am Simplon, 3.VIII.60, 1 Ex., Gurtnellen UR, 1.VIII.61, 1 Ex., Binn, 9.–18.VIII.60, 12 Ex., 4.–11.VIII.61, 10 Ex., Leukerbad, 28.VI.64, 1 Ex., 1.VII.64, 1 Ex., alle auf Umbelliferen (KÖSTLIN leg., ERMISCH det.).

Mordellistena falsoparvula ERMISCH. Gais AR, 25.VI.62, 1 Ex. (HUGENBLOCHER leg., ERMISCH det.).

Mordellistena brevicauda BOH. Genf, V.53, 1 Ex., Muttenz BL, V.54, 1 Ex. (TOUMAYEFF). Binn, 1400 m, 17.VIII.60, 1 Ex. auf Umbellifere (KÖSTLIN leg., ERMISCH det.). Vevey, 21.IV.55, 1 Ex., 14.V.56, 1 Ex., Vionnaz VS, 20.VI.56, 1 Ex. (SCHERLER).

Mordellistena pygmaeola ERMISCH. Binn, 1400 m, 6.VIII.60, 1 Ex. auf Umbellifere, Münster VS, 1.VIII.62, 1 Ex. auf Schafgarbe (KÖSTLIN leg., ERMISCH det.).

Mordellistena hölleri ERMISCH. Saas-Fee, 3. und 9.VIII.62, 5 Ex. auf Schafgarbe (KÖSTLIN leg., ERMISCH det.).

Mordellistena dieckmanni ERMISCH. Binn, 1400 m, 11.VIII.60, 1 Ex. auf Umbellifere (KÖSTLIN leg., ERMISCH det.).

Mordellistena thuringiaca ERMISCH. Isenfluh BE, ca. 1250 m, 1.–14.VIII.63, 35 Ex. auf Dolden des Bärenklaus (KÖSTLIN leg., ERMISCH det.).

Mordellistena alpicola ERMISCH. Leukerbad, 26. und 27.VI.64, 2 Ex. bei 1450 und 1600 m auf Schafgarbe (KÖSTLIN leg., ERMISCH det.).

Mordellistena pentas MULS. Walenstadtberg, 29.VI.60, 1 Ex. (HUGENTOBLE leg., ERMISCH det.).

Anaspis costai EM. Chur, ca. 700 m, 7.VIII.54, sehr zahlreich auf Dolden des Bärkenklaus (KÖSTLIN leg., ERMISCH det.).

Serropalpidae

Phloeotrya vaudoueri MULS. Allschwilerwald, 5.VIII.64, 10 Ex. nachts auf Holzklaftern (GEHRIG und HEINERTZ).

Melandrya barbata FAB. Allschwilerwald, 28.V.64, 1 Ex. an Klafterholz (GEHRIG).

Scarabaeidae

Aphodius nemoralis ER. Von HORION (Faunistik der mitteleurop. Käfer, Band VI) von Maienfeld aufgeführt. Saas-Almagell, 4.VIII.62, 1 Ex. (KÖSTLIN leg., SCHMIDT det.).

Aphodius corvinus ER. Campsut im Avers GR, 2.–13.VIII.37, 1 Ex. (ALLENSPACH leg., HEYMES det.). Ayer VS, 22.VIII.59, 6 Ex. (SCHERLER). Scans, VIII.52, 2 Ex., VII.52, 2 Ex. in Kuhfladen, Berninahäuser, VIII.52, 1 Ex. in Kuhfladen, Val Sulsana, VII.52 und VIII.64, zahlreich im Hirschkot (LINDER).

Trox perrisi FAIRM. Mies, 16.X.26, 6 Ex. in der Höhlung einer von einer Eule bewohnten Eiche (MEYLAN).

Cerambycidae

Callimus angulatus SCHRNK. Grono, 1.V.61, 1 Ex. von Weiden geklopft (ALLENSPACH).

Clytus tropicus PANZ. Allschwilerwald, 10.VI.64, 1 Ex. an Eichenklafter (GEHRIG).

Chrysomelidae

Cryptocephalus distinguendus SCHNEID. Hochmoore von La Brévine NE, VII.63 und VII.64, in Anzahl auf Birken (LINDER, POCHON, KOBEL). Von HANDSCHIN aus dem Nationalpark gemeldet.

Cryptocephalus albolineatus SUFFR. Val Ferret VS, VIII.63, auf 2750 m, im Grase (TOUMAYEFF). Die Aberration *bischoffi* TAPPES dieser Art wird bereits von STIERLIN aus der Schweiz gemeldet.

Longitarsus fuscoaeneus REDTB. Bürchen VS, VIII.63, 1 Ex. auf Brachacker gestreift (LINDER).

Longitarsus nigerrimus GYLL. Lac Lussy bei Châtel St. Denis, 23.IX.63, 1 Ex. aus Moos gesiebt (SCHERLER).

Crepidodera crassicornis FALD. Piazzogna TI, 9.VIII.54, 1 Ex. gekätschert (KÖSTLIN leg., MOHR det.).

Psylliodes schwarzi WEISE. Furggtal bei Saas-Almagell, 2200–2500 m, 11.VIII.62, 1 Ex. unter Stein (KÖSTLIN leg., MOHR det.).

Anthribidae

Tropideres curtirostris MULS. Somazzo TI, 16.VII.60, 1 Ex. aus abgestorbener Hecke geklopft (SCHERLER).

Rhaphitropis oxyacanthae BRIS. Somazzo TI, 16.VII.60, 1 Ex. aus abgestorbener Hecke geklopft (SCHERLER).

Rhaphitropis cinctus PAYK. Mormont bei La Sarraz, 3.VII.51, 1 Ex. aus einer Welle von Eichenästen geklopft (BESUCHET leg., HOFFMANN det.).

Paramesus tessellatus BOH. Breno TI, 2 Ex. aus dürrer Holz geklopft (SCHERLER).

Curculionidae

Apion longirostre OL. Im südlichen Tessin — Gegend um Lugano — sehr häufig in den Gärten auf *Althaea* (LINDER).

Apion aestimatum FAUST. Le Sentier, 11.VII.49, 1 Ex. (BESUCHET leg., HOFFMANN det.).

Apion facetum GYLL. Val Sulsana GR, VIII.64, 1 Ex. gestreift (LINDER leg., DIECKMANN det.).

Apion lanigerum GEMM. Savièse VS, V.66, Mt. Tendre VD, VI.66, Huémoz VD, VI.67, Onnens VD, V.67 (SCHERLER leg., HOFFMANN det.). Tremona TI, IX.67, 3 Ex. gestreift (LINDER leg., DIECKMANN det.).

Otiorrhynchus azaleae PENECKE. Ofenpasshöhe, VII. und VIII.64, 14 Ex., VIII.66, 5 Ex. unter Steinen (LINDER leg., DIECKMANN det.).

Barypithes pyrenaeus SEIDL. Préverenges, 10.VI.51, 3 Ex. im Moos (BESUCHET leg., HOFFMANN det.).

Strophosomus erinaceus CHEVR. Miglieglia TI, 2 Ex. (SCHERLER).

Mesites cunipes BOH. Von mir bereits in einem früheren Nachtrag aus dem Tessin gemeldet. Rancate, 10 Ex. unter Weidenrinde (SCHERLER).

Euophryum rufum BROWN. Adventivart aus Australien, in England schon seit einigen Jahren eingebürgert. Clarens, 21.VI.42, 1 Ex. (v. PEEZ).

Raymondionymus leonhardi REITT. Zwischen Muggio und Scudellate, 4.VI.62, 1 Ex. zwischen Buchenwurzeln (BESUCHET). Muggio, 14.VII.62, 1 Ex. in der Erde unter Laubhaufen (REGNIER leg., ROUDIER det.).

Bagous collignensis HBST. Aarwangen, V.27, 2 Ex. (LINDER leg., DIECKMANN det.). Chexbres, V.53 (SCHERLER).

Orthochaetes cerdanicus HUST. Generoso, bei 1650 m, 15.IX.55, 1 Ex. im Moos (BESUCHET leg., HOFFMANN det.). Generoso, 28.VII.56, 1 Ex., 12.VII.61, 1 Ex., 23.VIII.62, 3 Ex., 13.VII.64, 3 Ex., alle aus Moos gesiebt (SCHERLER leg., HOFFMANN det.).

Smicronyx nebulosus TOURN. Branson VS, 29.V.55, 6 Ex., 27.V.62, 1 Ex., alle auf *Cuscuta* (SCHERLER leg., HOFFMANN det.). Leuk, VI.67, 1 Ex. von *Cuscuta* geklopft (LINDER leg., DIECKMANN det.).

Smicronyx brevicornis SOL. Branson VS, 28.VI.59, 1 Ex., 14.V.61, 1 Ex. (SCHERLER leg., HOFFMANN det.).

Acalyptus sericeus GYLL. Lac Lussy bei Châtel St. Denis, 25.VII.59, 7 Ex. von Weiden geklopft (SCHERLER). Ebendort, V.65, 2 Ex. unter Weiden gesiebt (LINDER leg., DIECKMANN det.).

Tychius tridentinus PENECKE. Pfywald, VI.32, 2 Ex. gestreift (LINDER leg., DIECKMANN det.).

Tychius pumilus BRIS. Genf, V.49, 1 Ex. (TOUMAYEFF). Scudellate, 12.VII.61, 1 Ex. (SCHERLER leg., HOFFMANN det.).

Sibinia femoralis GERM. Tremona TI, IX.67, 1 Ex. auf Schuttplatz gestreift (LINDER leg., DIECKMANN det.).

Sibinia guillebeaui DESBR. Leuk, 1 Ex. (SCHERLER). Im Winkler-Katalog bereits aus der Schweiz angeführt.

Anthonomus chevrolati DESBR. Branson VS, 14.V.61, 1 Ex., Eau froide VD, 19.VI.60, 1 Ex. von blühendem Weissdorn geklopft (SCHERLER leg., HOFFMANN det.).

Magdalis fuscicornis DESBR. Buchillon VD, 31.V.50, 2 Ex. aus Eichenästen geklopft, Mormont bei La Sarraz, 27.VI.52, 2 Ex. aus Welle aus Eichenästen geklopft (BESUCHET leg., HOFFMANN det.).

Liosoma baudii BED. Generoso, 1200 m, 1.IX.53, 1 Ex. aus Moos, 26.VIII.54, 1 Ex. aus Moos gesiebt (BESUCHET leg., SCHERLER det.). Generoso, 21.VII.56, 10 Ex. aus Moos gesiebt (SCHERLER).

Liosoma subcoriaceum DAN. Generoso, 20.VII.56, 1 Ex. aus Moos gesiebt (SCHERLER leg., HOFFMANN det.).

Baris atronitens CHEVR. Branson VS, 1.VI.58, 7 Ex., 16.IV.61, 1 Ex. am Fusse einer Crucifere (SCHERLER leg., HOFFMANN det.).

Rhytidosomes pici SCHULTZE. Generoso, 1 Ex. aus Moos gesiebt, Scudellate, 2 Ex. gestreift (SCHERLER leg., HOFFMANN det.).

Ceuthorrhynchidius baldensis SCHULTZE. Anzeindaz VD, 31.VII.55, 1 Ex. aus Moos auf 2000 m (BESUCHET leg., SCHERLER det.). Lötschenpass, 5.VIII.56, 1 Ex. im Moos, Ferret VS, 17.VIII.57, 1 Ex. im Moos (SCHERLER leg., HOFFMANN det.).

Ceuthorrhynchus pyrrhorhynchus MSH. Yvorne, VII.64, 3 Ex. gestreift (LINDER).

Ceuthorrhynchus angulicollis SCHULTZE. Furglenalp am Säntis, 1480 m, 4.VII.63, 1 Ex. in Waldlichtung gestreift (SPÄLTI). Generoso, 1 Ex. aus Moos gesiebt (SCHERLER leg., HOFFMANN det.).

Ceuthorrhynchus pallidicornis BRIS. Mormont bei La Sarraz, IV.67, 3 Ex. in Waldlichtung von *Pulmonaria* gestreift (LINDER leg., DIECKMANN det.).

Ceuthorrhynchus urticae BOH. Bern, V.26, 1 Ex. (LINDER leg., DIECKMANN det.).

Ceuthorrhynchus triangulum BOH. Niederglatt ZH, VII.52, 1 Ex. (TOUMAYEFF).

Ceuthorrhynchus arquatus HBST. Bern, IX.24, 1 Ex., Aarwangen, Muhmentalerweiher, IV.67, 9 Ex. aus Ufergenist gesiebt (LINDER leg., DIECKMANN det.).

Ceuthorrhynchus lycoctoni HUST. Grabs SG, Voralp auf 1250 m, 28.VIII.62, 1 Ex. in feuchter Wiese gestreift (SPÄLTI leg., DIECKMANN det.).

Ceuthorrhynchus gallorhenanus SOLARI. Leuk, V.66, 1 Ex., Zernez, VII.66, 1 Ex., Le Landeron, V.67, 1 Ex., Raron, VI.67, 1 Ex., Augst BL, VI.67, 1 Ex., alle von Cruciferen gestreift (LINDER leg., DIECKMANN det.).

Ceuthorrhynchus sophiae STEV. Siders, V.48, 1 Ex. (LINDER leg., DIECKMANN det.).

Ceuthorrhynchus coarctatus GYLL. Augst BL, VI.67, 1 Ex. gestreift (LINDER leg., DIECKMANN det.).

Ceuthorrhynchus carinatus GYLL. Le Landeron, VI.65, 1 Ex. (LINDER leg., DIECKMANN det.).

Ceuthorrhynchus pervicax WEISE. L'Orient, 1 Ex. gestreift (SCHERLER leg., HOFFMANN det.). Kemmeriboden BE, V.52, 1 Ex. im Waldgesiebe (LINDER).

Ceuthorrhynchus pectoralis WEISE. In der Nordostschweiz vom Bodensee bis St. Gallen allgemein verbreitet, aber nicht häufig, stets einzeln (HUGENTOBLE leg., DIECKMANN det.). Kemmeriboden BE, X.51, 2 Ex. im Waldgesiebe (LINDER).

Rhinoncus henningsi WAGNER. Eriz BE, Rotmoos, VII.65, 1 Ex. (LINDER leg., DIECKMANN det.).

Phytobius muricatus BRIS. Boussens VD, 21.IV.52, 7 Ex. aus Moos gesiebt (BESUCHET). Ebendort, V.52, 2 Ex. (TOUMAYEFF).

Gymnetron plantaginis EPP. Les Grangettes bei Villeneuve, 24.V.59, 1 Ex. (SCHERLER leg., HOFFMANN det.).

Gymnetron melas BOH. Le Landeron NE, VI.65, 1 Ex., Mormont bei La Sarraz, VI.65, 1 Ex. (LINDER leg., DIECKMANN det.).

Miarus distinctus BOH. Rüthi SG, 9.V.59, 4 Ex. (HUGENTOBLE leg., DIECKMANN det.). Bereits im Winkler-Katalog aus der Schweiz aufgeführt.

Miarus frigidus FRANZ. Amden SG, 10.VI.64, Weisstannen SG, 2.VII.64 (HUGENTOBLE leg., DIECKMANN det.).

Cionus ganglbaueri WGLM. Leuk, VI.37, 1 Ex., Magadino, VII.47, 2 Ex. (LINDER leg., WÖRNDLE det.), Gampel VS, VI.65, 2 Ex. (LINDER leg., DIECKMANN det.).

Cionus nigratarsis REITT. Von dieser Art liegen zahlreiche Meldungen vor. Val Colla TI, Manno TI, Mesocco, überall zahlreich auf *Verbascum* (LINDER leg., DIECKMANN det.). Euseigne VS, Vouvry VS, Roche VD (SCHERLER leg., HOFFMANN det.).

Scolytidae

Pteleobius kraatzi EICHH. La Plaine GE, 27.VI.54, ungefähr 60 Ex. auf Ulmenstamm (BESUCHET, SCHERLER, SERMET).

Dryocoetes hectographus REITT. Trient VS, 10.VII.55, 1 Ex. auf Tannenstapel (SCHERLER leg., BESUCHET det.).