

Eine neue Art der Gattung *Claveliocnemis* Wolf 1968 (Hym., Pompilidae)

Autor(en): **Wolf, Heinrich**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss Entomological Society**

Band (Jahr): **54 (1981)**

Heft 4: **Fascicule-jubilé pour le 80e anniversaire du Prof. Dr. Jacques de Beaumont = Festschrift zum 80. Geburtstag von Prof. Dr. Jacques de Beaumont**

PDF erstellt am: **13.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-402007>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Eine neue Art der Gattung *Claveliocnemis* Wolf 1968
(Hym., Pompilidae)

HEINRICH WOLF
Uhlandstrasse 15, D-5970 Plettenberg

A new species of the genus Claveliocnemis WOLF 1968 - Description of *C. beaumonti* n. sp. ♀, from the Turcmenian SSR.

Claveliocnemis WOLF, 1968: Čas. morav. Mus. Brně, 53: 240, Brno. Typus generis: *Claveliocnemis incisipennis* WOLF 1968 ♀. Originalbeschreibung daselbst.

Claveliocnemis beaumonti n. sp.

1 ♀ «7.5.74, Turkestan, Aman Kuk, leg. M. KRAUS, 1600 m, Serafshangeb.»
«Holotypus. H. WOLF det. 1981» «*Claveliocnemis beaumonti* m. ♀, H. WOLF det. 1981» (vorläufig in coll. m.).




Fig. 1: *Claveliocnemis beaumonti*,
♀. Dorsale Ansicht.

Beschreibung. ♀. Schwarz; Mandibulum mitten und Tergitum-I und -II dunkelrot; Praeala braun, Pterostigma und Nervatur schwarzbraun; Postala hellbraun, Nervatur braun. Schwach behaart; Caput und Coxae, namentlich Coxae-I, mit einigen längeren dunklen Haaren; Femora mit einigen kurzen Haaren, Propodeum lateral mit je etwa 10 Haaren, so lang wie mittlere Glieder des Flagellum dick; Alae nicht wie bei *C. incisipennis* auffallend dicht und lang pubeszent; Pubeszenz nicht vorhanden; Toment gering, nur auf Caput und Thorax, kastanienbraun. Caput sehr dicht fein punktiert, ohne deutliche Punktzwischenräume, Clypeus nach vorne zerstreuter und gröber punktiert und mit glattem Vorderrand; Gena mitten so hoch wie letztes Glied des Flagellum mitten dick; Facies wie in Fig. 2; OOL 1,52 mal länger als POL; Occiput hinter Oculus, von oben gesehen, abgeschrägt, aber gut entwickelt (Fig. 1); Oculus, von der Seite gesehen, 1,3 mal länger als Occiput; Angulus ocellaris 90°; Antenna wie in Fig. 3; 2. und 3. Glied gleich lang, beide 3,3 mal länger als maximal dick. Thorax (ohne Collare) 2,2 mal länger als Pronotum maximal breit; Hinterrand des Pronotum rundlich-stumpfwinklig ausgeschnitten; Pronotum 1,66 mal breiter als Mesonotum zwischen den Tegulae, das Mesonotum ist also im Zusammenhang mit der Rudimentation der Alae rückgebildet. Pro- und Mesonotum dicht fein punktiert, Mesopostnotum und Metanotum etwas gröber und zerstreuter punktiert; Metapostnotum mitten nur halb so lang wie Metanotum, mit etwa 3 groben queren Riefen, dazwischen etwas chagriniert. Area dorsalis des Propodeum fein und dicht punktiert, nach hinten, zur Area terminalis, gehen die Punkte in quere Punktreihen und schliesslich in Riefung über; die Area lateralis ziemlich scharf schräg




Fig. 2-4: *Claveliocnemis beaumonti*, ♀. Facies (2), rechte Antenna (3) und Ausschnitt der Praeala (4).

nach vorne-unten gerieft; das Propodeum ist fast matt. Tibia-III oberseits schuppenzählig, mit 9 dorntragenden Schuppen, am Ende mit 5 dicken, kurzen, schwarzen Dornen; letztes Tarsalium des Pes-III mit 2 unterseitigen Dörnchen, die der Pedes-I und -II weniger deutlich; Unguis mitten mit schwachem Seitenzahn. Praeala bis zum Ende des Tergitum-II reichend, mit normal deutlicher Nervatur, wie in Fig. 1, Praeala-Ausschnitt wie in Fig. 4. Tergita etwas glänzend, sehr fein dicht punktiert, die Punktzwischenräume etwa punktgross, auf den distalen Tergita kleiner, keine grobe Überpunktierung vorhanden. Grösse 9,5 mm.

Zustand des Typus: gut; es fehlen: Antenna links die letzten 5 Glieder, Pes-I rechts letztes Tarsalium, Pes-II links die 4 letzten Tarsalia.

Bei GUSSAKOWSKIJ und F. MORAWITZ ist, was *Claveliocnemis* entsprechen könnte, in keiner der zahlreichen Arbeiten erwähnt. Die Rudimentation der Alae ist bei *C. beaumonti* weniger weit fortgeschritten als bei *C. incisipennis*. Ich widme die neue Art Herrn Professor Dr. Jacques DE BEAUMONT in Dankbarkeit; er hat mir über viele Jahre in liebenswürdiger Weise wertvolle entomologische Hilfe zuteil werden lassen.

Vergleich der beiden *Claveliocnemis*-Arten, ♀♀

1. Orbita interna parallel; Alae ohne deutliche Nervatur, dicht und lang schwarz pubeszent; Abdomen schwarz, metallisch schwarz-blau schimmernd. Afghanistan *C. incisipennis*
- Orbita interna nach unten divergent; Alae mit Nervatur, normal pubeszent; Abdomen bis auf dunkelrotes Tergitum-I und -II schwarz, nicht metallisch schimmernd. Turkmenische SSR
 *C. beaumonti*

